


Fl. Belye  
189

3/49/9





**FLORA**  
**BRUXELLENSIS.**

FLORA

BRUXELLES

# FLORA BRUXELLENSIS,



EXHIBENS

CHARACTERES GENERUM ET SPECIERUM PLANTARUM  
CIRCUM BRUXELLAS CRESCENTIUM, SECUNDUM LIN-  
NEUM DISPOSITA, CUM SYNONYMIS AUCTORUM,

CUI ADDITUR

LEXICON BOTANICON,  
IN QUO TERMINI ARTIS BREVITER EXPONUNTUR;

CURA J. KICKX,  
PHARMACOPHORUM BRUXELLENSIUM COLLEGE;

Cæci ruimus in rerum remotissimarum à nobis,  
amplexus, patriarum et ignari et incurii.

SCHREUCHZER, *It. alp.*



BRUXELLIS,  
TYPIS M.-E. RAMPELBERGH, IN VIA LACTEA.

1812.

In Bibliotheca imperiali depositi, et quodque exemplar  
propria manu signavi.

*f. H. J. K.*



## PRÆFATIO.

---

STUPENDUM sanè est rem herbariam hujus urbis à nemine huc usquè exploratam fuisse, quamvis solum ubique varium, in cujus centro existit, excursionibus botanicis omninò sit proprium. *Dodoens* qui vulgò *Dodonæus* appellatur, plantas optime descripsit, sed Bruxellas planè prætergreditur. *Lobel* habitationes in agro antverpiensi et mechliniensi quandoque notavit, sed ne unam quidem prope Bruxellas indicat; *D. Roussel* tam in Tractatû de plantis raris, quam in Florâ Galliæ borealis, stationem aliquibus adsignat, sed procul abest à numero incolarum.

Suasione amicorum et imprimis D. VAN MONS, cui hic publicè gratias ago ob benevolentiam et sollicitudinem quibus exempla typographica perlegere et emendare dignatus est, hanc Floram paravi, in quâ methodum Linneanam amplexus sum, cum pleraque Herbaria hodie hoc ordine sint disposita: moneo tamen me reformationem Gmelini secutum, quâ *gynandria*, *monœcia*, *diœcia*, *polygamia*, ac *syngenesia monogamia*, inter classes distribuuntur in quibus stamina nullam determinatam subordinationem inter se servant quoad situm et proportionem, quæque seriem constituunt à primâ ad duo-



decimam : hæc ultima comprehendit *icosandriam* et *polyandriam* conjunctim; sic classes ad numerum novemdecim sunt reductæ, in magnum commodum tyronum.

Jam per annos sexdecim Bruxellarum vicinia tam sedulè percurri ad distantiam aliquot leucarum, ut vix supersit angulus terræ non visitatus; et cùm in Pinace *Dodonei* et *Lobelii* plura desiderentur quæ detexi, adposui recentiorum synonyma ut molestiæ semper in damnum scientiæ, quantum possibile evitarentur: fide alienâ nihil propono, nam plantas relatas ipse vidi et collegi, sed licèt cuique stationem adsignem, non concludendum quod alibi non reperiatur, loca enim proxima ut plurimum, præ reliquis notavi.

Terminos in operibus Linnei sparsè propositos, ordine alphabetico disposui, ut commodiùs investigentur; eorum beneficium ex scriptis botanicorum adeò probatur ut superfluum foret dicere: fateor nihil in scientiâ existere difficilius, sed constat, neminem esse successum expectaturum quam si priùs aliquot tempus terminis cognoscendis tribuerit; sic omnia superat incommoda quæ alios jugiter et ubiquè manent.

Characterem totius generis ut in systemate vegetabilium habetur ubiquè descripsi, etsi non semper strictè conveniat speciei subjectæ, ut si postea nova detegatur planta, comilitantibus jungi possit. Tandem, opus non incongruè verbis exaggerabo ne in herbationibus fit inutile; liceat mihi tamen dicere, me hoc suscepisse in usum illorum qui vegetabilia regionis nostræ sibi perspecta reddere cupiunt, et cùm præstet domestica quam aliena noscere, labor meus fructu non carebit, si quid pro patriâ et concivibus peregerim.





# LEXICON BOTANICON,

## IN QUO TERMINI ARTIS EXPONUNTUR.

---

### A.

*ABREVIATUM*: perianthium non attingens longitudinem tubi corollæ.

*Abortiens*: pericarpium decidens ante maturitatem.

*Abrupte* dicitur folium pinnatum quod nec cirrho, nec folio terminatur.

*Acalices* dicuntur flores calice carentes,

*Acaulis*: planta caule carens, id est, cujus petiolus immediate e radice oritur.

*Acerosum*: folium gerens formam aciculæ, id est, lineare, subulatum, plerumque persistens, et basi articulatione rami insertum, ut in abiete, pino, etc.

*Acinaciforme*: folium compressum, carnosum, altero margine convexo angusto, altero rectiore, crassiore: pericarpium etiam est, cum fructus cultelli instar compressus, altero angulo longitudinali compresso, altero rectiore, crassiore.

*Acotyledones*, vide *Cotyledones*.

*Aculeus*: mucro plantæ, cortici tantum affixus; differt a spinâ quod hæc e ligno protruditur: *Aculeatus* caulis, aculeis armatus uti rosa, rubus, etc. *Aculeatum* dicitur folium cum aculei rigidi, pungentes, occupant discum.

*Acuminatum*: folium terminatum apice subulato.

*Acutum*: folium terminatum angulo acuto: *Acutangulus* dicitur ramus, cujus insertio cum caule angulum acutum constituit.

*Adnatum*: folium paginâ superiore basi rami adnexum.

*Adnata*: stipula basi petioli adnexa.

*Adpressum*: folium cujus discus approximatur cauli.

*Ascendens*: caudex, supra terram sensim se elevans, vices trunci sæpius gerens, et herbam profert.

*Adscendens*: caulis arcuatim sursum versus, seu primum declinatum, versus apicem demum erectum. *Adscendens* flos dicitur dum stamina et pistilla sub latere superiore latent recondita, ut in didynamia: *Adscendens* folium, cum apex folii cælum spectat.

*Adversum folium*, vide *Verticale*.

*Aequalis* corolla : ubi partes figurâ, magnitudine, et proportionem conveniunt. *Aequalis*, panicula pedicellis ubique proportionalis. *Aequalia* filamenta, eandem servantia longitudinem.

*Aequinoctiales* flores, vide *Vigiliæ*.

*Æstivatio*: corollæ complicatio ante explicationem floris, estque convoluta, conduplicata, imbricata, valvata, inæquivalvis.

*Aggregatus* dicitur flos cum plures flosculi monopetali; mediante receptaculo communi ita uniuntur, ut alter flosculus demtus, destruat formam totius cujus pars est : stamina floris aggregati, inter se non sunt coalita.

*Agrostographia* : pars botanices tradens de graminibus.

*Alæ* : petala duo paria, ad singulum latus floris papilionaceæ, sub vexillum posita, margine incumbentia, et parallela : basis bifida est in singulo, cujus pars inferior producit in unguem lateri receptaculo inserto, longitudinis circiter calicis : pars autem superior, brevior est et inflexa.

*Alatum* : semen, lateribus utrinque membranâ cinctum, quæ ala nuncupatur, et quâ volitante, disseminatur.

*Alatus* caulis aut petiolus, denotat ille, cujus latera sunt utrinque membranâ aucta.

*Alburnum*, vide *Cortex*.

*Algæ* : ordo tertius Cryptogamiæ : suntque plantæ cujus radix, folium et caudex in unum : fructificatio in utroque sexu consistit in calice campanulato, sessili, foliis insidens : masculus flos continet antheram unicam, apice dehiscens in lacinias plurimas : in flore femineo, calix in fundo repletus est squamis minimis, quæ vera sunt semina absque tunicis, aut cotyledonibus. Hæc Michelio debentur, et præter ea omnia obscure latent.

*Alternata* folia : cum unum post alterum tamquam per gradus, circa ramum exoritur. *Alternatim-pinnatum* dicitur, folium pinnatum cujus foliola petiolus alternatim occupant.

*Amentaceus* : flos aggregatus, habens receptaculum filiforme, distinctum squamis amentaceis.

*Amentum* est calicis species, a receptaculo communi filiformi, squamis paleaceo-gemmaceis distinctum.

*Amplexicaule* : folium cujus basis undique transversim ambiat latera caulis.

*Anceps* : caulis admittens angulos duos oppositos, longitudinales.



*Androgyna* planta, vide *Monoïca*.

*Angulatus* : caulis pluribus quam duobus angulis cavia longitudinaliter excavatus : unde obtusangulus, et acutangulus : *Angulatum* folium, angulis pluribus prominentibus, unde triangulare, quadrangulare, quinquangulare, dicitur, pro numero angulorum.

*Angyospermia* : ordo secundus Didynamiæ, continens plantas quorum semina sunt pericarpio tecta : flores hujus familiæ, a Tournefortio personati dicebantur.

*Annulus* musci, dicitur margo exterior, elasticus, oræ antheræ, in quibusdam orificium coarctans; estque nudus vel ciliatus. *Annulus* fungi, membrana seu pars volvæ, stipem supra medium cingens.

*Annua* planta cujus radix intra annum emoritur.

*Anomala* dicitur corolla, nullam certam formam exprimens, et adeo difformis ut cum nullâ familiâ certare possit, qualis est aconitum, etc., etc.

*Anthera* : genitale masculinum plantarum, polline seu geniturâ gravidum, quod matura demittit : *Antheræ* muscorum, vide *Musci*.

*Anthesis* dicitur tempus florescentiæ, quo antheræ ruptæ spargunt suum pollen supra stigma.

*Apetalus* : flos corollâ carens : ne flos apetalus cujus calix est coloratus, sumatur pro flore petalodi calice carente, observantur stamina, quæ ut plurimum situ alternant cum segmentis corollæ, et opposita sunt segmentis calicis.

*Apex* est extremitas folii in quam desinit.

*Aphyllus* : caulis foliis destitutus.

*Apophysis* : in muscis, est pars inferior antheræ, cartilaginea, incrassata, quâ pedunculo adfigitur.

*Appendiculatus* dicitur petiolus ramentis foliaceis ad basin instructus.

*Approximata* : folia ad se invicem proximè accedentia.

*Approximata* dicitur volva, cum accedit pileum fungi.

*Arbor* dicitur stirps cujus caudex in magnam proceritatem assurgit et gemmas parat : gemmæ distinguunt frutices ab arboribus; tamen rhamnus frangula gemmis caret, et arbores indicæ rarò sunt gemmiferæ, adeoque hæc divisio non est naturalis, et cum magnitudo nihil facit, dicendum nullos limites posuisse naturam inter frutices et arbores. *Arboreus* caulis; id est perennis, caudice simplici gemmifero.

*Arillus* : tunica exterior propriæ seminis, sponte secedens.

*Arista* : mucro subulatus, glumas graminum insidens, estque recta, tortilis, geniculata, etc.

*Arma* dicuntur, mucrones arcentes animalia ne ledant plantam, suntque aculei, spinæ, furcæ, stipuli, etc., etc. *Articulata* dicitur radix, siliqua, aut spica, geniculis coarctatis, vel nodis intercepta. *Articulatum* folium; cum unum ex apice alterius exerescit: *Articulatus* caulis, bulbus, vel pedunculus, quod variis articulis aut lamellis catenulatis connectitur. *Articulate-pinna-tum*; folium petiolo communi articulado: *Articulate* dehiscens, pericarpium secundum articulos raonospere-mos transversim.

*Articulus* est pars culmi geniculis duobus interjecta.

*Asperifoliæ* sunt plantæ, cujus folia scabritiâ plus minusve notabili, obteguntur, uti *symphitum officinale*, *echium vulgare*, etc.

*Assurgens*, vide *Adscendens*.

*Attenuatus*: pedunculus versus apicem, sensim crassitiem perdens.

*Auctus* calix, idem ac *Caliculatus*.

*Auriculatum*: folium lobo laterali minore prope basin auctum.

*Avene* folium venis destitutum.

*Axillare*: folium quod ad exitum rami inseritur. *Axillaris* pedunculus, exoritur inter folium et caulem, aut inter ramum et caulem.

## B.

*Bacca*: fructus pulposus, succulentus, proprie e pericar-pio facta, continens semina nuda, distincta, in valvas regulares non dehiscens. *Baccifera* vocantur plantæ quorum fructus in baccam consistit.

*Barba* audit labium inferius corollæ ringentis; *Barba*, pubis species, e pilis parallelis consistens, unde *Bar-bata* dicitur corolla quæ barbâ obvestitur, ut iris germanica, etc., etc.

*Bicornes*: plantæ quorum flores antheris cornutis sunt instructi, ut erica, pyrola, etc., etc.

*Biennis*: planta altero anno florens, et deinde emoritura.

*Bifaria*: folia ad latera rami opposita tantum enata.

*Bifera*: plantæ quæ bis in anno florent, vere scilicet et autumno, ut primula, auricula, etc.

*Bifidum*, vide *Fissum*.

*Biflora*: gluma graminum duos amplexens flores: *Biflo-rus* pedunculus, a numero fructificationum in singulo pedunculo.

*Bigeminatum* folium, vide *Gemina*.

*Bijugum* : folium pinnatum ex foliolis tantum quatuor; dicitur etiam trijugum, quadrijugum, etc., a numero foliolorum.

*Bilobum*, vide *Lobatum*.

*Bilocularis*, vide *Loculamentum*.

*Binatum* folium, vide *Digitatum*.

*Bipartitum*, vide *Partitum*.

*Bipinnatum*, vide *Pinnatum*.

*Biternatum*, vide *Ternatum*.

*Bivalvis* : corolla graminum, constans petalis duobus, ex quibus interior semper est angustior et minor; sub ipsâ florecentiâ aperiuntur; aliâs sunt clausæ. *Bivalvis* gluma, vide *Gluma*.

*Botanica* : pars historiæ naturalis tradens de cognitione regni vegetabilis : fundamentum scientiæ duplex statuit Linnæus, dispositio scilicet et denominatio.

*Brachiæ* sunt arborum rami crassiores, unde *Brachiatus* dicitur caulis qui ramos decussatim oppositos habet : *Brachialis* mensura ab axillâ ad apicem digiti crassioris. *Pedes duo circiter*.

*Bractea* : dicitur folium in floris viciniâ semper nascens, e substantiâ mediâ corticis proveniens; colore et figurâ a ceteris recedit, ut pro perianthio in quibusdam plantis facile assumi potest, ut in helleboro, etc., etc. differt tamen quod perianthium, maturo fructu, si non prius marcescat, bractea non idem. *Bracteatus* dicitur pedunculus bracteis instructus.

*Brevis* : petiolus longitudinem folii non attingens : *Brevissimus*, dum folio multoties brevior : *Brevissima* filamenta, corollâ multoties breviora.

*Bulbus* : hybernaculum, ubi planta in compendium reducta, tecta et contracta, inter suâ extrema folia, ut ab aëris injuriâ conservetur; cui plantæ, nihil amplius deest quam vis se extendendi : bulbus a gemmâ non differt nisi quod eorum tunica evadant succulentæ, a copioso nutrimento quod e terrâ cui innascitur, hauriunt : bulbus dicitur solidus, si intus indivisus, constet substantiâ solidâ; squamosus, id est constans squamis seu lamellis imbricatis : tunicatus, e tunicis numericis : articulatus, e lamellis catenulatis. *Bulbiferus* caulis in axillis foliorum bulbos gerens. Notandum plantas hujus cohortis semina non maturare, nisi bulbî destruantur ut in lilio bulbifero, dentaria, etc. videre est.

*Bullatum* folium fit ex rugoso, cum discus contractione rugarum ascendat; folium ab altera parte fit concavum.

## C.

**CADUCA** corolla et *Caducus* calix; ad explicationem floris tantum persistens. *Caducum* folium, quod brevi decidit, nec per integrum æstatem permanet.

**Calcar**: nectarii species ex corollâ pone in conum extensâ.

**Calicinæ** vocantur plantæ quorum flores calicis sunt instructi.

**Caliculatus** calix, ubi series brevior et diversa foliorum basin calicis exterius cingit.

**Calyptra**, calix muscorum; est operculum cuculatum, genitalia tegens et antheræ superimpositum.

**Calyx**: tegumentum exterius floris, e substantiâ corticis plantæ internâ, cui liber proximus, in fructificatione præsentē. Septem numerantur species: perianthium, scilicet, involucrum, amentum, spatha, gluma, calyptra, volva.

**Campanulata**: corolla monopetala, ventricosa, absque tubo, limbo dilatato ut campanula.

**Canaliculatum**: folium sulco profundo secundum totam longitudinem excavatum, fere in dimidiatum cylindrum.

**Capillus** mensura est diametri crinis, sive lineæ pars duodecima: *Capillaris* aut *Capillaceus* dicitur pappus radiis seu pilis indivisus.

**Capitatus**: flos compositus ex flosculis tubulosis, et formam sphaeralem referens ut carduus, cynara, etc.

**Capitulum** constat floribus pluribus, in capitulum ferme congestis. *Capitulum* muscorum est anthera-

**Capsula**: pericarpium membranaceum, cavum, siccum, coreaceum aut lignosum, determinate valvis dehiscens; constat: 1.<sup>o</sup> valvis, 2.<sup>o</sup> loculamentis, 3.<sup>o</sup> dissepimento, 4.<sup>o</sup> seminibus, 5.<sup>o</sup> proprio receptaculo, 6.<sup>o</sup> columellâ.

**Carina**: petalum infimum floris papilionacei, sæpius bipartitum, sub vexillo et intra alas collocatum, cymbiforme, concavum, compressum, situ natantis cymbæ basi mutilatum, cujus pars inferior extenditur in unguem, longitudinis calicis, receptaculo insertum: laciniae autem laterales et superiores; breviores implicantur cum alarum parte conformi: *Carinatum* dicitur folium cujus pars prona seu inferior disci prominet longitudinaliter.

**Carnosum**: folium interne repletum pulpâ succulentâ solidiusculâ.

*Cartilagineum* : folium ejus margo firmatur cartilagine a substantiâ folii diversissimâ.

*Castrata* , dicuntur stamina antheris destituta.

*Cauda* : filum nudum seu plumosum ; semen terminans quod *Caudatum* dicitur.

*Caudex* adscendens, dicitur truncus arborum ; descendens autem vulgo radix vocatur.

*Caulescens* : planta caule instructa.

*Caulinum* : folium cauli , non ramo insertum. *Caulinus* bulbus , insidens axillis caulis : *Caulinus* pedunculus qui cauli non ramo insidet.

*Caulis* : truncus proprius herbæ ; elevat folia et fructificationem.

*Cerealìa* , dicuntur semina majora graminum , quæ quotidie hominibus in cibum veniunt : oryza , triticum , secale , hordeum , etc. excepto forte lolio.

*Cernuus* pedunculus, cum apice incurvatur ut flos ; versus latus vel terram nutet, nec poterit erectus attolli ob strictam curvaturam pedunculi.

*Cespitosa* planta, cum multi caules ex eâdem radice prodeunt : *Cespitosa* loca dicuntur, paludes refertæ humo, mixtæ sphagno, tectæ tuberibus, cinctæ aquâ limosâ profundâ.

*Ciliatum* : folium ejus margo setis parallelis longitudinaliter obvallatur.

*Circinalia* seu spiralia folia, quum deorsum spiraliter involvuntur.

*Circumscissa* : capsula quæ, maturo fructu, horizontaliter dehiscit.

*Circumscriptio* considerat periphæriam folii simplicis absque sinubus et angulis.

*Circumsepiens* , vide *Somnus*.

*Cirrhus* : vinculum filiforme spirale, quo planta alio corpori alligatur, ut vitis vinifera, etc. *Cirrhosum* folium dicitur, quod cirrho terminatur.

*Classis* est generum plurium convenientia in partibus fructificationis, secundum principia naturæ et artis.

*Clavatus* ; pedunculus clavæformis, seu versus apicem sensim incrassatus.

*Coadunata* : folia quæ invicem annectuntur, ut plura inter se basi concrecant.

*Coalitæ* : antheræ in unum corpus concretæ ut in syngenesiâ : *Coalita* filamenta ut in monadelphîâ, etc.

*Coarctata* dicitur panicula cum pedicelli culmo approximantur : *Coarctati* rami vel pedunculi, versus summitatem fere incumbentes.



*Coeus* : pericarpium constans ex duobus aut pluribus conceptaculis siccis et elasticis.

*Coloratæ* dicuntur omnes partes plantarum quæ alium quam viridem colorem induunt : color mire ludit, hinc in differentiâ non admittendus.

*Columella* : capsulæ pars, connectens parietes internos cum seminibus.

*Columniferæ* dicuntur plantæ quarum antheræ in unum corpus sunt coalitæ, ut in mohadelphiâ.

*Coma* constat bracteis quæ caulem terminant, magnitudine insignes, ut in salviâ, fritillariâ, etc., etc.

*Commune* : perianthium aut receptaculum connectens cingensque plures flosculos et fructus, ita ut si aliqui eximantur, irregularitas caussetur; tale in floribus compositis reperitur : *Communis* petiolus, plura quam unum folium adnectens : *Communis* pedunculus, pluribus floribus communis.

*Compactum* folium constat substantiâ solidâ.

*Complectus* dicitur flos simplex vel compositus gaudens calice, corollâ, staminibus et pistillis.

*Composita* fructificatio, constat pluribus flosculis confluentibus; *Composita* spica, pluribus spicillis pedunculo insidentibus : *Composita* umbella, cujus pedunculi omnes umbellulas gerunt.

*Compositum* folium, petiolo plura quam unum folium proferente. *Compositus* flos continet plures flosculos monopetalos, sessiles, receptaculo communi integro, et perianthio contentos, sed instructos antheris quinque in cylindrum connatis, et germen monospermum proprium sub singulo flosculo. *Compositus* : caulis, racemus in ramulos plures divisus. *Compositus* : pappus, radiis seu pilis ramosis instructus.

*Compressa* dicitur siliqua lateribus oppositis proxime ad se invicem accedentibus : *Compressum* folium quod comprimitur a lateribus marginalibus ut substantia folii major fiat quam discus.

*Compressus* caulis, duobus lateribus oppositis fere planis.

*Concavum* folium, cum margo folii arctior sit quam ut discum circumscribat, unde discus deprimitur.

*Conceptaculum*, vide *Folliculus*.

*Conduplicans*, vide *Somnus*.

*Conduplicata* corolla, aut *Conduplicatum* folium dicitur, cum latera petali vel folii sibi invicem approximantur.

*Conferta* folia, cum ita copiosa ut ramos occupent totos,

- vix relicto spatio. *Conferta* radix dicitur eâdem ratione. *Confertus*, verticillus pedunculis approximatis. *Confluentia* : folia ad basin inter se coherentia. *Conglobatus* flos. Idem quod *Aggregatus*. *Conglomerati* pedunculi aut flores, cum pedunculus ramosus flores ferat brevissimis pedicellis, absque ordine arcu congestos et compactos. *Congregatus* flos. Idem quod *Aggregatus*. *Coniferi* dicuntur vegetabilia quorum fructus conum referunt. *Connata* dicuntur folia opposita, basi in unum connexa. *Connata* filamenta, *Connatae* antherae; idem quod coalita. *Connivens* : corolla cujus lobi limbi apicibus convergunt. *Connivens* somnus, vide *Somnus*. *Contorsio*, *Torsio* vel *Intorsio* : est flexio partium plantae versus alterum latus; dextrorsum vel contra motum solis, id est quod respicit sinistram si ponas te ipsum, in centro constitutum, meridiem aspicere; sinistrorsum, vel secundum motum solis, itaque contrarium. *Contortum* : pericarpium quod spiralliter contorquetur. *Contracta* panicula; vide *Coarctata*. *Contrarium*, vide *Dissepimentum*. *Convexum* : folium in disco magis elevatum. *Convolutum* dicitur folium cum margo unius lateris, circumambit alterum marginem ejusdem folii, instar cuculli. *Convolutus*, cirrhus in annulos contortus. *Conus*, vide *Strobilus*. *Corculum* : primordium novae plantae, intra semen; constat plumulam et rostello. Vide *Semen*. *Cordatum* : folium ovatum, basi sinu excavatum, destitutum angulis posticis : *Cordato-lanceolatum* : folium lanceolatum, angulis posticis obtusis, basi excavatum : *Cordato-oblongum* : folium oblongum angulis posticis obtusissimis, basi excavatis. *Cordato-sagittatum* : folium sagittatum, marginibus versus angulos, convexis. *Corolla* dicitur pars illa temporaria plantae, quae vulgus florem nominat quippe ob colorem et odorem maxime sensus attrahit et delectat : ad floris essentiam tamen non immediate pertinet, namque tegumentum interius partium generationis tantum constituit, ex albarno plantae in fructificatione presente : ex numero, figurâ, situ et proportionem petalorum corollam constituentium, nascuntur florum differentiae, ex quibus Tournefortius construxit plantarum classes et sectiones, quae differen-

tiæ, licet in systemate sexuali non summi sint momenti, plane prætermitti non possunt ob usum quem habent in describendis plantis et construendis generibus.

Corolla dividitur in regularem et irregularem, quæ primaria divisio subdividitur in monopetalam et polypetalam. Prima agnoscit corollam campanulatam, infundibuliformem, rotatam, hypocrateriformem, labiatam, personatam, etc. Sub alterâ militant corollam rosaceam, liliaceam, cariophylleam, papilionaceam, etc. *Corollula* dicitur corolla partialis floris compositi.

*Corona* aut *Coronula* seminis: est caliculus semini adherens, et quo volitat, unde *Coronatum* dicitur semen quod, vel pappum, vel setas hispidas supra adfixum habet.

*Cortex* est pars exterior cujuscumque vegetabilis, constans compagine fibrillarum lignearum, laxiori intervallo dispositarum; intervalla explent utriculi, quorum extimi, patentibus suis oris connascentibus, *Cuticulam* faciunt: proximus cortici est liber, a quo quotannis separatur, et ligni diameter auget, quod componatur pluribus fibrillarum ordinibus arctius digestis, paucioribus utriculis: in quibusdam sequitur *Albuminum*, quod fit fibrillis et utriculis firmitus et densius quam in libro, connexis, sed latius quam in ligno.

*Corymbus* est congeries florum, quorum singuli petiolis propriis instruuntur, situ elevato proportionali. *Corymbiferae* vocantur plantæ corymbo instructæ.

*Cotyledon*: corpus laterale seminis, constans substantiâ farinaceâ ex utriculis, vasis succosis et aëreis, in glomeres parvos coactis; una est, vel duplex, et placenta sive medulla, valva aut lobus etiam vocatur; prima ex humo apparet et mox decidit: Rajus, Jussieus, Hallerus, per cotyledones, vegetabilia in classes disponere voluerunt. Nominabant *Acotyledones* plantas ubi carebant, ut filices, musci, etc.; etc. *Monocotyledones*, plantas unico cotyledone germinantes ut gramina, palmæ, liliaceæ. *Dycotyledones*, ubi duo numerabantur, uti fabæ, pisa, amygdali, etc.

In tali systemate, plantæ sunt examinandæ ab exitu terræ ad casum seminis, quod nisi summâ difficultate peragitur in plurimis, aquaticis, ex. gr., et exoticis in hortis non germinantibus.

*Crenatum*: folium, margine incisuris, sine respectu extremitatis, secto, unde *Acute* vel *Obtuse Crenatum* dicitur; et *Duplicato-Crenatum*, crenisscilicet iterum crenatis.

*Crispum*, folium dicitur cum periphæria folii major evadit quam discus admittit ut undulatum fiat : folia crispa omnia sunt monstra.

*Cruciformis* flos, vide *Tetradynamia*.

*Cryptogamia*: classis ultima in systemate linneano, continens vegetabilia quorum fructificationes oculis nostris se subtrahunt et structurâ ab aliis diversâ, gaudent: ordines hæc classis constituit quatuor, filices scilicet, musci, algæ et fungi.

*Cubitus*: mensura a flexurâ cubiti ad extimum apicem digiti intermedi (uncie septem). *Cubitalis*, quod cubiti altitudinem attingit.

*Cuculatum*: folium ejus latera versus basin arcute con-  
nivent, supernè verò dilatantur.

*Culmus*: truncus proprius graminum elevans folia et fructificationem, sæpius geniculatus articulis inanibus.

*Culmiferæ* dicuntur plantæ culmi instructæ.

*Cuneiforme*: folium ejus diameter longitudinalis superat transversalem et sensim versus basin angustatur.

*Cuspidatum*, folium terminatum apice setaceo rigidiusculo.

*Cuticula*, vide *Cortex*.

*Cyathiformis*: corolla cylindrica supernè parum dilatata.

*Cylindrica*: spica cylindriformis seu teretiuscula.

*Cyma* est species receptaculi continens flosculos quorum pedunculi primarii fastigiati ex eodem puncto seu centro educuntur, posteriores vero sparsos habens.

*Cymosus* vocatur flos cymam affectans.

*Cynarocephalus* flos, vide *Capitatus*.

## D.

*DECANDRIA*: classis decima in systemate linneano, continens plantas in quarum floribus, stamina decem numerantur.

*Decagynia*: ordo decimus classis ejuscumque systematis linneani a primâ ad duodecimam inclusive; continens plantas quarum flores pistillis decem gaudent.

*Decaphyllus*, vide *Monophyllus*.

*Decafidus*: calix monophyllus in decem laciniis divisus.

*Decidua*: corolla ante maturitatem fructus cadens. *Deciduum*, folium, peractâ unicâ æstate, casurum.

*Declinatum*: folium deorsum flexum, instar carinæ naviculæ. *Declinatus* caulis arcuatim descendens.

*Decomposita* umbella, si ex umbellulâ simplici, aliæ enascuntur umbellulæ. *Decompositus* flos, id est, com-

positus ex compositis, continet intra calicem communem, minores calices multis floribus communes. *Decompositum* folium, cum petiolus semel divisus adnectit foliola plura.

*Decumbens*: flos cujus stamina et pistilla ad latus inferius sunt declinata.

*Decurrens*: petiolus lateribus deorsum per caulem vel ramum extensis. *Decurrens* dicitur folium cum basis deorsum per caulem extenditur.

*Decursive-Pinnatum* dicitur folium pinnatum, foliolis per petiolum decurrentibus.

*Decussata*: folia per oppositionem ita disposita, ut si planta apice inspiciatur, folia quadrifariam vergunt.

*Dedaleum*: folium flexuosum et lacerum.

*Deflexi*: rami arcuatim deorsum inclinati.

*Defoliatio* est tempus autumnale quo arbores folia dejiciunt, eoque indicant progressum autumnus, et hiemis insequentis. *Fraxinus* inter primas defoliatur, et inter ultimas frondescit.

*Dehiscentia*: tempus quo fructus maturus semina dispergat.

*Deltoideum*: folium rhombeum ex quatuor angulis quorum laterales minus a basi distant quam reliqui.

*Demersum*: folium quod infra aquæ superficiem absconditur.

*Denominatio* est alterum botanices fundamentum; factâ dispositione, nomina primum imponat. Longum foret enuntiare leges secundum quas denominatio institui debet: hæ sunt legendæ in Linnei *Criticâ botanicâ*.

*Dentatum*: folium quod acumina horizontalia consistentia, foliispatio remota habet: *Dentata*; radix moniliformis, ex articulis concatenulatis.

*Denudatæ* dicuntur plantæ quorum flores absque foliis apparent, ut sunt Colchicum, Crocus, Bulbocodium, etc.

*Dependens*: folium quod rectè terram spectat. *Dependens*, vide *Somnus*.

*Depressum*: folium pulposum, disco magis quam ad latera complanatum.

*Descendens* caudex, id est radix.

*Descriptio* est character naturalis totius plantæ qui describit omnes ejus partes externas: descriptio compendiosissimè, tamen perfectè, terminis tantum artis, si sint sufficientes, partes depingat secundum numerum, figuram, proportionem et situm: descriptio ordinem nascendi sequatur et partes distinctas in distinctis paragaphis tradât. *Linn. Phil. bot.*



*Determinatio* foliorum non à propriâ structurâ sed à loco, situ, insertione et expansione desumitur.

*Dextrorsum*, vide *Contorsio*.

*Diadelphia* continet flores quorum stamina filamentis in duo corpora sunt conata : classem decimam sextam in systemate linneano occupant, et papilionaceæ à Tournefortio, leguminosæ a Rajo, nominantur : classis hæc naturalissima est et inter omnes, singularis structurâ floris, vide *Corolla papilionacea*.

*Diagnosis* plantæ consistit in affinitate generis et discrimine speciei.

*Diandria* exprimit classem secundam systematis sexualis, continens plantas ubi stamina duo in quoque flore numerantur.

*Dichotomus* : caulis bifariam semper divisus.

*Diclinia* : flores masculi et feminei in eâdem specie, sed distinctis talamis gaudentes : comprehendit monæciam, diæciam et polygamiam.

Flores hujus familiæ ut plurimum prodeunt ante germinationem foliorum ne pistilla tegant.

*Dicocca*, vide *Dydima*.

*Dicotyledones*, vide *Cotyledones*.

*Dysula* seu *Dicocca* : capsula duobus nodis extus gibba.

*Dydima* etiam dicitur anthera duobus globulis distinctis latere connatis; ut Mercurialis.

*Didynamia* classem decimam tertiam constituit, cujus character essentialis consistit in staminibus quatuor, quorum duo proxima breviora, conniventia, cum stylo unico pistilli, intra corollam inæqualem recepta. Flores hujus familiæ parùm ad angulum acutum sunt inclinati, quo corolla facilius tegat antheras ne pollen a pluvîâ combibatur; labiati et personati à Tournefortio vocantur. Vide *Gymnospermia* et *Angiospermia*.

*Difformia* : folia in eâdem plantâ, diversæ figuræ, ut videtur in Ranunculo heterophyllo. *Difformis* corolla, aut flos, id est, irregularis.

*Diffusus* : caulis ramis absque ordine patentibus. *Diffusa* panicula dicitur, cum pedicelli laxè divaricantur in angulis rectis seu obtusis.

*Digitatum* : folium cujus petiolus simplex plura adnectit foliola; unde *Binatum*, si foliolis tantum duobus; *Trinatum*, *Quinatum*, etc. dicitur folium ex tribus, quinis, etc., foliolis, constans.

*Digynia*, vide *Monogynia*.

*Diæcia* : character hujus consistit in differentiâ indivi-

dualis sexûs, omninò ut in animalibus: quum scilicet flores masculi et feminei in distinctis plantis sunt positi; itaque femina, absente mare, speciem suam per semina propagare nequit.

*Dimidiata*: spatha latere tantum interiore, fructificationem obvestiens. *Dimidiatum*, capitulum, ab altero latere rotundum, ab altero planum. *Dimidiatum*, involuerum extrorsum tantum positum.

*Dioica*, vide *Diœcia*.

*Diphyllus*: calix ex duabus constans partibus, ut in Papavere, etc. *Diphyllus*, pedunculus foliolis duobus oppositis instructus.

*Directio* foliorum, est expansio quam folia acquirunt à basi ad apicem.

*Discus* floris: in flore composito radiato, pars media ex corollulis minoribus regularibus constans. *Discus* folii dicitur pagina seu superficies superior.

*Dispositio*: primum botanices fundamentum; est methodus quâ vegetabilia disponuntur in classes, ordines, genera et species: ad artem faciliorem et gratiorem reddendam, cultores allicendam, multum contribuit. *Dispositio* primaria à solâ fructificatione desumenda. *Linn. Phil. bot.*

*Dissectum* folium dicitur quod laciniatum aut incisum.

*Dissepimentum* est paries quo fructus interne distinguitur in concamerationes plures. *Dissepimentum contrarium* dicitur, ubi angustius est quam valvulæ, undè concavæ evadunt: *parallelum* verò audit cum latitudine et diametro transversali accedat ad valvas.

*Disperma*, vide *Monosperma*.

*Distans*: verticillus, pedunculis remotis.

*Disticha*: folia, duo latera rami tantum respicientia, licet undique inserta. *Disticha* spica floribus ad utrumque latus spectantibus, undè tetrasticha, hexasticha, à numero ordinum. *Distichus* caulis dicitur cum ramos situ horizontali sitos nec decussatim, exerit.

*Distinctæ*, antheræ inter se non cohærentes.

*Divaricata* dicitur panicula, cum pedicelli strictè divaricantur ad angulum rectum sive obtusum. *Divaricati* dicuntur rami, à trunco ad angulum obtusum discedentes.

*Divergens*, vide *Somnus*. *Divergens* ramus, à trunco ad angulum rectum discedens.

*Dodecandria*: classis undecima in systemate sexuali, continens plantas in quarum floribus stamina duodecim ad novemdecim numerantur.

*Dodrans*, seu *dodrantal*is mensura, spatium comprehendit inter apicem pollicis et digiti minimi extensi. *Unciæ novem*.

*Dolabrisforme*: folium compressum, subrotundum, obtusum, extrorsum gibbum, acie acutâ, inferne teretiusculum.

*Dorsalis*: arista lateri exteriori glumæ adfixa.

*Drupa*: pericarpium pulposum, è cortice vario, nonquam dehiscente, et putamine unico arcte cum suo cortice coherente, compaginata; estque sicca, vel succulenta.

*Duplicato-Crenatum*, vide *Crenatum*.

*Duplicato-Pinnatum*, vide *Pinnatum*.

*Duplicatus* calix, vide *Calyculatus*. *Duplicatus* flos, vide *Multiplicatus*.

*Duratio* foliorum respicit tempus à frondescentiâ usque ad eorum casum.

## E.

*Ebracteatus*: flos aut pedunculus bracteis destitutus.

*Echinatum*: pericarpium undique aculeis seu spinis adspersum.

*Efflorescentia* est tempus mensis quo singulæ species plantarum primos flores ostendunt, ex. gr., 1811, Bruxellis.

### FEBRUARI.

- 16. *Galanthus nivalis*.
- 20. *Alsina media*.
- 25. *Bellis perennis*.
- 26. *Primula acaulis*.
- 28. *Helleborus niger*.

### MARTIS.

- 3. *Tussilago Farfara*.
- 8. *Ranunculus ficaria*.
- 11. *Lamium purpureum*.
- 14. *Viola odorata*.
- 16. *Veronica agrestis*.
- 20. — *hederæfolia*.
- 24. *Helleborus viridis*.
- 27. *Tussilago alba*.
- 30. *Vinca minor*.

### APRILIS.

- 2. *Hyacinthus racemosus*.
- 5. *Veronica verna*.

- 7. *Narcissus Pseudonarcissus*.
- 10. *Anemone nemorosa*.
- 12. — *ranunculoides*.
- 15. *Primula officinalis*.
- 18. *Lamium album*.
- 20. *Ribes rubrum*.
- 23. *Leontodon Taraxacon*.
- 24. *Hyacinthus non scriptus*.
- *Ajuga reptans*.
- 27. *Cynoglossum omphalodes*.
- 28. *Anemone pratensis*.
- 29. *Cardamine pratensis*.
- *Chelidonium majus*.
- 30. *Pâris quadrifolia*.
- *Prunus Cerasus*.

### MAY.

- 1. *Viola canina*.

- 4. *Pollichia galeobdolon*.
- 5. *Syringa vulgaris*.
- 7. *Adoxa moschatellina*.
- 9. *Lychnis dioica*.
- 12. *Cheiranthus cheiri*.
- *Saxifraga tridactylides*.
- 15. *Veronica serpillifolia*.
- *Orchis maculata*.
- 18. *Pollichia amplexicaulis*.
- 21. *Solanum Dulcamara*.
- 22. *Valeriana dioica*.
- 24. *Rhinantus Crista galli*.
- 26. *Callitriche verna*.
- *Orchis latifolia*.
- 28. *Allium ursinum*.
- 30. *Iris pseudo-acorus*.
- *Geum urbanum*.

Nihil tamen minus constans, pro plantis vernalibus, cum citius aut tardius floreat pro hiemis rigore.

*Ellipticum*: folium cujus diameter longitudinalis superat transversalem, extremitate superiore et inferiore rotundè angustioribus.

*Emarginatum*: folium crenâ terminatum.

*Enerve*: folium nervis destitutum.

*Enneandria*: classis nona in systemate linneano, continens plantas novem habentes stamina in eodem flore.

*Enodis*: culmus continuus, nec articulis interceptus.

*Ensiforme*: folium anceps a basi ad apicem attenuatum.

*Epidermis*: membrana tenuis, elastica, ut plurimum, pellicula, corticem exterius obtegens.

*Equitantia* folia, quum latera folii parallelè connivent; ut interiora ab exterioribus includantur.

*Erecta*, dicitur anthera quæ filamento basi adfigitur:

*Erectum* folium, quod ad angulum acutissimum seu ad perpendiculum, cauli adsidet: *Erectus*, caulis aut culmus, situ perpendiculari articulis infimis, sæpè obliquis.

*Erosum*: folium sinuatum, sinubus minimis obtusis et laciniis inæqualibus instructum.

*Extrastolacei*: pedunculi vel stipulæ infra folium collocati.

## F.

*Farectum*: folium medullâ farectum, non tubulosum.

*Fasciata* dicitur planta cum plures caules conascuntur, ut unus ex plurimis instar fasciæ evadat compressus: idem fit arte, si plures caules enascentes, cogantur penetrare coarctum spatium, et partituri tamquam ex angusto utero; sic in Amarantho cristato observatur.

*Fascicularis*: radix e partibus carnosis basi sessili connexis.

*Fasciculata*, folia plura ex eodem puncto prodeuntia.

*Fasciculus*: capitulum colligens flores erectos, parallelos, approximatos.

*Fastigiati* flores cum pedunculi ita attollunt fructificationes in fasciculum, ut supernè æquales evadant altitudine, ac si horizontaliter detonsi essent: *Fastigiatus* dicitur caulis, ramis omnibus æquali altitudine.

*Faux* corollæ; hiatus inter lacinias corollæ ringentis, ubi tubus terminatur.

*Femina*: planta quæ flores tantum femineos seu solis pistillis instructos profert. *Femineus* flos, qui pistillum absque staminibus habet. *Feminea* genitalia sunt stigmata germinibus ubique adnexa.

*Fibrosa*: radix tota constans filamentis simplicibus aut ramosis.

*Filamentum* : pars floris elevans, adnectensque antheram.

*Filices* ordo primus cryptogamiæ constituunt; his frondes fructificantes sunt in adverso latere; calix, squamâ e folio enatâ, altero latere dehiscens, sub quâ globuli pedunculati annulo elastico cincti; qui elasticè ruptur effundens pulverem.

*Filiforme* : folium longissimum, latitudine et crassitie æquali. *Filiformis* pedunculus, æquali ubique crassitie.

*Fissum* : folium divisum sinubus linearibus marginibusque rectis : *bi-tri-aut-quadri-fidum*, etc., dicitur a numero fissurarum.

*Fistulosus* : caulis interne tubulosus, non fartus.

*Flaccidus* : pedunculus ita debilis ut a proprio floris pondere dependeat.

*Flexuosus* : caulis secundum articulos, seu a gemmâ ad gemmam horsum vorsum flexus. *Flexuosus* : pedunculus pariter a flore ad florem flexus.

*Florescentia* : generatio sistens plantarum sponsalia in flore, et nuptias in anthesi.

*Flos* : pars plantæ organum generationis continens et omnem fructum antecedens; partes florem ut plurimum constituentes, sunt calix, corolla, stamen et pistillum; inter has, stigma et anthera essentiam constituunt, quippe observantur flores absque calice, alii absque corollâ, sed nulli existere possunt simul stigmate, et antherâ carentes.

*Flosculus* dicitur flos partialis floris aggregati aut compositi.

*Folia* : organum motus plantæ, e corticis substantiâ exterioriore formata. Non solum ut umbram præbeant sunt consideranda, sed in motu constituta, et pulmonibus animalium inverse respondentia, namque attrahunt et absorbent gaz carbonicum, et solis ope, perspirant oxygenium. Cum folia facillime differentiassubministrant considerantur secundum simplicitatem, compositionem, determinationem et durationem.

*Folium* florale, vide *Bractea*.

*Foliacea* : dicitur spica foliis interstincta. *Foliaris*, circius folio insidens.

*Foliatio* : est complicatio ea quam servant folia dum intra gemmam, aut asparagos plantarum latent; modos sequentes agnoscit. : 1.º involuta, 2.º revoluta, 3.º obvoluta, 4.º convoluta, 5.º imbricata, 6.º equitantia, 7.º conduplicata, 8.º plicata, 9.º reclinata, 10.º circinalia.

*Foliatus* : caulis foliis instructus.

*Foliolum*, dicitur folium partiale folii compositi.

*Foliosum capitulum*, foliis floribus intermixtis.

*Folliculus*: pericarpium membranaceum univalve, altero latere longitudinaliter dehiscens, proprio receptacula semina adfigens. *Folliculi* etiam sunt vasa aëre distenta.

*Fornicata* vocatur corolla si labium superius corollæ ringentis in modum fornicis sit arcuatum.

*Frondescentia* sive *vernatio*, est tempus quo singulæ species arborum gemmas explicare, et in folia erumpere incipiunt. Ex. gr., 1811, Bruxellis.

## MARTIS.

- 3. Ribes Uva crispa.
- 10. Sambucus nigra.
- 13. Ribes rubrum.
- 16. Syringa vulgaris.
- 20. Lonicera Caprifolium.
- 25. Sambucus laciniata.
- 28. Prunus spinosa.
- 30. Salix amygdalina.

## APRILIS.

- 2. Betula Alnus.
- 3. Carpinus Betulus.
- 4. Crataegus oxycantha.
- 5. Sorbus aucuparia.

- 7. Prunus Padus.
- 10. Tilia europea.
- 14. Acer Pseudo-platanus.
- 16. Viburnum Opulus.
- 20. Evonimus europæus.
- 23. Philadelphus Coronarius.
- 25. Tilia cordata.
- 27. Salix caprea.
- 29. Rhamnus Frangula.
- 30. Acer campestre.

## MAII.

- 1. Æsculus Hippocastanum.

- 2. Rubus fruticosus.
- 3. Pyrus communis.
- 4. Prunus Cerasus.
- 5. Ulmus campestris.
- 6. Populus alba.
- 8. — dilatata.
- 10. Betula Alnus.
- 12. Pyrus malus.
- 15. Juglans regia.
- 18. Fagus sylvatica.
- 20. Salix viminalis.
- 23. Fraxinus excelsior.
- 28. Quercus Robur.

*Frondosus flos*, vide *Prolifer*.

*Frons*: species trunci, filicibus propria, ex stipite in folium transeunte facta, fructificationes in aversæ folii parte gerens.

*Fructescentia* comprehendit tempus quo plantæ semina matura dispergunt.

*Fructificatio*: est actio plantæ generationi dicata, per quam se propagat et speciem novam sibi similem, gignit; fructificatio itaque est finis ultimus vegetationis, in quâ vis totius plantæ concentretur, antiquum terminans, novum incipiens: hujus instrumenta sunt: 1.º calix, 2.º corolla, 3.º stamen, 4.º pistillum, 5.º pericarpium, 6.º semen, 7.º receptaculum. Essentia fructificationis in flore et fructu consistit.

*Fructus* pars plantæ flori succedens et germen fœcundatum recondens ut ab actione externa non lædatur; quæ pars, quum semina ad statum maturitatis sunt producta, a plantâ sponte abscedit. Octo diversas habemus species fructus: 1.º capsula, 2.º siliqua, 3.º legumen, 4.º conceptaculum, 5.º drupa, 6.º bacca, 7.º pomum, 8.º strobilus.

*Frutex*, dicitur stirps cujus truncus lignosus plures producit ramos humiles, perennantes, absque gemmis.

*Fulcra* sunt adminicula plantæ, pro commodiore sustentatione, quibus licet privata, planta raro perit; septem numerantur: 1.<sup>o</sup> stipula, 2.<sup>o</sup> bractea, 3.<sup>o</sup> spina, 4.<sup>o</sup> aculeus, 5.<sup>o</sup> cirrhus, 6.<sup>o</sup> glandula, 7.<sup>o</sup> pilus. *Fulcratus* dicitur caulis aut ramus, fulcris instructus.

*Furcæ*; aculei ramosi, seu triplices, ut in Berberide, etc.

*Furcata* dicuntur setæ cum sint subdivisæ quasi in ramulos.

*Fungi* sunt corpora torosa, porosa aut lamellosa, quorum folia nec fructificatio, oculis nudis non perspicuntur. Ordo quartus cryptogamiæ occupant: Notitia harum fructificationum Michelio debetur, in *Novis Plantarum Generibus*.

*Fusiformis*, radix simpliciuscula oblonga crassa, versus basin sensim attenuata; hujus speciei sunt *Daucus Carota*, etc.

G:

*GALEA* vocatur labium superius corollæ ringentis.

*Gemma*: hybernaculum caudici insidens, occultans, custodiensque squamis, ab aëris sævitia, per hiemem, primordium futuræ herbæ: cum omnis gemma medullæ per corticem protrusæ ortum debet, crescit planta per gemmam uti polypus, adeoque planta nova dici nequit, sed continuata. Gemma dicitur stipularis, dum e stipulis confecta, 2.<sup>o</sup> petiolaris, e rudimentis petiolorum, 3.<sup>o</sup> corticalis, e corticis ramentis, 4.<sup>o</sup> foliaris, si folia contineat, 5.<sup>o</sup> floralis, flores continens, 6.<sup>o</sup> communis, si flores et folia simul includat.

*Gemmatio*, est gemmæ constructio ex foliis, stipulis, petiolis, squamis, etc.

*Gemina*: folia duo ex eodem puncto prodeuntia. *Bigemina* dicuntur si petiolus dichotomus apicibus adnectit foliola quatuor.

*Generatio* vegetabilium fit mediante pollinis antherarum, elapsum supra stigmata nuda, quo rumpitur pollen, efflatque auram seminalem quæ absorbetur ab humore stigmatis.

*Genicula* sunt nodi in culmo articulis interjecti. *Geniculata* arista, articulatione instructa, ut in *Agrostide canina*. *Geniculatus*; culmus articulis intercepius.

*Genitalia* plantarum organa sexualia, sunt antheræ et stigmata.



*Genitura* plantarum, est pollen antherarum.

*Genus* constituit conjunctionem plurium specierum in partibus fructificationis inter se convenientium : licet genus plurimis speciebus sæpius componatur, unicâ tamen specie constare potest ut *Butomus umbellatus*, *Humulus Lupulus*, etc.

*Germen*, seu *Ovarium* : rudimentum seminis immaturi in flore existens, estque inferum, hoc est, infra corollam positum, vel superum, hoc est, corollâ inclusum.

*Germinatio* : tempus quo semina terræ mandata, eadem excludunt in cotyledonum proventum; germinatio fit dispersis seminibus, per hilum absorbentibus aquam, unde rumpuntur membranæ a hibulis tumentibus cotyledonibus, corculum lactantibus, usque dum fœtus rostellum radículas exerat, quo erigatur plumula accrescens in herbam anni terminatam gemma supradecomposita.

*Gibbum* : folium utrâque superficie convexa, mediante copiosiori pulpâ.

*Glaber* : caulis superficie lævi et lubrica. *Glabrum* folium, superficie lævi et absque omni inæqualitate.

*Glandula* est papilla humorem melleum excernens, estque sessilis vel stipitata, petiolaris, foliacea, stipularis, capillaris vel pori : *Glandulatio* offert vasa secretoria.

*Glandulosum* dicitur folium quod glandulas insidentes gerit vel in dorso, vel in serraturis, vel circa petiolum.

*Globosa* dicitur corolla, vel radix subrotunda vel globum referens. *Globosum*; capitulum ab omni parte rotundatum.

*Glochides* dicuntur mucrones apice retrosum multidentati.

*Glomerata* : spica verticillis varie congesta.

*Gluma* : calix graminum, constans valvis amplexantibus, sicciore, scariosæ, ut plurimum incoloratæ seu virides.

*Glumosus* : flos aggregatus, receptaculum filiforme habens, cujus basis instruitur glumâ communi uti *Brumus*, *Festuca*, *Poa*, etc., etc.

*Glutinosus* : folium humore lubrico illitum.

*Gradus* foliorum considerant subdivisionem petioli communis in compositis, decompositis, et supradecompositis.

*Graminea* : folia linearia, sensim versûs apicem angustata, constans vaginâ, folio et ligulâ.

*Granulata* : radix particulis sphaericis carnosis adspersa.

*Gymnospermia* : ordo primus dydinamiæ continens plantas quorum semina quatuor nuda, in sinu calicis tam-

quam capsula sunt recondita; flores hujus cohortis, a Tournefortio labiati vocabantur.

*Gynandria* : continet plantas quorum stamina insidunt ipso stylo, vel receptaculo elongato in formam styli, pistillum in partem transeunte : flores hujus classis in-adsuetam præ se ferunt faciem, quod a situ partium fructificationis oritur.

## H.

*HABITATIO* plantarum ex loco patescit ubi sponte prognascuntur, et respicit solum seu telluris naturam.

*Habitus* est conformitas vegetabilium affinium et congenerum, in placentatione, radicatione, ramificatione, intorsione, gemmatione, foliatione, stipulatione, glandulatione, pubescentiâ, lactescentiâ, inflorescentiâ, aliisque : quamvis habitus non sit sufficiens, tamen primo intuitu plantam sæpius manifestat.

*Hami* : mucrones acuminati, curvati, quibus quædam plantarum partes adhærent animalibus prætereuntibus.

*Hastatum* : folium triangulare basi lateribusque excavatis, angulis patulis.

*Heptandria* continet plantas in quorum floribus stamina septem numerantur.

*Herba* dicitur planta cujus caulis quotannis perit; constat hybernaculo, trunco, folio, et fulcro. *Herbaceus* dicitur caulis annuus, non lignosus.

*Herbarium* : collectio plantarum siccatarum, intra chartas asservatarum : cum præstat omni icone, necessarium est omni botanico; in folio semper asservandum, unica planta in paginâ, fructificatione præsentem, et ad methodum disponeri debet.

*Hermaphrodita* dicitur planta in quorum floribus stamina, unâ cum pistillis inveniuntur : maxima pars vegetabilium ita construitur, nam plantæ loco suo immotæ insidunt, nec migrando conjugem quærere valent.

*Heteromala* panicula, vide *secunda*.

*Hexandria* comprehendit plantas quorum flores continent stamina sex; quæ inter se invicem nullam determinatam proportionem longitudinis habent, nam si ex his, stamina duo opposita essent breviora, plantam ad tetradynamiam pertineret.

*Hexapoda*, vide *Orgya*.

*Hilum* : cicatrix externa seminis ab ejus affixione in fructu.

*Hispidum* : folium setis rigidis adpersum.

*Horizontale* : folium quod ad angulum rectum a caule discedit.

*Horizontalis* : radix quæ sub terrâ transversim extenditur.

*Hybernaculum* est pars plantæ includens herbam et embryonem ab externis injuriis, antequam excrescit, estque bulbus vel gemma.

*Hybrida*, planta producta a fœcundatione stigmatum per pollinem peregrinæ speciei; hæ plantæ, fructificatione referunt matrem, herba verò potissimum patrem : interdum hybridæ sunt fertiles, interdum plane stiles, nam licet floreant, nulla tamen semina prodeunt.

*Hypocrateriformis* corolla : limbus planus, tubo impositus.

## I.

*ICOSANDRIA* plantas continet in quorum floribus communiter stamina viginti calicis lateri interno adnata numerantur. Una cum polyandriâ constituit.

*Imbricans*, vide *Somnus*.

*Imbricata* : folia, parallele superficie recta sibi invicem incumbentiâ, et se quoad partem tegentia : *Imbricatus* calix ex squamis variis imbricatis superimpositis.

*Imbricatus* dicitur caulis, squamis tectus, ut superficies non appareat.

*Incompletus* aut *imperfectus* : flos carens vel perianthio, vel corollâ, staminibus aut pistillis.

*Impari-pinnatum*, dicitur folium pinnatum foliolo impari terminatum.

*Impletio* florum, vide *Plenus Flos*.

*Inanis* : caulis internâ medullâ spongiosus.

*Inæqualis* corolla ubi partes non magnitudine, sed proportionem respondent, ut regularis flos evadat. *Inæqualia* filamenta, aliquot majoribus vel minoribus.

*Incanum* dicitur folium tomentosum, colore glauco et fere argenteo.

*Incisum* : folium dissectum, aut laciniatum.

*Includens*, vide *Somnus*.

*Incrassatus* : pedunculus apice sensim majorem molem acquirens.

*Incumbens* anthera quæ lateri filamento adfigitur.

*Incurvati* : rami introrsum nutantes : *Incurvum* folium, vide *Inflexum*. *Incurvus*, aculeus introrsum flexus.

*Indivisum* folium, vide *Integrum*.

*Inerme* : dicitur folium, spinis, aculeis et stimulis destitutum.

*Inferum* : germen infra corollam positum, *Inferus* flos, vel calix, cui germen supra receptaculum, vel ut ait Tournefort, cujus pistillum abit in fructum.

*Inflatum* : perianthium instar vesicæ cavum nec repletum seminibus.

*Inflexum* seu *incurvum* : folium sursum, arcuatim versus caulem, curvatum.

*Inflorescentia* est modus quo flores pedunculo plantæ adnectuntur; agnoscit : 1.<sup>o</sup> verticillus, 2.<sup>o</sup> capitulum, 3.<sup>o</sup> spica, 4.<sup>o</sup> corymbus, 5.<sup>o</sup> thyrsus, 6.<sup>o</sup> racemus, 7.<sup>o</sup> panicula.

*Infundibuliformis* : corolla cujus limbus conicus tubo imponitur.

*Insertio* foliorum respicit modum quo folia plantæ adnectuntur. *Insertus* dicitur petiolus perpendiculariter ramo insidens.

*Intiger* dicitur caulis simplicissimus, ramis angustatis vix ullis. *Intiger* dicitur calix absque divisuris. *Integrum*, folium indivisum, omni sinu destitutum : *Integerrimum*, folium cujus margo extimus intiger absque omni crenâ.

*Interfoliacei* flores inter folia opposita, sed alternatim collocati.

*Internodum* : quod inter artus vel genicula medium intercedit estque convexum, concavum vel planum.

*Interrupta* : spica, spicis minoribus alternis distantibus.

*Interrupte-pinnatum*, folium pinnatum, foliolis alternis minoribus.

*Intorsio*, vide *Contorsio*.

*Intrafoliaceæ* : stipulæ supra folium seu petiolum collocatæ.

*Invertens*, vide *Somnus*.

*Involucrum*, calix umbellæ a flore remotum, et circumdans pedunculum communem : distinguitur ab *Involucellâ*, vel *Involucrum partiale*, quia hoc umbellulæ tantum est subjectum : *Involucratus* dicitur verticillus, involuero instructus.

*Involuta* : folia quorum margines laterales utrinque introrsum spiraliter involvuntur.

*Involvens*, vide *Somnus*.

*Irregularis* : corolla, nullæ symmetriæ subjecta, namque observatur unum vel alterum petalum profundius divisum, vel partes limbi, figurâ aut proportionem diversæ, ut *Digitalis*, *Veronica*, etc.

*Isthmis* - *interceptum* dicitur legumen interne transversim in varia loculamenta divisum.

## L.

*Labiatus* : flos seu corolla ringens cujus labia hiant.  
*Lacera* dicitur corolla cujus limbus est tenuissime dissectus. *Lacerum*, folium quod margine varie sectum segmentis difformibus.

*Lacinia* corollæ, numerus in monopetalâ a medio limbi, in polypetalâ vero a medio laminæ desumitur : *Lacinia* calicis seu perianthii numerantur præsertim in monophyllo.

*Laciniatum* : folium in partes varie sectum, partibus itidem indeterminate subdivisis.

*Lactescentia* est copia liquoris qui effluit, læsâ plantâ, estque alba in *Euphorbio*, *Papavere*, *Campanulâ*, etc., lutea in *Chelidonio*, rubra in *Rumice sanguinea*, etc.

*Lacunosum* : folium disco depresso inter venas interjectas.

*Lævis* : caulis aut folium superficie æquali.

*Lamellæ*, sunt membranæ transversæ, fructificantes, pileo fungorum subtus adnatæ.

*Lamina* : corollæ polypetalæ pars superior patula.

*Lana* : species pubis pili curvi. densi; servat plantas ab æstu nimio. *Lanatum*, folium pilis incurvis imbricatis, quasi telâ aranæ indutum.

*Lanceolatum* : folium oblongum, utrinque sensim versus extremitatem attenuatum. *Lanceolato-ovatum* dicitur folium lanceolatum ad ovatam figuram subaccedens.

*Laterales* : stipulæ lateribus petioli seu foliorum inserti.

*Laterifolii*, flores ad latus basæos folii inserti.

*Laxa* : panicula cujus pedicelli debiles, libere et laxè sine ordine sparsi. *Laxi* dicuntur etiam rami, libere in arcum flexiles.

*Legumen* : pericarpium membranaceum bivalve adfigens semina, secundum suturam alteram tantum, estque *Uni-vel-biloculare*, vel *Isthmis-interceptum*.

*Liber*, vide *Cortex*.

*Lignum* : materies constans fibris arctissime positis, et inter se connexis, quas perrumpunt utriculi pauciores et trachæ, alburno vel libro circumcepta, qui quotannis a cortice separatur et ligni diameteraugēt. *Lignosus* dicitur caulis ad ligni duritiem accedens.

*Ligula* : membrana tenuis oris foliorum in graminibus. *Ligulatus* dicitur flos compositus ex flosculis quorum corollulæ planæ tubis brevibus versus exterius latus sunt expansæ.

*Lilia-*

- Liliaceus** : flos apetalus, calice colorato; continet stamina sex vel tria; pericarpium constituit capsulam angulatam, trilocularem, trivalvem; radices sunt, vel bulbosæ; vel carnosæ, et folia semper integerrima.
- Limbus** : est corollæ monopetalæ pars superior dilatata.
- Linearis** vel **Linea**; est mensura longitudinis lunulæ ab unguis radice versus unguem, non vero in pollice.
- Lineare**, folium latitudinis ubique æqualis, interdum utrâque extremitate angustatur. **Lineari-lanceolatum**, folium lineare ad lanceolatam figuram accedens. **Lineatum**, folium nervis depressis excavatum.
- Lingulatum** vel **Linguiforme**: folium lineare, carnosum, subtus convexum, margine sæpius cartilagineo.
- Lobatum** : folium usque ad medium, in partes distantes divisum, marginibus convexis: *bi-tri-aut-quadri-lobum* dicitur à numero loborum.
- Loculamentum** capsulæ est concameratio vacua pro seminum loco: pericarpium dicitur *bi-tri-quadri-quinque-aut-multi-loculare*, à numero loculamentorum.
- Locus** in determinatione folii respicit partem plantæ quæ folium adnectitur.
- Longus**: dicitur petiolus longitudinem folii superans.
- Longissimus** dum longitudinem folii aliquoties superat.
- Lucidum** : folium quasi illuminatum.
- Lunatum** aut **Lunulatum**: folium subrotundum, basi sinu excavatum, angulis posticis acutis. *Lunulati* dicuntur rami arcuatim oppositi, ut lunam crescentem referunt.
- Luxurians** flos; tegumenta fructificationis ita multiplicat ut essentielles ejusdem partes, stamina scilicet et pistilla, destruantur, estque *multiplicatus, plenus, prolifer*, vel *mutilis*.
- Lyratum** : folium transversim divisum in lacinias, quarum inferiores, minores et remotiores; terminalis, maxima.

## M.

- MACULATUM** : folium in cujus superficie maculæ diversi coloris observantur, et quæ, ut plurimum, statum morbosum plantæ denotant.
- Marcescens** : corolla contabescens nec decidens.
- Margo** est extrema ora folii ad latera, intacto disco.
- Marginatum** dicitur folium margine colorato instructum.

*Mas* : planta quæ flores tantum masculos profert, id est, qui stamina sine pistillis aut stigmatibus continet.

*Masculina* genitalia sunt antheræ polline repletæ.

*Mediocris* : petiolus longitudine folii.

*Medulla* : substantia interna, inclusa, vivificans, omnis vegetabilis, basi deliquescens, apice adscendens, multiplicatione, divisibilitate, terminoque, infinita; in creatione accensa, à principio occulte festinat, lenteque versus minimam resistantiam ad summum suum exitum; quo verò corporeum coaretans debilius, eo claustra citius reserat, metamorphosin subitura, quæque evasura, sese cum corpore copulat ut in novas dispergenda vitas circulus perennet.

*Membranaceum* : folium quod inter utramque superficiem nullâ evidenti pulpâ scatet. *Membranatus* : caulis complanatus more folii.

*Mensura* in dimensione plantarum assumendâ à manu vel staturâ hominis desumpta, convenientissima est; agnoscit sequentes : 1.º capillus; 2.º linea; 3.º unguis; 4.º pollex; 5.º palmus; 6.º dodrans; 7.º spithama; 8.º pes; 9.º cubitus; 10.º brachium; 11.º orgya.

*Meteorici* solares flores, vide *Vigiliæ*.

*Monadelphia* continet plantas cujus stamina filamentis in unum corpus sunt coalita. Classem decimam quintam occupant.

*Monandra* : classis prima continens plantas in quorum floribus stamen unicum observatur.

*Monoclinia* : flores omnes hermaphroditi, seu stamina cum pistillis in eodem flore : comprehendit classes plantarum à monandriâ ad polyadelphiam inclusive.

*Monocotyledones*, vide *Cotyledones*.

*Monœcia* : comprehendit plantas, flores tantum androgynos absque hermaphroditis gerentes, id est, flores masculinos et feminæos distinctos, sed ex eadem radice prognatos.

*Monogynia* : ordo primus classium à primâ ad duodecimam, sic digynia, trigynia, tetragynia, pentagynia, polygynia, à duobus, tribus, quatuor, quinque aut multis pistillis dicuntur, et denotant ordinem secundum, tertium, quartum, quintum, vel ultimum cujuscumque classis.

*Monoïca* planta; vide *Monœcia*.

*Monopetalus* flos; vide *Petalum*.

*Monophyllus* : calix seu perianthium unico folio absolutum quoties corolla monopetala est : *di-tri-tetra-*

*penta-hexa-vel-decaphyllus* dicitur a numero foliorum constituentium.

*Monopyrenus* : fructus unicum tantum nucleum continens. Sic. *di-tri-tetra-poly-pyrenus*, si duo, tria, quatuor aut multos contineat nucleos.

*Monosperma* dicitur capsula unicum tantum semen includens, et *di-tri-tetra-penta-hexa-vel-poly-sperma*, si duo, tria, quatuor, quinque, sex aut multa semina contineat.

*Monostachius* : culmus unicam spicam gerens.

*Mucronatum* : folium mucrone extante terminatum.

*Multifidum*, vide *Fissum*.

*Multiflora* gluma, vel multiflorus calix, communis plurimis floribus.

*Multipartitum*, vide *Partitum*.

*Multiplicatus* dicitur flos qui corollam duplicat aut triplicat cum damno staminum, quæ exerescunt in petala; tamen, salvis quibusdam prædicatur, adeoque flos multiplicatus à pleno distinguitur quod semina perficit, licet corolla serie duplici, triplici aut quadruplici augeatur.

*Multivalvis* : gluma pluribus quam duabus squamis constans.

*Muniens*, vide *Somnus*.

*Muricatus* : caulis punctis subulatis, mollibus, adpersus.

*Musci* : sub hoc nomine botanici cognoscunt plantas cryptogamicas, capitulo membranaceo, polline refferto. Dividuntur secundum antheras calyptratas, aut non-calyptratas, in eodem vel distincto vegetabili, cum flosculis femineis aggregatis, aut solitariis.

Antheræ potius capsulæ sunt dicendæ, et earum pollen vera semina, cum in quibusdam vidimus intra opercula veras antheras polliniferas e filamento suo dependentes, apice dehiscentes, pollen dimittere in cilia tamquam in pistilla: semina sunt corcula nuda, absque tunicâ aut cotyledonibus, cum siccati reviviscant. Dillen hanc familiam absolvit.

*Mutica* : gluma mucrone, seu aristâ destituta.

*Mutilus* dicitur flos qui corollam non promit, quamquam eandem promere deberet: hoc autem plerumque fit à defectu sufficientis caloris.

## N.

*Natans* : folium superficiæ aquæ innatans.

*Nectarium* : pars mellifera, flori propria; estque pro-



- prium* vel *petalinum*; quam utilitatem floribus adfert, non adeo liquet: apparet tamen insecta ex hoc necitare alimentum quærentia, alas crebro vibrando, pollen antherarum excutere, et dispergere, quo facilius in stigma cadat.
- Nervosum*: folium venis simplicissimis, eminentibus, a basi ad apicem extensis.
- Neuter*: flos qui, nec stamina, nec stylum habet: in radio *Coriopsisidis* et *Rudbekiæ* talis videtur. Tamen proprie non est flos, sed tantum corolla ligulata.
- Nidulantia*: semina in pericarpio baccato absque ordine in pulpam sparsa.
- Nitidum*: folium glabritie lucidum.
- Nodus*, *Nodosus*: idem quod genicula et geniculatus.
- Nomen* in botanicis duplicis est generis, genericum scilicet, et specificum seu triviale. Primum integro generi commune est ut cognomen confratribus, secundum, unicâ tantum specie convenit, quo ab omnibus congeneribus distinguitur.
- Nucleus*: pars edulis fructuum in capsulâ osseâ recondita; uti *Amygdala*; etc., etc.
- Nudum*: capitulum foliis et setis destitutum. *Nudum*; folium setis destitutum. *Nudum*, receptaculum superficiei, nec villis, nec paleis tectum. *Nudus*: caulis foliis destitutus. *Nudus*: flos carens corollâ et calice, quod rarissimum. *Nudus*: verticillus, nec bracteis, nec involuero instructus.
- Nutans*: caulis apice extrorsum flexus. *Nutans* flos extrorsum reflexus non proprio pondere sed peculiari structurâ pedunculi, ut facilius secondetur; nam flos nutans semper pistillum staminibus longius gerit.
- Nux*: semen tectum epidermide osseâ, uni-vel-bilocularis, nucleum condens,

## O.

- Ob*: loco *obverse* dicitur, ex. gr., *ob-cordatum* pro *obverse-cordatum*: *ob-ovatum* pro *obverse-ovatum*.
- Obliqua*: calyptra ad aliquod latus flexa.
- Obliquum*: folium basi cælum, apice horizontem spectans. *Obliquus*: caulis discedens a perpendiculari aut horizontali lineâ.
- Oblongum*: folium, diametro longitudinali aliquoties superante transversalem, et utrâque extremitate segmento circuli angustius.

*Obtuse-crenatum*, vide *Crenatum*.

*Obtusum* : folium intrâ segmentum circuli terminatum.

*Obtusum* cum acumine, dicitur folium obtusum, nervo medio apice prominulo.

*Obversum* : folium quorum basis angustior evadit regione apicis, undè *obverse-cordatum* seu *obcordatum*; *obverse-ovatum* seu *obovatum*.

*Obvoluta* : folia cùm margines alterni comprehendunt marginem rectum folii oppositi.

*Octandria* : classis octava, ubi stamina octo numerantur in quoque flore.

*Operculum* (muscis) membrana claudens orificium antheræ supra ciliis, calyptrâ totâ aut semi-tectâ. Varias assumit figuras, obtusam scilicet, conicam, subulatam, arcuatam, rectam et obliquam.

*Opposita* : folia duo per paria decussatim e regione collocata. *Opposite-pinnatum*, folium pinnatum, foliolis oppositis. *Oppositifoliæ* : stipulæ in latere folii oppositi collocatæ. *Oppositifolii* : flores, folio e regione oppositi.

*Orbiculatum* : folium cujus diameter longitudinalis et transversalis, æquales, periphæriâ circinatâ.

*Ordo* est classium subdivisio ne plura genera distinguenda, simul et semel evadant, quam animus facile assequatur : facilius enim distinguuntur genera decem quam centum.

Ordines in systemate sexuali à pistillis desumuntur, præpositis numeris græcis mono-di-tri-tetragynia, etc., etc.; numerus desumitur à basi styli. Si autem stylus deficiat, à numero stygmatum fit calculus. In classe syngenesiæ, ordines à cæteris differunt. Vide *Syngenesia*.

*Orgya* : mensura hexapoda, seu altitudo humana; est mensura inter manus extensas. (*Pedes sex.*)

*Ovale* seu *Ellipticum* : folium cujus diameter longitudinalis superat transversalem, superiore et inferiore extremitate angustioribus.

*Ovatum* : folium cujus diameter longitudinalis superat transversalem, basi segmento circuli circumscriptâ, apice verò angustiore.

*Ovato-lanceolatum* : folium ovatum ad lanceolatam figuram accedens. *Ovato-oblongum*, ovatum ad oblongam figuram accedens. *Ovato-rhombeum*, folium ovatum et simul rhomboïdæum.

## P.

- PAGINA* dicitur superficies folii utraque, unde pagina superior et inferior.
- Palatum* corollæ, gibbositas prominens in fauce corollæ.
- Paleæ* sunt lamellæ receptaculo florum compositorum innatæ, flosculos et tandem semina, distinguentes; unde *paleaceum* dicitur receptaculum paleis instructum. *Paleaceus* pappus est membrana inæqualis, tenuis, apice seminis adfixa.
- Palmata*: radix carnosæ, lobata. *Palmatum*, folium longitudinaliter divisum in plures partes subæquales, basi tamen in unum cohærentes. *Palmus*, mensura diametri quatuor digitorum transversorum parallelorum dempto pollice. (*Unciæ tres*.)
- Panduræforme*: folium oblongum, inferne latius, lateribus coarctatis.
- Panícula* dicitur fructificatio sparsa, in pedunculis diverse divisis et subdivisis, estque æqualis vel secunda, diffusa vel coarctata. *Paniculatus* dicitur caulis ramis variè subdivisis, floribus numerosis.
- Papilionacea*: corolla ex quatuor petalis composita, quorum superius *Vepillum* vocatur et reliquis incumbit. *Alæ* utrinque carinæ lateribus adstant solitariae. *Carina* excipit et includit stamina et pistilla, constatque petalis duobus ut plurimum coadunatis.
- Papillosum*: folium tectum punctis carnosis, vesiculis.
- Pappus*: corona seminis pennacea vel pilosa, volitans. *Papposum* dicitur semen pappo tenuissimo, inæquali, instructum.
- Parabolicum*: folium cujus diameter longitudinalis superat transversalem, versus apicem sensim angustius, et rotundatum.
- Parasitica*: planta alteri stirpi, nec terræ, innata.
- Partialis*: pedunculus aliquot flores pedunculi communis proferens. *Partialis* umbella, vide *Umbellula*. *Partiale* involucreum, vide *Involucreum*.
- Partitum*: folium ad basin fere divisum; dicitur *bi-tri-multipartitum* à numero partium.
- Patens*: folium ad angulum acutum cauli insidens.
- Patula*: panicula, pedunculis pedicellisque undique dispersis, floribus remotis. *Patuli* dicuntur rami aut pedunculi ita dispersi ut remotos ferant flores. *Patulus* opponitur *Coarctato*.

*Pedalis* : mensura aut *pes*; mensuratur à flexurâ cubiti ad basin pollicis.

*Pedatum* : folium petiolo bifido, latere tantum inferiore adnectente foliola plura.

*Pedicellus* : pedunculus partialis seu proprius, floribus in pedunculo communi.

*Pedunculus* : truncus partialis elevans fructificationem, nec folia. *Pedunculatus* dicitur verticillus pedunculis flores elevantibus. *Pedunculus* muscorum est seta, plerumque colorata, antheram superne sustinens, basi tuberculatâ, nudâ, vel perichætio vestitâ.

*Pelta* (lichenibus), est fructificatio plana seu revoluta, margini vel apici folii adglutinata. *Peltatum* : folium cujus petiolus disco folii, non basi inseritur.

*Pennatus* : surculus in muscis, quum folia ad rachis latus utrinque adnexa, alternata vel opposita sunt.

*Pentandria* : classis quinta continens plantas stamina quinque in eodem flore habentes.

*Perenne* : folium per aliquot annos virens. *Perennis*, radix aut planta per plurimos annos regerminans.

*Perfectus flos*, vide *Completus*.

*Perfoliatum* : folium basi transversim caulem cingente, nec antice deliscente.

*Perianthium* : calix plantæ fructificationi contiguus. Differt a bracteâ, quod, maturo fructu, si non prius marcescat, folia floralia non idem : Agnoscit 1.<sup>o</sup> perianthium fructificationis, stamina et germen includens; 2.<sup>o</sup> perianthium floris, stamina absque germine continens; 3.<sup>o</sup> perianthium fructus, germen absque staminibus continens.

*Pericarpium* : viscus plantæ seminibus gravidum, quæ matura demittit. Paries quo pericarpium interne tegitur, vocatur *valva* aut *valvula*; unde *uni-di-tri-multi-valve* dicitur pericarpium.

*Perichætium* (muscis) dicitur congregatio foliorum angustiorum tuberculum setarum cingentium.

*Perpendicularis* : radix recta, descendens.

*Persistens* : corolla vel perianthium, ad maturitatem fructus : *Persistens* folium, peractâ æstate, non casurum.

*Personatus* flos; à Tournefortio vocatur corolla ringens cujus labia clauduntur et quorum semina sunt pericarpio tecta.

*Petalodes* vocantur flores petalis instructi.

*Petalum* dicitur quodque segmentum vel pars corollæ;

ex horum numero et figurâ Tournefortius composuit florum classes. Vocabat *monopetalus* flos corolla constans unico tantum petalo, sive regularis vel irregularis; *bipetalus*, ubi duo numerantur petala; *tri-tetrapenta-hexa* et tandem *polypetalus*, si flos ex tribus, quaternis, quinis, senis, vel multis constat petalis: *Petalinum* dicitur nectarium petalis insertum.

*Petiolus* : trunci species vel fulcrum adnectens et sustinens folium, nec fructificationem : *Petiolaris*, cirrhus petiolo insertus. *Petiolum* dicitur folium petiolo ad basin inserto.

*Pileus* fungorum est orbiculus horizontaliter expansus, subius fructificationem gerens, estque lamellosus, porosus vel echinatus.

*Piliferum* : folium apice in pilum desinens. *Pilus*, ductus excretorius plantæ setaceus. *Pilosum* folium, quum pili distincti, elongati, tegunt superficiem. *Pilosum*, receptaculum pilis erectis tectum. *Pilosus*, caulis pilis distinctis, elongatis, tectus.

*Pinnatum* : folium cujus petiolus simplex adnectit lateribus foliola plura. *Pinnatum* cum impari, dicitur folium pinnatum unico foliolo terminatum. *Bipinnatum* aut *duplicato-pinnatum* dicitur cum petiolus lateribus adfigit foliola pinnata. *Tripinnatum* aut *triplicato-pinnatum*, si petiolus communis adfigit plura foliola bipinnata.

*Pinnatifidum* : folium transversim divisum in lacinias oblongas horizontales.

*Pinnæ* vocantur foliola conjugata. *Pinnæ-pinnatæ*, quando foliola conjugata profundis incisuris, minores pinnulas representant.

*Pistillum* : viscus interioris est medullâ productus, organum femineum vegetabilis. Constat 1.<sup>o</sup> germine, quod rudimentum fructus immaturi in flore, 2.<sup>o</sup> stylo, id est, parte pistilli stigma elevante à germine; 3.<sup>o</sup> stygmate, quod summitas pistilli madida humore pollen rumpente.

*Placenta* est pars quâ semina pericarpio adnectuntur.

*Placentatio* est cotyledonum dispositio sub ipsâ germinatione seminum; suntve acotyledones, monocotyledones, dicotyledones, vel polycotyledones.

*Planta* involvit totum corpus cujuscumque vegetabilis, exceptis genitalibus, cujus partes in plerisque, sunt radix, truncus, folia, et fulcrâ.

*Planum* : folium superficie ubique æquali.

*Plenus* dicitur flos cujus corolla adeò multiplicatur ut stamina omnia excluduntur, vel excrescunt in petala, suffocant pistillum et steriles evadunt : flores pleni deliciæ sunt hortulanorum , botanicis pro monstribus habentur.

Impletio florum duplici modo peragitur; simplicium scilicet, vel petalis, vel nectariis; compositorum verò, vel corollulis tubulosis, vel planis.

*Plicata* : foliatio in plicas varias longitudinaliter coarctata. *Plicata* planta dicitur cum arbor vel ramus excrescit minimis intertextis ramulis, tamquam plica polonica ex pilis, seu instar nidi picæ; quod vulgus a malo genio ortum arbitratur. *Plicatum* folium dicitur quum discus folii versus marginem ad angulos alternatim adscendit et descendit.

*Plumosæ* : setæ villosæ compositæ. *Plumosus*, pappus constans pilis pennatis. *Plumula*, pars corculi seminis, squamosa, adscendens.

*Pollen* : genitura vegetabilium antherâ inclusa, humore rumpenda, atomosque elasticos ejaculans.

*Pollex* : mensura pollicaris; est longitudo extimi articuli pollicis. (*Uncia una*.)

*Polyadelphia* continet plantas quarum stamina filamentis in tria vel plura corpora sunt coalita : classem decimam septimam constituit.

*Polyandria* classis duodecima, continens plantas in quarum floribus stamina viginti et ultra reperiuntur, calicis lateri interno vel receptaculo inserta.

*Polyanthos* : caulis qui plures quam unum sustinet florem.

*Polygamia* continet plantas quæ præter flores hermaphroditos, gerunt in eadem specie, flores masculos aut femineos.

*Polygynia* plantas continet quarum flores gerunt pistilla plura.

*Polypetalus* : flos cujus corolla ex pluribus petalis constat.

*Polypyrenus*, vide *Monopyrenus*.

*Polysperma*, vide *Monosperma*.

*Polyphyllus*, vide *Monophyllus*.

*Polystachius*; culmus plures quam unam spicam gerens.

*Pomum* : pericarpium fartum evalve capsulam continens.

*Præmorsa* : radix deorsum truncata, radículas laterales emittens. *Præmorsum* : folium obtusissimum, truncatum incisuris inæqualibus.

*Prismaticum* : pericarpium lineare polyëdrum lateribus planis.

*Procumbens* : caulis debilis horizontaliter terræ innitens.  
*Prolepsis* sistit mysterium metamorphoseos plantarum ,  
 quo larva herbæ mutetur in declaratam fructificationem : plantæ enim est producere vel herbam foliosam ,  
 vel etiam fructificationem.

*Prolifer* ; caulis ex centro apicis tantum emittens ramos.  
*Prolifer* flos cum intra florem alii flores enascuntur ;  
*prolifer* flos *frondosus* dicitur cum proles proli-  
 feri fit foliosus : prolificatio duplici fit modo : è centro  
 seu è pistillo in floribus non compositis , vel è latere  
 è calice communi in compositis : prolificatio fit è  
 causa plenitudinis aucta.

*Propago* muscorum est semen nudum , id est , tunicâ  
 et cotyledonibus destitutum.

*Proprium* ; involucrum cuilibet flori subjectum. *Pro-*  
*prium* perianthium quemlibet florem respiciens. *Pro-*  
*prium* nectarium à petalis et ceteris partibus distinc-  
 tum. *Proprium* receptaculum , quod partes unius fruc-  
 tificationis tantum respicit.

*Prostratus* : caulis basi decumbente erectus.

*Pubescentia* est armatura plantæ quâ ab externis injuriis  
 defendetur. Consistit in pilis , lanâ , barbâ , tomento ,  
 strigis , setis , hamis , glandulis , viscositate , glutinositate.

*Pubescens* : folium aut caulis tectum pilis raris bre-  
 vibus , sibi incumbentibus.

*Punctatum* : folium punctis excavatis adpersum.

*Pungens* : folium aculeis seu spinis armatum.

## Q.

*QUINATUM* folium , vide *Digitatum*.

## R.

*RACEMUS* : flores lateraliter pedicellis , pedunculo com-  
 muni , inserti.

*Rachis* : receptaculum filiforme , flosculos longitudinaliter  
 adnectens in spicam. *Rachis* , seu costa , etiam dicitur  
 productio petioli , seu nervus intermedius , foliorum  
 medium longitudinaliter percurrens.

*Radiatus* : flos compositus , in disco corollulas tubulo-  
 sas , in ambitu verò corollulas ligulatas aut diffformes  
 continens. *Radiata* , umbella , petalis florum margina-  
 lium , reliquis majoribus.

*Radicale* : folium immediate è radice exiens. *Radicalis*  
 pedunculus dicitur qui è radice immediate exit.

*Radicans* : folium radices agens. *Radicans* , caulis aliis. se adfigens radiculis lateralibus.

*Radicatio* est radicis dispositio in caudice adscendente, descendente, et in radiculis.

*Radicata* : folia quæ radículas demittunt ex substantiâ ipsius folii.

*Radicula* : pars radicis fibrosa, in quam terminatur caudex descendens et quâ radix nutrimentum haurit pro vegetabilis sustentatione.

*Radius* est ambitus floris compositi è corollulis ligulatis constans. *Radii* dicuntur pedunculi umbellæ et setæ rigidiores pappi.

*Radix* : pars plantæ quâ ad quamlibet rem unde excrecit, adfigitur. Constat caudice et radiculâ, et constituit organum plantam nutriendum et firmans, herbanque cum fructificatione producentem.

*Rameum* : folium quod ramo, non cauli insidet. *Rameus* , pedunculus è ramis exiens.

*Ramificatio* manifestatur in situ ramorum quem folia sequuntur.

*Ramosa* : radix in ramos laterales subdivisa. *Ramosa* , spica in spiculas partiales varie divisa. *Ramosa* , spina apice partita. *Ramosus* , caulis ramis lateralibus plurimis instructus. *Ramosus* , pappus radiis subdivisis. *Ramosissimus* , caulis ramis numerosis absque ordine cumulatus. *Ramus* , pars trunci.

*Receptaculum* est basis quâ partes fructificationis connectuntur. Dividitur in receptaculum proprium, quod partes unius fructificationis tantum respicit; in receptaculum commune, connectens flosculos plures ita, ut si aliqui eximantur, irregularitas causetur.

Receptaculum connectit partes fructificationis modis quatuor : 1.<sup>o</sup> receptaculum ad basin germinis, ubi scilicet flos inferus; 2.<sup>o</sup> receptaculum ad apicem germinis, et tunc flos superus dicitur; 3.<sup>o</sup> receptaculum cingens germen seu fructum, ut in Saxifragiis variis; 4.<sup>o</sup> receptaculum ambiens germen dilatatum ut in ribe, etc., etc.

*Reclinatum* dicitur folium quod deorsum versus petiolum curvatur ut arcus sit, basi inferior, apice adscendente. *Reclinatus* , caulis arcuatim versus terram flexus.

*Recta* : artista perpendiculariter exiens. *Recta* , calyptra undique æqualis. *Rectus* , aculeus flexuris destitutus.

*Recurvatum* : folium deorsum flexum, ut convexitas arcus superiora spectat. *Recurvi* , aculei extrorsum replexi. *Recurvi* , rami perpendiculariter dependentes.



*Reflexum* : folium deorsum curvatum ut apex evadat basis inferior. *Reflexum*, perianthium partibus retrorsum flexis.

*Regularis* dicitur flos cujus corolla vel ejus segmenta aut petala in circulum ex centro floris ductum, inscribi possunt, et figurâ, magnitudine et proportionem conveniunt.

*Remota* : corolla à calice, interjecto germine. *Remota*; folia spatio à se invicem distantia. *Remota*, volva à capitulo, spatio recedens.

*Reniforme* : folium subrotundum, basi sinu excavatum, angulis posticis destitutum.

*Repandum* : folium cujus margo angulis, eisque interjectis sinibus, segmento circuli inscriptis terminatur.

*Repens* : radix longe sub terrâ excurrentis, hinc indè germinans et radículas demittens. *Repens*, caulis terræ incumbens et hinc indè radículas agens.

*Restantes* : pedunculi in plantâ post casum fructificationis.

*Resupinata* : corolla tubo contorto, ut labium superius terram, inferius cælum spectat. *Resupinatum*, folium paginâ superiore terram, et inferiore cælum spectans.

*Retroflexi* : rami horsum vorsum divaricati.

*Retrofactus*, pedunculus vi quasi ad dependendum redactus.

*Retusum* : folium terminatum sinu obtuso.

*Revoluta* : vernatio lateribus versus paginam inferiorem utrinque spiraliter contortis. *Revolutum*, folium quod deorsum in spiram revolvitur. *Revolutus*, cirrhus spirâ dimidio itinere retortâ.

*Rhombeum* : folium figurâ rhombi.

*Rictus* corollæ ringentis dicitur hiatus inter duo labia.

*Rigidus* : caulis flexurâ impatiens.

*Rimosus* : caulis cortice exteriori fissuras sponte agens.

*Ringens* vocatur corolla monopetala irregularis in duo labia divisa, cujus hiatus *Rictus*, labium superius *Galea*, labium inferius *Barba* dicitur : dividitur in personatam, cujus labia claudantur, inque labiatam si labia hient.

*Rostellum* : pars corculi in semine, simplex, descendens.

*Rotata* : corolla monopetala cujus limbus planus, par-titus, nullo tubo imponitur.

*Rotundum*, seu *Rotundatum* : folium angulis privatum.

*Rugosum* : folium venis contractioribus ita ut interjectâ substantiâ adscendat.

*Runcinatum* : folium pinnatifidum, itâ ut lobi anticè convexi, posticè sint transversî.

## S.

*Sagittatum* : folium triangulare, basi sinu excavatum, angulis posticis acutis.

*Sarmentosus* : caulis subnudus, repens, radices agens.

*Scaber* : caulis punctis eminentibus, rigidiusculis exasperatus. *Scabrum* dicitur folium quum tubercula rigidiuscula per discum folii sparguntur. *Scabrities* componitur particulis nudis oculis vix manifestis, quibus adspersgitur plantarum superficies.

*Scandens* : caulis in altum petens aliisque corporibus sustinendus.

*Scapus* : species trunci fructificationem absque foliis sustinens.

*Scariosum* : folium, substantiâ siccâ, tactu sonora. *Scariosum*, perianthium, imbricatum, squamis margine seu apice membranâ aridâ, sonora, auctis.

*Scutellum* lichenorum est fructificatio orbiculata, concava, margine indique elevato.

*Scyphus* in lichenibus pixidatis constat stipite basi attenuato, superne dilatato, excavato, fructificationes sessiles aut pedunculatas scutelliformes proferens.

*Secunda* : panicula pedunculis, floribusque omnibus versus unum idemque latus flexis. *Secunda* dicitur spica, floribus omnibus ad unum latus versis.

*Semen* : pars ultima et decidua omnis vegetabilis, rudimentum novæ sobolis, irrigatione pollinis vivificatum. Partes seminis ut plurimum, sunt: 1.<sup>o</sup> corculum, 2.<sup>o</sup> cotyledon, 3.<sup>o</sup> hilum, 4.<sup>o</sup> arillus, 5.<sup>o</sup> coronula, 6.<sup>o</sup> alæ. Essentia seminis consistit in corculo, quod cotyledoni adnectitur et ab eodem involvitur dum tunicâ propriâ arctè vestitur.

Corculi essentia consistit in plumulâ quæ punctum vitæ ipsius plantæ est, sub minimâ mole et uti gemma crescit in infinitum. At basis plumulæ est rostellum, quæ descendit et radices agit, olium matri contigua.

*Semi-amplexicaule* : folium gradu minore differens à folio amplexicaule.

*Semi-cylindricum* : folium teres, sed altero latere longitudinaliter planum.

*Semi-flosculus*, vide *Ligulatus* flos.

*Seminale* : folium quod ante germinationem seminis cotyledon fuit et primum in planta apparet.

*Seminis* receptaculum est basis quâ semen intrâ pericarpium adfigitur.

*Semiteres* : caulis hinc planus , indè teretiusculus.

*Sempervirens* : folium per totum annum virens.

*Sericeum* : folium tectum pilis appressis , mollissimis , nitidis.

*Serratum* : folium margine inciso , omnibus incisuris extremitatem respicientibus. *Duplicato-Serratum* dicitur , folium incisuris iterùm incisis.

*Sessile* : folium immediate cauli vel ramo absque petiolo insidens. *Sessilis* , pappus semini adhærens absque stipite. *Sessilis* , verticillus absque pedicellis manifestis.

*Sessilis* , umbella plures pedunculos simplices ex eodem centro , ambitu æquali prodeuntes.

*Seta* dicitur pedunculus muscorum. *Setæ* , pili rigidiusculi , teretiusculi ; species pubis.

*Sexus* plantarum æque ac animalium consistit in differentiâ partium generationi inservientium. Consideratio hujus in botanici , maximi est momenti ; nam cùm hæ partes sunt essentielles omnibus plantis , commode serviunt distributioni plantarum in classes et ordines : planta autem in quarum floribus organa utriusque sexus occurrunt , *Hermaphrodita* vocatur ; quæ antheras tantum continet , *mas* , quæ tantum stigmata , *femina* dicitur : quæ flores masculos et femineos simul in eadem plantâ continet *Androgyna* aut *Monoïca* : quæque flores hermaphroditos et femineos aut masculos simul , *Polygama* dicitur : quæ flores masculos et femineos in diversis stirpibus gerunt , *Dicliniæ* vocantur.

Levaillant primus florum connubia detexit et descripsit in libello de structurâ florum ; Linneus rem deindè exploravit ut nemini dubium superesse possit.

*Siliqua* : pericarpium membranaceum bivalve , cujus longitudo multum superat latitudinem , adfigens semina secundum utramque suturam. Constat valvis et dissepimento. *Silicula* dicitur siliqua cujus diameter longitudinalis vix superat transversalem.

*Simplex* ; aculeus non divisus. *Simplex* , caulis continua serie versus apicem extensus. *Simplex* flos , cùm nulla pars fructificationis pluribus floribus est communis ut intrâ perianthium aut corollam , unicum constituit receptaculum. *Simplex* folium dicitur cùm petiolus unicum tantum gerit folium. Differt hoc circumscriptione , angulis , sinubus , apice , margine , substantiâ , duratione. *Simplex* , pappus radiis pluribus indivisis in orbem positis. *Simplex* , perianthium unicâ serie squamarum flores ambiens. *Simplex* , radix non subdi-

*visa. Simplex* seta, continuo longitudinaliter extensa.  
*Simplex* umbella, pedunculis non ramosis omnibus ex uno et eodem centro-ortis.

*Sinistrorsum*, vide *Contorsio*.

*Sinuatum* : folium à lateribus sinubus dilatatis.

*Solares* flores, vide *Vigilia*.

*Solidus* : caulis interne fartus, non cavus.

*Solitariae* : stipulae simplices, sparsae. *Solitarius*, pedunculus unicus in loco.

*Solutae* : stipulae aut folia, basi productae, crassitiem per dentes.

*Somnus* : mutatio nocturna foliorum in plantâ; estque, primò pro foliis simplicibus : 1.<sup>o</sup> *Circumsepiens*, quàm folia per diem horizontaliter posita, nocte eriguntur in formam infundibuli; 2.<sup>o</sup> *Connivens*, quandò duo folia opposita, paginâ superiore tam arcuè ad se mutuo applicantur, quasi esset unicum folium; 3.<sup>o</sup> *Includens*, cum folia alterna, noctu se cauli approximant; 4.<sup>o</sup> *Muniens*, dùm folia suprema cum suis antea horizontaliter patentibus petiolis, circum circa dependent et quasi fornicem formant. Secundò pro foliis compositis : 1.<sup>o</sup> *Conduplicans*, quandò foliola sibi invicem approximantur ut folia libri, superiorem paginam tegentia; 2.<sup>o</sup> *Dependens*, foliolis demissis; 3.<sup>o</sup> *Divergens*, si foliola basi approximantur, apicibus vero patent. 4.<sup>o</sup> *Imbricans*, foliolis imbricatim complicatis; 5.<sup>o</sup> *Invertens*, foliolis demissis et simul inversis; 6.<sup>o</sup> *Involvens*, quandò foliola erecta apice connivent, et cavitatem inter se formant.

*Spadix* : receptaculum palmæ, enatum intrâ spatham in ramulos fructificantes. *Spadiceus*, flos aggregatus, ubi receptaculum intrâ spatham, pluribus flosculis est commune.

*Sparsa* : folia in plantâ absque ordine constituta. *Sparsi*, pedunculi ubi plures absque ordine prognascuntur.

*Spatha* : calix membranaceus, longitudinaliter ruptus.

*Spatulatum* : folium subrotundum, basi angustiore lineari, elongata.

*Species* dicitur unaquæque planta ejusdem generis, structurâ seu formâ à congeneribus omnino diversa.

*Sphaerophyllum* fructificatio feminea, sessilis aut pedunculata, constans minutissimis foliis congregatis, imbricato-patulis.

*Spica* componitur è pluribus floribus sessilibus, pedunculo communi simplici adfixis. *Spicula* seu *spicilla*,

vocatur spica partialis quam aliqui etiam locustam dixere.

*Spina* : mucro durus, pungens è ligno, non è cortice protrusus, culturâ sæpè evanescit ut vidimus in pyro, pruno, etc., etc. *Spinescens* : petiolus indurescens et pungens.

*Spinosum* : folium quod margine exit in acumina duriora, rigida, subulata et pungentia, ut Ilex, Carduus, etc. *Spinosum* dicitur perianthium squarrosum squamis in mucrones pungentes terminatis. *Spinosus* : caulis spinis armatus.

*Spiralia* folia, vide *Circinalia*.

*Spitamalis* : mensura spatium inter apicem pollicis et indicis, extensum.

*Squamosus* : caulis aut pedunculus squamis tectus. *Squamosus*, vide *Bulbus*.

*Squarrosus* : calix imbricatus, squamis undique divaricatis patentissimis.

*Stamen* : viscus pro pollinis præparatione, et organum genitale masculinum. Constat : 1.<sup>o</sup> filamento, quod pars elevans adnectensque antheram; 2.<sup>o</sup> antherâ, pars floris gravida polline, quod matura dimittit; 3.<sup>o</sup> polline, quod pulvis, antherâ contentus, humore rumpendus, atomosque elasticos ejaculans.

*Stella* seu *Stellula* : fructificatio in muscis. Est expansio surculi terminalis conflata è pluribus foliis patentibus cujus medio in quibusdam insident minuta folia compactissima, in aliis distinctiora corpora cylindrica imbricata. *Stellata* folia, vide *Verticillata*. *Stellata*, setæ decussatim dispositæ.

*Stigma* : summitas pistilli, madida humore pollen rumpente.

*Stimuli* sunt mucrones puncturas venenatas et inflammatorias efficientes, undè puriginosæ evadunt partes.

*Stipes* : basis frondis. Est species trunci in folium transiens, proprius filicibus. *Stipes* fungorum, truncus seu pes pileum sustinens, estque faretus, vel fistulosus; nudus, vel annulatus. *Stipes* pappi; filum elevans pappum connectensque semen. *Stipitatus* dicitur pappus stipite instructus.

*Stipula* : squama quæ basi petiolorum aut foliorum enascentium utrinque adstat : tuleri est species. *Stipulatio* est stipularum situs et structura ad basin foliorum : stipulæ non minùs quam folia in diversis plantis diverse existunt : suntque 1.<sup>o</sup> nullæ aut præ-

- sentes; 2.<sup>o</sup> geminæ aut solitariae; 3.<sup>o</sup> deciduæ aut persistentes; 4.<sup>o</sup> adnatæ aut solutæ; 5.<sup>o</sup> intrafoliaceæ, aut extrafoliaceæ. *Stipularis* : glandula stipulis inserta. *Stipulatus* : caulis stipulis notatus. *Stolones* sunt novæ plantarum soboles è radicibus fructificantes, per quas plantæ multiplicantur. *Stoloniferus* : caulis turiones ad radicem emittens. *Striatus* : caulis lineis tenuissimis longitudinalibus excavatis. *Striatum* : folium lineis superficialibus excavatis parallelis inscriptum. *Strictus* : caulis rectus, perpendicularis, non flexuosus. *Stricta* : panícula pedunculis pedicellisque rigidiusculis. *Strictum* : folium omnino perpendiculare absque flexurâ. *Strigæ* sunt pili rigidiusculi, planiusculi. *Strigosum* : folium aculeis lanceolatis, rigidis in superficie. *Strobilus* : pericarpium imbricatum ex amento coarctato factum, squamis induratis. *Stylus* : pars pistilli stigma connectens elevansque à germine. *Sub-alare* folium, vide *Axillare*. *Sub-cordatum* : folium ad figuram cordatam accedens. *Sub-divisus* : caulis in ramos absque ordine divisus. *Suberosus* : caulis corticè exteriori molliore sed elastico indutus. *Submersum* : folium intrâ aquæ superficiem absconditum. *Subovatum* : folium ad ovatam figuram accedens. *Subramosus* : caulis ramis paucissimis lateralibus. *Subrotundum* : capitulum ferè globosum. *Subrotundum* : folium cujus figura proximè orbiculato accedit. *Subulatum* : folium inferiùs lineare, versùs apicem sensim attenuatum. *Suffrutucosus* : caulis basi perennans, ramis quotannis marcescens. *Sulcatus* : caulis sulcis excavatis, latis, profundis, exaratus. *Sulcatum* : folium disco lineis profundis excavatum. *Superus* : flos vel calix, cui germen sub receptaculo, vel cujus calix abit in fructum, secundùm Tournefort. *Superum* : germen corolla inclusum. *Supra-decompositum* folium, cùm petiolus aliquoties divisus, adnectit foliola plurima. *Surculus* : caulis species in muscis; reptans, procumbens vel erigens; expansione continuè multiplicatur. *Syngenesia* : classis decima octava systematis sexualis, continens plantas quarum stamina antheris,

filamentis, in cylindrum sunt coalitæ. Ordines hujus sequenti modo instituuntur : 1.<sup>o</sup> *Syngenesia polygamia æqualis* : constat multis flosculis, staminibus et pistillis instructis. 2.<sup>o</sup> *Syngenesia polygamia spuria* : ubi flosculi hermaphroditi discum occupant, et marginem cingunt flosculi feminei staminibus destituti, idque triplici modo : I *Polygamia superflua*, cum flores disci hermaphroditi stigmate instruuntur et semina proferunt, flores quoque feminei radium constituentes similiter semina ferunt ; II *Polygamia frustranea*, cum flores disci hermaphroditi stigmate instruuntur, et semina proferunt ; flosculi vero radium constituentes, quum stigmate careant, semina proferre nequeunt. III *Polygamia necessaria* : flores hermaphroditi ob defectum stigmatidis pistilli, semina perficere nequeunt, flores autem feminei in radio semina perfecta proferunt. 3.<sup>o</sup> *Syngenesia polygamia segregata* : calices floriferi comprehenduntur à communi calice, ut unicum florem conficiant.

## T.

*TERES* : caulis cylindricus seu angulis destitutus. *Teres* : folium ex maximâ parte cylindricum.

*Tergeminum* : folium quum petiolus bifidus utroque apice fert foliola duo, et insuper foliola duo ad divaricaturam petioli communis.

*Terminalis* : arista apici glumæ adfixa. *Terminalis* : pedunculus sive flos ad apicem caulis seu rami positus.

*Ternatum* : folium digitatum foliolis tantum tribus sessilibus aut petiolatis. *Biternatum* aut *Duplicato-ternatum*, si petiolus adfigit tria foliola ternata. *Triternatum* vel *Triplicato-ternatum*, cum petiolus adfigit tria foliola biternata.

*Tesselata* : folia maculis quadrangularibus discoloribus picta.

*Tetradynamia* : plantas comprehendit in quarum floribus stamina sex numerantur, quatuor autem longiora et duo opposita breviora. Ordines hujus classis desumuntur à fructu seu pericarpio ; primor scilicet semina in siliquam continet, alter autem in siliculam.

*Tetrandria* : classis quarta in quâ plantæ continent stamina quatuor æqualis longitudinis in eodem flore : nam si stamina duo proxima essent breviora, referatur planta ad didynamiam.

*Tetrapetalus* flos, vide *Petalum*.

*Tetraphylus* calix, vide *Monophyllus*.

*Tetrasperma* capsula, vide *Monosperma*.

*Thyrus*: panicula coarctata in formam ovatam, ut *Syringa*, *Petasites*, etc.

*Tomentum*: species pubis villi intertexti vix conspicui.

*Tomentosum*: folium villis intertextis obductum, ergò sæpius albidum.

*Torosa* siliqua, vel *Torosum* pericarpium, quum tortilis seu prominentiis, hinc indè gibbum evadit.

*Torsio*, vide *Contorsio*.

*Tortilis*: arista instar funis flexa.

*Tracheæ* sunt vasa aëre plena, facta ex membranis tenuissimis in cavitatem convolutis.

*Transversum*, vide *Dissepimentum*.

*Trapeziforme*: folium quadrangulare lateribus inter se inæqualibus.

*Triandria*: classis tertia, ubi stamina tria in flore numerantur.

*Triangulare* folium, vide *Angulare*.

*Tricoeca*: capsula tribus nodis protuberans, intusque in tria loculamenta divisa.

*Trifidum*, vide *Fissum*.

*Trilobum*, vide *Lobatum* folium.

*Trinervatum* dicitur folium nervosum, tribus nervis pone basin foliï concurrentibus. *Trinerve* audit folium si nervi in basi foliï concurrunt.

*Tripartitum* folium, vide *Partitum*.

*Tripetalus* flos, vide *Petalum*.

*Triphyllus* calix vide, *Monophyllus*.

*Tripinnatum*, aut triplicato-pinnatum, vide *Pinnatum*.

*Triplicatus* dicitur flos cujus corolla triplo auctior evadit; vide flos *Multiplicatus*.

*Triplinerve*: folium nervosum, tribus nervis supra basin concurrentibus.

*Triqueter*: caulis, culmus, aut scapus, lateribus tribus, exacte planis. *Triquetrum*: folium tribus lateribus longitudinaliter planis in folio subulato.

*Trisperma* capsula, vide *Monosperma*.

*Trivalve*, vide *Pericarpium*.

*Triviale*, vide *Nomen*.

*Tropici* flores, vide *Vigiliæ*.

*Truncatum*: folium quod lineâ transversali terminatur.

*Truncus*: pars plantæ à radice in altum vergens, subtentansque folia et fructificationem; species ejus sunt caulis, culmus, scapus, stipes, petiolus et pedunculus.



*Tuberculum* : fructificatio lichenorum constans punctis scabris, ex pulvere quasi congestis. *Tuberculum* muscorum est basis pedunculi ovata, vel conica, nuda, vel perichætio vestita, quæ surculo adfigitur.

*Tuberosa* : radix constans corporibus subrotundis, carnosisque, filo quasi connexis,

*Tubulata* : corolla monopetala, tubo cylindrico, limbo campanulato. *Tubulosus* : flos compositus ex corollulis, omnibus tubulatis subæqualibus. *Tubulosum* folium quod si detruncetur, interne cavitatem habet.

*Tubus* : corollæ monopetalæ pars inferior cylindracea. *Tunicatus* : caulis membranis vestitus. *Tunicatus*, vide *Bulbus*.

*Turbinatum* : pericarpium obverse conicum.

*Turiones* : sunt tenellæ plantarum soboles, verno tempore cum foliis è terrâ erumpentes.

## V.

*VAGINA* muscorum est membranâ pervia tubulosa, surculo insidens, et tuberculum pedunculi arcte vestiens. *Vagina* folii dicitur tubus cylindricus è basi folii formatus et culmum vestiens, in graminibus frequens, undè *Vaginans* dicitur folium talem tubum formans.

*Valva* aut *Valvula*, vide *Pericarpium*. *Valva* etiam dicitur calix aut corolla graminum; vide *Gluma* et *Bivalvis* corolla.

*Varietas* est mutatio plantæ à causâ quâcumque accidentali clinata, solo, calore, etc. : species varietatum sunt magnitudo, color, crispatio, sapor, odor, etc., varietates è re herbariâ excludi possunt et debent.

*Vegetatio*, vide *Vita* plantarum.

*Venosum* folium, cum vasa discurrentia evadunt ramosissima et anastomoses nudo oculo exhibent.

*Ventricosa* : spica lateribus gibba. *Ventricosa* : corolla monopetala in ventrem intumescens.

*Vernatio*, vide *Frondescentia*. *Vernatio* etiam dicitur foliorum dispositio intrâ gemmam, suntque 1.<sup>o</sup> conduplicata, 2.<sup>o</sup> convoluta, 3.<sup>o</sup> involuta, 4.<sup>o</sup> revoluta, 5.<sup>o</sup> obvoluta, 6.<sup>o</sup> equitantia, 7.<sup>o</sup> imbricata, 8.<sup>o</sup> plicata, 9.<sup>o</sup> reclinata, 10.<sup>o</sup> circinalia.

*Versatilis* seu *Incumbens*; anthera quæ latere adfigitur.

*Verticale* folium seu adversum : folium paginam superiorem meridiei seu horizonti, non cælo obvertens.

*Verticillata* seu stellata dicuntur folia, cùm plura quam duo folia caulem ambiunt. *Verticillati*; rami plures truncum ad genicula circumdantes. *Verticillus* constat pluribus floribus caulem annulatim ambientibus.

*Vexillum* : petalum superius corollæ papilionaceæ, reliqua tegens et incumbens. Majus, plano-horizontale, ungue superiori margini receptaculi insertum, extra calicem ad subrotundam figuram accedens, ferè integrum, linea longitudinali, presertim versùs apicem, quasi ad latera depressum fuisset petalum.

*Vigendi* tempus comprehendit annos quibus plantæ vivunt; faciliè anni numerantur, vel è circulis concentricis, vel ex annulis resinosis in caudice detruncato.

*Vigiliæ* plantarum absolvuntur determinatis horis dici, quibus plantæ flores quotidie aperiunt, expandunt et claudunt. *Solares* flores dicuntur qui determinatum hoc tempus sese explicandi et claudendi observant. Hi sunt triplices; 1.<sup>o</sup> *Meteorici* : flores solares, qui minùs adcuratè observant horam explicationis, sed priùs vel seriùs aperiuntur pro ratione imbræ, aëris humidì vel sicci, atmospheræ pressione majori aut minori; 2.<sup>o</sup> *Tropici* manè aperiuntur, et antè vesperem recluduntur quotidie, sed hora explicationis adscendit vel descendit uti dies accrescit aut decrescit; 3.<sup>o</sup> *Æquinoctiales* flores aperiuntur certâ et positivâ diei horâ et plerumque etiam determinatâ horâ quotidie recluduntur.

*Villosa* calyptra; *Villosum* folium; *Villosus* : caulis, tectus pilis mollibus.

*Virgatus* : caulis ramusculis debilibus numerosis inæqualibus. *Virgata* panicula, pedicellis numerosis inæqualibus.

*Viscidum* : folium oblitum humore tenaci.

*Vita* vegetabilium est conspiratio actionum quas planta vi suæ fabricæ exercet secundùm regulas motus : vitæ hujus in plantis duplex actio observatur : una quæ ad plantæ incrementum pertinet, et vegetatio nominatur; altera quæ ad ejus propagationem tendit, fructificatio dicitur. *Diss. phys. de veget., thes. 4.*

*Vivipara* fiunt gramina dum glumæ corollæ excrescunt in folia, tumque abortiunt; nam stamina et pistilla planè evanescunt.

*Volva* : calix fungorum membranaceus undique lacerus.

*Volubilis* : caulis spiraliter ascendens per ramum alienum, estque sinistrorsum, id, est secundùm motum solis; dextrorsum itaque contrarium, vide *Contorsio*.

## U.

*UMBELLA* gerit receptaculum ex eodem centro elongatum in pedunculos proportionatos. *Umbellula* dicitur umbella partialis.

*Umbilicatum* folium, vide *Peltatum*.

*Uncialis* : mensura linearum duodecim.

*Undatum* : folium disco flexo, plicis alternatim obtusis.

*Undulatum* : folium margine flexo plicis alternis.

*Unguis* : corollæ polypetalæ pars inferior angustata, quâ receptaculo adfigitur. *Ungicularis* : mensura longitudinis unguis.

*Unicapsulare* dicitur pericarpium unicæ tantum capsulæ instructum, et *bi-tri-aut-multi capsulare*, à numero capsularum.

*Uniflora* : gluma unicum florem amplexens. *Uniflorus* : pedunculus *bi-tri-aut-multiflorus*, pro numero florum quos profert.

*Unilateralis* : racemus flores omnes ad alterum latus inserti.

*Univalvis* : gluma unicâ constans squamâ. *Univalvis* : spatha uno latere dehiscens.

*Universale*, vide *Involucrum*. *Universalis* : umbella quæ alias umbellulas apicibus gignit.

*Urceolata* : corolla quæ instar urceoli seu pelvis, inflata et undiquè gibba est.

*Urens* : caulis stimulis adpersus.

*Utriculi* sunt vascula repleta liquore secreto.

---

FLORA  
BRUXELLENSIS.

# CLASSIUM CHARACTERES.

## I. MONANDRIA.

Stamen unicum in flore.

## 2. DIANDRIA.

Stamina duo in flore.

## 3. TRIANDRIA.

Stamina tria in flore.

## 4. TETRANDRIA.

Stamina quatuor in flore.

*Si stamina duo proxima sunt breviora, referatur ad classem decimam tertiam.*

## 5. PENTANDRIA.

Stamina quinque in flore.

## 6. HEXANDRIA.

Stamina sex in eodem flore.

*Si ex his duo opposita sunt breviora, pertinet ad classem decimam quartam.*

## 7. HEPTANDRIA.

Stamina septem in flore.

## 8. OCTANDRIA.

Stamina octo in flore.

## 9. ENNEANDRIA.

Stamina novem in flore.

## 10. DECANDRIA.

Stamina decem in eodem flore.

Ordines à pistillis definiuntur, uti classes à staminibus, exceptis *didynamiâ*, *tetradynamiâ*, *syngenesiâ* et *cryptogamiâ*, ex gr., monogynia, digynia, trigynia, tetragynia et tandem polygynia : significat pistillum 1, 2, 3, 4, aut multa in eodem flore; si autem stili déficient, à numero stigmatum fit calculus.

Ordines *didynamiæ*, *tetradynamiæ*, *syngenesiæ* et *cryptogamiæ*, vide in *Lexicone*.

## 11. DODECANDRIA.

Stamina 12 ad 19 in flore.

## 12. POLYANDRIA.

Stamina 20 et ultra in flore, in calicis latere aut receptaculo inserta.

## 13. DIDYNAMIA.

Stamina quatuor quorum duo proxima breviora.

## 14. TETRADYNAMIA.

Stamina sex quorum quatuor longiora, duo autem opposita breviora.

## 15. MONADELPHIA.

Stamina filamentis in unum corpus coalita.

## 16. DIADELPHIA.

Stamina filamentis in duo corpora connata.

## 17. POLYADELPHIA.

Stamina filamentis in tria vel plura corpora coalita.

## 18. SYNGENESIA.

Stamina antheris (rarò simul filamentis) in cylindrum coalita.

## 19. CRYPTOGAMIA.

Fructificatio oculis nudis difficiliter usurpanda.

# FLORA

## BRUXELLENSIS.

---

### CLASSIS PRIMA.

---

#### MONANDRIA.

---

#### M O N O G Y N I A.

1. **HIPPURIS.** Calix nullus, corolla nulla, filamentum unicum receptaculo floris insidens, stigma simplex, semen unicum, subrotundum.
  - 1. *H. VULGARIS.* Foliis octonis subulatis. *Linn. sp. pl.* 4 ; *Jacq. austr. fol.* 1 ; *Fl. danic. tab.* 87 ; *Scop. carn. sp.* 2 ; *Gouan, hort. monsp., fol.* 2.
  - Polygonum femina.* *Dodon, kruyd-b.* 156 ; *Lobel, kruyd-b.* 967.
  - Equisetum palustre brevioribus foliis polyspermum.* *Bauh. pin.* 15 ; *Moris. hist.* 3, *fol.* 621.
  - Equiseti facie, polygonum femina.* *Bauh. hist.* 3, *fol.* 732.
  - Limnopeuce.* *Haller. hist. stirp., n.* 1572.
  - Belgicè : *Duyssend-knoop-Wyfsken* ; gallicè : *Pesse.*
  - In stagnis *Élegem, Jette, etc.* Perennis, augusto florens. *Rara.*
  
2. **APHANES.** Calix monophyllus, tubulatus, persistens, ore plano, quadrifido ; corolla nulla ; semen unum ovatum-acuminatum.
  - 2. *A. ARVENSIS.* Foliis tripartito-trifidis, hirsutis. *Linn., sp. pl.* 123 ; *Gouan, hort. monsp.* 74.
  - Alchemilla arvensis.* *Scop. fl. carn., sp.* 175.
  - Pereprier Anglorum.* *Lobel, kruyd-b., fol.* 889 ; *Bauh. hist.* 3, *fol.* 74.
  - Alchemilla hirsuta, foliis trilobatis, lobis bi-et-tripartitis.* *Hall. hist., n.* 1569.

*Alchemilla annua*, hirsuta, minima, foliis inferne candicantibus. *Moris. hist.* 2, fol. 195, tab. 20, fig. 4.

Belgicè: *Steen-kruyd*; gallice: *Perce-pierre*.

In arvis ubique. Annua junio florens. *Calix* 4 et 8 *fidus*, *stamen unicum*.

3. **CHARA.** Flores monoïci. *Masc.* Calix nullus, anthera germini subjecta absque filamento. *Fem.* Calix tetraphyllus, stigma trifidum, semen unicum.

3. *C. VULGARIS.* Caulibus lævibus, frondibus interne dentatis. *Linn. sp. pl.* 1156, n. 2; *Fl. danic. tab.* 150; *Scop. fl. carn. sp.* 1410.

*Chara* caule lævi fragili. *Hall. hist.*, n. 1681.

*Equisetum fætidum* sub aquâ repens. *Bauh. pin.* 16; *Bauh. hist.* 3, fol. 731.

*Hippuris fætida.* *Dillen, giss.* 105.

Belgicè: *Steërt-Mos*; gallicè: *Lustre commun.*

In aquis canalis propè *den Nieuwen Molen*.

4. *C. FLEXILIS.* Caulium articulis inermibus diaphanis, supernè latioribus. *Linn. sp. plant.* 1156, n. 4.  
*Chara* caule lævi pellucido flexili. *Hall. hist.*, n. 1684.  
*Chara translucens*, minor, flexilis. *Rai. hist.* 3, fol. 133.  
*Hippuris* setis bifurcis. *Dillen, ephem. cent.* 6, app. 59, tab. 13, fig. 2.

Belgicè: *Modder-kruyd*; gallicè: *Lustre puant.*

Cum præcedenti propè pontem *Laken*, etc. Perennis.

## DIGYNIA:

4. **CALLITRICHE.** Calix nullus, petala duo opposita, semina quatuor nuda, hinc membranaceo maginata.

5. *C. VERNÆ.* Foliis superioribus ovalibus, apice integris. *Linn. sp. pl.* 969, n. 1; *Fl. dan. tab.* 129; *Gouan hort., monsp. fol.* 4.

*Callitriche stagnalis.* *Scop. fl. carn. sp.* 1201.

*Stellaria* foliis petiolatis subrotundis. *Hall. hist.*, n. 354.

*Stellaria aquatica.* *Bauh. pin.* 141.

Belgicè : *Poel-kruyd* ; gallicè : *Stellaire des marais*.  
 In aquis stagnantibus ubique. Maio florens, annua.  
*Vidi flores monoïcos, polygamos, hermaphroditos*  
*rarius.*

6. *C. AUTUMNALIS*. Foliis omnibus linearibus, apice-  
 bifidis. *Linn. sp. pl.* 969, n. 2 ; *Gouan, hort. monsp.*,  
*fol. 4.*

*Callitriche fontana. Scop. carn. sp.* 1202.

*Stellaria aquatica. Lobel, kruyd-b.*, fol. 367.

*Alsine aquatica minor seu fluitans. Bauh. pin.* 257.

*Stellaria foliis omnibus linearibus. Hall. hist.*, n. 355.

Belgicè : *Water-sterre-kruyd* ; gallicè : *Stellaire des*  
*fontaines.*

In aquis purioribus, fluentibusque. *Flores monoïci,*  
*dioïci et hermaphroditi inveniuntur.* Augusto. flo-  
 rens, annua.





## CLASSIS SECUNDA.

## DIANDRIA.

## MONOGYNIA.

5. **LIGUSTRUM.** Calix monophyllus, minimus; quadridentatus; corolla quadrifida, antrum duplicatum, biloculare, tetraspermum.
 

7. *L. VULGARE.* Foliis ovatis, obtusis, paniculâ simpliciter trichotomâ. *Linn. sp. pl.*, fol. 7; *Blakw. herb. tab.* 142; *Scop. carn. sp.* 4; *Hall. hist.*, n. 350.  
*Ligustrum.* *Dodon, kruyd-b.* 1215; *Lobel, Kruyd-b.* 153, p. 2; *Boerh. hort. lugd.* 215, p. 2; *Dalech. hist.* 1, fol. 211; *Matthiol. in diosc.*, fol. 78.  
 Belgicè: *Mond-hout, Maegde-palm*; gallicè: *Troène.*  
 In sylvis et sepibus ubique. Junio floret.
6. **SYRINGA.** Calix monophyllus, parvus, quadridentatus; corolla monopetala, quadrifida, tubo longissimo; capsula bilocularis, bivalvis, supera.
 

8. *S. VULGARIS.* Foliis ovato-cordatis, integris. *Linn. sp. pl.* 9, n. 1; *Hall. hist.*, n. 531; *Gouan, hort. monsp.*, fol. 8.  
*Syringa cærulæa.* *Dodon, kruyd-b.* 1220; *Lobel, kruyd-b.* 119; *Bauh. pin.* 398; *Clus. hist. rar.*, fol. 56.  
*Lilac.* *Tourn. inst.* 601; *Boerh. hort. lugd.* 221, n. 1—4.  
 Belgicè: *Lillach, blauwe Jasmin*; gallicè: *Lilas.*  
 In sepibus communis. Initio maii floret.
7. **CIRCEA.** Calix diphyllus, superus, foliolis deflexis; corolla dipetala, capsula infera bilocularis, hispida, semina solitaria.
9. **C. LUTETIANA.** Caule erecto, foliis ovatis, subserratis, villosis. *Linn. sp. pl.* 9, n. 1; *Jacquin, fl. aust.*, fol. 6; *Lobel, kruyd-b.* 324; *Scop. carn. sp.* 6; *Tourn. inst.* 301; *Boerh. hort. lugd.* 78.

Ocymastrum verrucarium. *Bauh. hist.* 2, fol. 977.  
 Solanifolia circa dicta, major. *Bauh. pin.* 168; *Morris. hist.* 2, fol. 617.

Belgicè : *Tooveraers-kruyd* ; gallicè : *Circée*.

In versuris umbrosis. *Molebeek, Ganshoren, Jette, etc.*,  
*triandram et foliis glabris sæpius vidi.* Perennis,  
 julio florens.

8. VERBENA. Calix dente uno truncato, corolla  
 infundibuliformis, subæqualis; semina nuda, cor-  
 tice dorso crassiore.

10. *V. OFFICINALIS.* Tetrandra, spicis filiformibus, pa-  
 niculatis : foliis multifido-laciniatis caule solitario.  
*Linn. sp. plant.* 20, n. 13 ; *Fl. danic. tab.* 628 ; *Scop.*  
*carn. sp.* 749.

Verbena recta. *Dodon, kruyd-b.* 220 ; *Lobel, kruyd-b.*  
 634 ; *Matthiol. in diosc.* 344 ; *Blakw. herb. tab.* 41.

Verbena communis. *Dalech. hist.* 2, fol. 223 ; *Boerh.*  
*hort. lugd.* 187 ; *C. Bauhin, pin.* 269.

Verbena vulgaris. *Bauh. hist.* 3, fol. 443.

Belgicè : *Yzer-kruyd* ; gallicè : *Verveine*.

In ruderatis communis. *Stamina duo interdum nu-*  
*meravi.* Perennis, julio florens.

9. VERONICA. Calix quadri-aut-quinque-partitus ;  
 corolla quadrifida, laciniâ infimâ angustiore aut  
 longiore ; capsula bilocularis apice emarginata.

11. *V. OFFICINALIS.* Spicis lateralibus, pedunculatis,  
 foliis oppositis, caule procumbente. *Linn. sp. pl.* 13,  
 n. 20 ; *Scop. carn.* 23 ; *Jacq. aust.*, fol. 2.

Veronica mas, serpens et assurgens. *Dodon, kruyd-b.*  
 51—52.

Veronica vera et major. *Lobel, kruyd-b.*, fol. 555.

Veronica mas, supina et vulgatissima. *Bauh. pin.* 246 ;  
*Boerh. hort. lugd.*, fol. 224.

Veronica mas Matthioli. *Dalech. hist.* 2, fol. 208.

Veronica mas. *Fusch. hist.* 166 ; *Blakw. herb. tab.* 143.

Belgicè : *Eeren-prys* ; gallicè : *Véronique officinale*.

Ad *Stalle, Alseberg* ; in siccis sylvestribus. Ad *Ber-*  
*chem*, propè *D. Roovere*. Perennis, junio florens.

12. *V. BECCABUNGA*. Racemis lateralibus, foliis ovatis, planis, caule repente. *Linn. sp. pl.* 12, n. 14; *Fl. danic. tab.* 511; *Scop. carn. sp.* 11; *Jacq. aust., fol.* 3.  
*Veronica*, foliis ovatis, serratis, ex alis racemosa. *Hall. hist., n.* 534.  
*Anagallis aquatica*. *Dodon, kruyd-b.* 938; *Lobel, kruyd-b.* 550.  
*Anagallis aquatica*, folio subrotundo. *Bauh. pin.* 252; *Boerh. hort. lugd., fol.* 225, n. 13—14.  
*Veronica aquatica* folio subrotundo. *Tourn. inst.* 145.  
 Belgicè : *Water-pungen*; gallicè : *Véronique d'eau*.  
 In rivis et fossis communis. Julio florens, annua.
13. *V. ANAGALLIS*. Racemis lateralibus, foliis lanceolatis, serratis, amplexicaulibus, caule erecto. *Linn. sp. pl.* 12, n. 15; *Scop. carn. sp.* 12; *Jacq. aust., fol.* 3.  
*Anagallis aquatica* folio oblongo. *Bauh. pin.* 252; *Moris. hist.* 2, fol. 323; *Boerh. hort. lugd.* 225, n. 15-16.  
*Veronica* foliis lanceolatis, serratis, glabris, ex alis racemosa. *Hall. hist., n.* 533.  
 Belgicè : *Beek-pungen*; gallicè : *Mouron d'eau*.  
 In aquis purioribus. Annua, augusto florens.
14. *V. SERPILLIFOLIA*. Racemo terminali, subspicato, foliis ovatis, crenatis, glabris. *Linn. sp. pl.* 12, n. 13; *Scop. carn. sp.* 10; *Jacq. aust., fol.* 3.  
*Veronica minor serpillifolia*. *Lobel, kruyd-b., fol.* 556.  
*Veronica pratensis*. *Dodon, kruyd-b., fol.* 52.  
*Veronica femina*. *Bauh. hist.* 3, fol. 285.  
*Veronica pratensis*, serpillifolia. *Bauh. pin.* 247; *Moris. hist.* 2, fol. 319; *Boerh. hort. lugd.* 225, p. 2.  
 Belgicè : *Kleynen Eeren-prys*; gallicè : *Véronique des prés*.  
 In hortis, campis, pratisque humidis. Junio florens, perennis.
15. *V. TEUCRIUM*. Racemis lateralibus longissimis, foliis ovatis rugosis, dentatis, caulibus procumbentibus. *Linn. sp. pl.* 14, n. 21.  
*Veronica* foliis cordatis, obtusis, nervosis, serratis, racemis densissimis. *Hall. hist., n.* 537.  
*Teucrium sylvestre* aut spurium. *Dodon, kruyd-b., fol.* 58.  
*Teucrii* quarti tertia species. *Clus. hist. rar., fol.* 349.

*Chamædrys spuria altera*, frutescens. *Bauh. pin.* 248.  
*Chamædrys spuria angustifolia*, major. *Bauh. pin.* 248.  
*Chamædrys vulgaris mas.* *Fusch. hist.* 871.  
 Belgicè : *Wilde Germanderleyn*; gallicè : *Germandrée sauvage*.

Ad margines pratorum, etc. Perennis, junio florens.

16. *V. CHAMÆDRYS*. Racemis lateralibus, foliis ovatis, sessilibus, rugosis, dentatis, caule bifariam piloso. *Linn. sp. pl.*, fol. 13, n. 18; *Jacq. aust.*, fol. 3; *Gouan, hort. monsp.* 11.

*Veronica foliis cordatis, subrotundis, hirsutis, nervosis, ex alis racemosa.* *Hall. hist.*, n. 536.

*Teucrium quartum et chamædris*, quorundam. *Clus. hist. rar.*, fol. 349 et 352.

*Teucrium pratense.* *Lobel, kruid-b.*, fol. 577.

*Chamædrys spuria latifolia.* *Bauh. hist.* 3, fol. 386.

*Veronica minor foliis imis rotundioribus.* *Moris. hist.* 3, fol. 320,

Belgicè : *Bathengel*; gallicè : *Chenette sauvage*.

Ad margines pratorum. *Scop. hanc et antecedentem in unam speciem conjunxit. Vide fl. carn. sp.* 14.  
 Perennis julio florens.

17. *V. ARVENSIS*. Floribus solitariis, foliis cordatis incisis sessilibus, pedunculo longioribus. *Linn. sp. pl.* 13, n. 21; *Scop. carn. sp.* 18; *Jacq. aust.*, fol. 4.

*Veronica caule erecto, foliis ovatis, subhirsutis, dentatis, petiolis brevissimis.* *Hall. hist.*, n. 548.

*Elatine polyschides.* *Delech. hist.* 2, fol. 134.

*Alsine veronicæ foliis, flosculis cauliculis adherentibus.* *Bauh. pin.* 250.

Belgicè : *Veld-eeren-prys*; gallicè : *Véronique des champs*.

In arvis hortisque inter olera. Annua, maio florens.

18. *V. AGRESTIS*. Floribus solitariis, foliis cordatis, serratis, petiolatis, pedunculo brevioribus. *Linn. sp. pl.* 13, n. 20; *Scop. fl. carn. sp.* 23; *Fl. dan. tab.* 449.

*Veronica caule procumbente, foliis petiolatis, ovatis, crenatis.* *Hall. hist.*, n. 549.

*Veronica flosculis oblongis pedicellis insidentibus.* *Boerh. hort. lugd.* 226.

*Morsus gallinæ secundus.* *Dodon, kruid-b.*, fol. 38; *Dalech., hist.* 2, fol. 134.

*Alsine trissilaginæ foliis.* *Lobel, kruid-b.*, fol. 548.

*Alsine chamædrifolia* flosculis pedicellis oblongis insidentibus. *Bauh. pin.* 250.

*Alsine serrato* totio glabro. *Bauh. hist.* 3, fol. 366.

Belgicè : *Bastaerd-muer*; gallicè : *Véronique femelle*.  
In arvis et pratis. Annuæ, junio florens.

19. *V. HÆDERÆFOLIA*. Floribus solitariis, foliis cordatis planis quinquelobis. *Linn. sp. pl.* 13, n. 22 : *Scop. carn. sp.* 24; *Gouan, hort. monsp.* 12.

*Veronica hæderulæfolio*. *Bauh. pin.* 250; *Moris. hist.* 2, fol. 322.

*Morsus gallinæ primus*. *Dodon, kruid-b.*, fol. 38.

*Morsus gallinæ folio hæderulæ*. *Lobel, kruid-b.*, fol. 547.

*Elatine prima* Dodonci. *Dalech. hist.* 2, fol. 133.

*Veronica caule procumbente*, foliis lobatis, petiolatis, pedunculis unifloris. *Hall. hist.*, n. 550.

Belgicè : *Hoenderbete*; gallicè : *Elatine bâtarde*.

Inter olera, ad muros vetustos, etc. Annuæ, julio florens.

20. *V. TRIPHYLLOS*. Floribus solitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calice longioribus. *Linn. sp. pl.* 13, n. 22; *Scop. fl. carn. sp.* 25.

*Veronica foliis tri-et-quinque-partitis*, petiolis unifloris. *Hall. hist.* n. 551.

*Alsine triphyllus cærulæa*. *Bauh. pin.* 250.

*Alsine parva*, recta, folio Rutæ, modo diviso. *Lobel, kruid-b.* 548.

Belgicè : *Hoenderbete met gedeylde bladen*; gallicè : *Mouron à feuilles de rue*.

Inter segetes, circa *Berchem*, *Anderlecht*; etc. Non communis. Annuæ.

21. *V. VERNÆ*. Floribus solitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calice brevioribus. *Linn. syst. veget.* 31, n. 38; *Fl. dan. tab.* 252.

*Veronica verna tri-vel-quinquesido folio*. *Tourn. inst.* 145.

*Veronica foliis ovatis*, tri-et-quinque-partitis, petiolis unifloris, brevissimis. *Hall. hist.*, n. 552.

*Veronica humilis erecta*, montana flore parvo cærulæo. *Dillen, geiss. app.* 38.

Belgicè : *Vroegen Eeren-prys*; gallicè : *Véronique printanière*.

Initio aprilis florentem inveni in arvis. *Haren, Vorst*, etc., Annuæ.

10. **UTRICULARIA.** Calix diphyllus æqualis, corolla ringens, calcarata, capsula unilocularis.
22. *U. VULGARIS.* Nectario conico, scapo paucifloro. *Linn. sp. pl.* 18; *Hall. hist.*, n. 290; *Gouan. hort. monsp.* 14. *Millefolium aquaticum* flore luteo galericulato. *Lobel, kruyd-b.* 967. *Millefolium aquaticum lenticulatum.* *Bauh. pin.* 141. Belgicè : *Water-helm-kruyd*; gallicè : *Lenticulaire commune.* Propè *Sempst, Weêrde, etc.*, in fossis profundioribus. Perennis, julio florens.
11. **LYCOPUS.** Calix monophyllus quinquefidus, laciniis angustis, acutis; corolla quadrifida, lacinia unica emarginata; stamina distantia, semina quatuor retusa.
23. *L. EUROPEUS.* Foliis sinuato-serratis. *Linn. sp. pl.* 21, n. 1; *Scop. carn. sp.* 29. *Lycopus* foliis acutè serratis, appendiculatis. *Hall. hist.*, n. 220. *Marrubium aquatile.* *Dodon, kruyd-b.* 942; *Lobel, kruyd-b.* 620. *Marrubium palustre glabrum.* *Bauh. pin.* 230. *Sideritis prima Matthioli.* *Dalech. hist.* 1, fol. 20. *Lycopus palustris glaber.* *Tourn. inst.* 191; *Boerh. hort. lugd.* 186. Belgicè : *Water-malrouwe*; gallicè : *Marrube d'eau.* Ad ripas aquarum. Perennis, augusto florens.
12. **ORCHIS.** Nectarium cornu referens pone florem, corolla ringens.
24. *O. BIFOLIA.* Bulbis indivisis; nectarii labio lanceolato, integerrimo, petalis patentibus. *Linn. sp. pl.* 939, n. 3; *Blakw. herb. tab.* 588; *Scop. carn. sp.* 1102. *Orchis radicibus oblongis, labello lineari.* *Hall. hist.* 1285, tab. 35. *Orchis serapias primus.* *Dodon, kruyd-b.* 374; *Dalech. hist.* 2, fol. 426. *Orchis bifolia et trifolia, major et minor.* *Bauh. pin.* 83. *Orchis bifolia altera et latissima.* *Bauh. pin.* 82.

Testiculus vulpinus. *Lobel, kruid-b., fol. 216.*

Belgicè : *Vosse-kullekens*; gallicè : *Testicules de renard.*

In sylvis propè *Diligem*, alibi nonquam vidi.

25. *O. GLOBOSA*. Bulbis indivisis, nectarii labio resupinato, trifido, media emarginata, cornu brevi, petalis apice sublati. *Linn. syst. nat. 589; Scop. carn. sp. 1106; Jacq. aust. 292, tab. 265.*

Orchis flore globoso. *Bauh. pin. 81.*

Orchis batavica sexta. *Clus. hist. rar. fol. 269.*

Orchis radicibus subrotundis, spicâ densissimâ, petalis exterioribus aristatis. *Hall. hist., n. 1272, tab. 27.*

In loco dicto *den Hoogen-Leest*, ad *Laken*, propè arcem D. *De Poederlé*. Rarior.

26. *O. MORIO*. Bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido, crenulato, cornu obtuso adscendente, petalis obtusis conniventibus. *Linn. syst. nat. 589; Fl. dan. tab. 253; Scop. carn. sp. 1110; Gouan, hort. monsp. 469.*

Orchis radicibus subrotundis, galeæ petalis lineatis, labello trifido, crenato, medio segmento emarginato; *Hall. hist. 1282, tab. 33.*

Orchis morio femina; *Bauh. pin. 82; Moris. hist. 3, fol. 491; Tourn. inst. 433; Boerh. hort. lugd., fol. 152, p. 2.*

Testiculus morionis femina. *Dodon, kruid-b. 373; Dalech. hist. 2, fol. 424.*

Cynosorchis morio femina. *Lobel, kruid-b., fol. 215.*

Belgicè : *Zots-kap-wyfken*; gallicè : *Testicules de chien.*  
Ad *Berchem* in pomario villæ *Letpens*.

27. *O. LATIFOLIA*. Bulbis subpalmatis, rectis, nectarii cornu conico, labio trilobo lateribus reflexis, bracteis flore longioribus. *Linn. syst. veget. 53, n. 36; Fl. danic. tab. 266; Scop. carn. sp. 1118.*

Orchis radicibus palmatis, bracteis cordatis, labello circumserrato, trilobato, lobo medio emarginato. *Hall. hist., n. 1280.*

Orchis palmata palustris latifolia. *Bauh. pin. 86; Boerh. hort. lugd. 152.*

Cynosorchis palustris platiphylla. *Dalech. hist. 2, fol. 433.*

Satyrion Basilicum foliosum. *Dodon, kruid-b., fol. 381.*

- Serapias palustris latifolia. Lobel, kruid-b., fol. 224.*  
 Belgicè : *Groot-handekens-kruid*; gallicè : *Orchis à larges feuilles*  
 In pratis circum *D. De Poederlé, ad Laken*. Rara civis.
28. *O. MACULATA*. Bulbis palmatis, patentibus, nectarii cornu germinibus brevior, labio plano, petalis dorsalibus erectis. *Linn. sp. pl. 942, n. 12; Scop. carn. sp. 1119; Gouan, hort. monsp. 471.*  
*Orchis radicibus palmatis. caule solido, labello trifido, serrato; medio segmento acuminato. Hall hist., n. 1278.*  
*Orchis palmata pratensis, et montana maculata Bauh. pin. 85—86.*  
*Satyrium Basilicum femina. Dodon, kruid-b., fol. 381.*  
*Palma Christi seu Serapias pratensis. Lobel, kruid-b., fol. 223.*  
*Serapias pratensis. Dalech. hist. 2, fol. 439.*  
 Belgicè : *Handekens-kruid-wyfken*; gallicè : *Orchis maculée.*  
 In nemoribus propè *Anderlecht, Laken, Jette, etc., Variat foliis non maculatis et fere duplo latioribus in humo pinguiori.*
29. *O. CONOPSEA*. Bulbis palmatis, nectarii cornu setaceo, germinibus longior, labio trifido, petalis duobus patentissimis. *Linn. sp. pl. 942, n. 13; Jacquin, fl. aust. 293; Scop. carn. sp. 1121.*  
*Orchis palmata pratensis minor, calcaribus oblongis. Bauh. pin. 85.*  
*Orchis radicibus palmatis, calcare longissimo, labello trifido, obtuso, unicolore. Hall. hist., n. 1287, tab. 29.*  
*Satyrium Basilicum mas. Dodon, kruid-b., fol. 380.*  
*Serapias mas, lævi folio. Lobel, kruid-b., fol. 223.*  
 Belgicè : *Handekens-kruid-manneken*; gallicè : *Herbe à moucheron.*  
 In pratis sylvarum propè *Berchem*. Orchides omnes perennes, maio florent.
30. *SATYRIUM*. Nectarium scrotiforme seu inflatodidymum pone florem.
30. *S. HIRCINUM*. Bulbis indivisis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido, intermediâ lineari, elongatâ, obliquâ, præmorsâ. *Linn. sp. pl. 941; Jacq. tab. 367.*  
*Orchis hircina. Scop. carn. sp. 1113.*



*Orchis barbata* odore hirci. *Bauh. pin.* 20; *Moris. hist.* 3, fol. 491, tab. 12, fig. 9.

*Cynosorchis secundus*. *Dodon, kruid-b.*, fol. 372.

*Cynosorchis majoris secunda species*. *Lobel, kruid-b.* 214.

*Orchis radicibus subrotundis, labello longissimo, tripartito, plicato* *Hall. hist.*, n. 1268, tab. 25.

Belgicè : *Bokx-kullekens*; gallicè : *Testicules de bouc*.

In sylvula propè *Huyssingen* vulgò *den Krekelaer*.  
Rarior.

#### 14. OPHRYS. Nectarium subtus sub carinatum.

31. *O. OVATA*. Bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ovatis, nectarium labio bifido. *Linn. sp. pl.* 946, n. 5; *Scop. carn. sp.* 1132.

*Ophrys bifolia*. *Bauh. pin.* 87; *Boerh. hort. lugd.*, fol. 153, p. 2.

Bifolium. *Dodon, kruid-b.* 383; *Lobel, kruid-b.* 372.

*Epipactis foliis binis ovatis, labello bifido*. *Hall. hist.* 1291, tab. 27.

Belgicè : *Twec-blad*; gallicè : *Double-feuille*.

In sylvis humidis ubique. Perennis maio florens.

32. *O. CORDATA*. Bulbo fibroso, caule bifolio, foliis cordatis. *Linn. sp. pl.* 946, n. 6; *Scop. carn. sp.* 1133.

*Ophrys minima*. *Bauh. pin.* 87; *Boerh. hort. lugd.*, fol. 153.

Bifolium minimum. *Bauh. hist.* 3, fol. 534; *Moris. hist.* 3, fol. 489.

*Epipactis foliis binis cordatis, labello bifido, postice bidentato*. *Hall.* 1292, tab. 22, fig. 4.

Belgicè : *Kleyn-Twec-blad*; gallicè : *Petite-Double feuille*.

Ad *Laken* vulgò *in de Katte-poelen*. Perennis, fine maio florens. Rara.

33. *O. MYODES*. Bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarium labio oblongo, quadripartito, laciniis duabus mediis elongatis lanceolatis. *Linn. syst. veget.* 57, n. 17; *Jacquin, icon. rar. tab.* 74; *Bauh. hist.* 2, fol. 767.

*Orchis muscaria*. *Scop. carn. sp.* 1114.

*Orchis radicibus subrotundis, labello sericeo, bisulco, brachiolis brevibus subulatis*. *Hall. hist.*, n. 1265, tab. 24.

*Orchis muscam* referens, major et lutea. *C. Bauh. pin.* 83.  
*Orchis muscam* cœrulæam majorem representans. *Morris. hist.* 3, fol. 494, tab. 13, fig. 11.  
*Orchis myodes prima gemmæ. Lobel, kruid-b.* 218 et altera, fol. 219; *Dalech. hist.* 2, fol. 429—430.  
 Belgicè : *Vliegen*; gallicè : *Fleur-Mouche*.  
 In sylvis propè *Berchem*, etc. Perennis, initio junii florens. *Rara*.

15. **SERAPIAS.** Corolla patens hexapetala, nectarium ovatum gibbum, labio ovato, capsula infera unilocularis, trivalvis.

34. *S. LATIFOLIA.* Bulbis fibrosis, foliis ovatis amplexicaulibus, floribus pendulis. *Linn. syst. nat.* 593; *Fl. danic. tab.* 811; *Scop. carn. sp.* 1128.

*Epipactis* foliis amplexicaulibus-ovato-lanceolatis, labello lanceolato. *Hall. hist.*, n. 1257, tab. 40.

*Helleborine. Dodon, kruid-b.*, fol. 628.

*Helleborine* sive *Epipactis* recentiorum. *Lobel, kruidboek*, fol. 583.

*Helleborine latifolia montana. Bauh. pin.* 186; *Boerh. hort. lugd.* 153, p. 2.

Belgicè : *Wi*; *Nies-kruid*; gallicè : *Helleborine*.

In sylvis propè *Terhameren*, etc. Perennis, julio florens:

16. **LEMNA.** Monoïca. *Masc.* Monophyllus, corolla nulla. *Fem.* Idem, stylus unus, capsula uni-aut-bilocularis, mono-aut-disperma.

35. *L. TRISULCA.* Foliis petiolatis, lanceolatis. *Linn. sp. pl.* 970, n. 1; *Gouan, hort. monsp.* 479.

*Lenticula trisulca. Scop. carn. sp.* 1143.

*Hydrophace* caule filiformi, foliis ellipticis, lanceolatis, viviparis. *Hall. hist.*, n. 1901.

*Lenticularia ramosa monorrhiza*, foliis oblongis, pediculis longioribus donatis. *Michel, nov. pl. gen.*, fol. 16, tab. 11, fig. 5.

*Hederula aquatica. Lobel, kruid-b.*, fol. 42, p. 2.

*Lenticula aquatica trisulca. Bauh. pin.* 362.

Belgicè : *Water-heyl*; gallicè : *Grande Lentille d'eau*.

In rivulo arcis D. *Van Uffel* inter *Laken* et *Heembeek*.

36. *L. MINOR.* Foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus solitariis. *Linn. sp. pl.* 970, n. 2; *Gouan, hort. monsp.* 479.

- Lenticula minor*: Scop. carn. sp. 1142.  
*Lenticula minor monorrhiza*, foliis utrinque viridibus.  
*Michel*, gen. pl., fol. 16, tab. 11, fig. 3.  
*Lens minor*: Dodon., kruyd b., fol. 930; Lobel., kruyd-b. 284, p. 2.  
*Hydrophace monorrhiza foliis planis, ovatis*. Hall. hist., 1900.  
*Lenticula palustris*; Bauh. pin. 362.  
 Belgicè: *Water-Linsen*; gallicè: *Petite Lentille d'eau*.  
 In aquis stagnantibus ubiquè.
37. *L. GIBBA*. Foliis sessilibus, subtus hæmisphæricis, radicibus solitariis. Linn. sp. plant. 970, n. 3.  
*Lens palustris major*, infernè convexa, fructu monospermo. Michel, gen., fol. 15, tab. 11, fig. 2.  
*Hydrophace monorrhiza*, foliis pulvinatis, infernè convexissimis. Hall. hist., n. 1898.  
 Belgicè: *Padde-groen*; gallicè: *Lentille d'eau*.  
 In aquis Mœniorum et alibi in stagnis.
38. *L. POLYRRHIZA*. Foliis sessilibus, radicibus confertis. Linn. sp. pl. 970, n. 4.  
*Lenticula major polyrrhiza*, infernè atropurpurea. Michel, gen., fol. 16, tab. 11, fig. 1.  
*Hydrophace polyrrhiza foliis ovatis planis*. Hall. hist., n. 1899.  
 Belgicè: *Endgroen*; gallicè: *Lentille de marais*.  
 In aquis ubiquè.
39. *SALIX*. Dioïca, squamæ amenti unifloræ, corolla nulla. Masc. Glandula baseos nectarifera. Fem. Stylus bifidus, capsula unilocularis, bivalvis; semina papposa.
39. *S. AMYGDALINA*. Foliis serratis, glabris, lanceolatis, petiolatis, stipulis trapeziformibus. Linn. syst. veget. 72, n. 8; Gouan., hort. monsp. 501.  
*Salix folio amygdalino utrinque virente, aurito*. Bauh. pin. 473; Tourn. inst. 591.  
*Salix stipulis serratis, foliis lanceolatis, serratis glabris*. Hall. hist., n. 1636.  
 Belgicè: *Taeye Weyde*; gallicè: *Osier commun*.  
 Ad Molenbeek, Berchem, Jette, etc. Communis.
40. *S. ALBA*. Foliis lanceolatis, subserratis, acuminatis, utrinque pubescentibus, serraturis infimis glandulosis. Linn. sp. pl. 1021; Scop. carn. sp. 1212.

*Salix vulgaris alba arborescens.* *Bauh. pin.* 473; *Dalech. hist.* 1, fol. 232; *Tourn. inst.* 591.

*Salix Dioscoridis.* *Lobel, kruid-b.*, fol. 159, p. 2:

Belgicè : *Witte Willig*; gallicè : *Saule blanc.*

*Circum prata propè Laken, etc.*

41. *S. VIMINALIS.* Foliis lanceolato-linearibus, subser-ratis, longissimis, acutis, subùs sericeis, ramis vir-gatis. *Linn. sp. pl.* 1021, n. 27; *Scop. carn. sp.* 1211.

*Salix folio longissimo, angustissimo, utrinque albido.* *Bauh. pin.* 474.

*Salix foliis prælongis, obscure dentatis, subtùs to-mentosis, albicantibus.* *Hall. hist.*, n. 1641.

*Salix aquatilis.* *Lobel, fol.* 160, p. 2

*Salix folio longo, angusto, acuto, leviter serrato, supra viridi, infra albescente, viminibus luteis.* *Boerh. hort. lugd.*, fol. 210, p. 2.

Belgicè : *Korfwilleg, geële Wym*; gallicè : *Osier jaune.*  
*Juxta aquas communis.*

42. *S. FRAGILIS.* Foliis serratis, glabris, ovato-lanceolatis, petiolis dentato-glandulosis. *Linn. syst. veget.* 72, n. 11; *Bauh. pin.* 474; *Rai. hist.* 3, fol. 448; *Gouan, hort. monsp.* 501.

*Salix stipulis dentatis, foliis glabris, ovato-lanceolatis, glumis pilosis ovatis.* *Hall. hist.* 1638.

Belgicè : *Kraeh-willeg, Katten-hout*; gallicè : *Saule commun.*

*Secus aquas frequens; species maxima cum salice albâ.*

43. *S. CAPRÆA.* Foliis ovatis, rugosis, subtùs tomentosis, undatis, supernè denticulatis. *Linn. sp. pl.*, fol. 1020, n. 26; *Scop. carn. sp.* 1205.

*Salix pumila latiore folio.* *Dodon, kruid-b.* 1320.

*Salix latifolia rotunda.* *Bauh. pin.* 474; *Rai. hist.* 3, fol. 449; *Tourn. inst.* 591.

*Salix foliis ovatis, rugosis, subtùs reticulatis, tomen-tosis, julis ovatis, stipulis amplexicaulibus serratis.* *Hall. hist.*, n. 1633.

*Salix latifolia infernè hirsuta.* *Bauh. hist.* 1, fol. 215.

Belgicè : *Peselaer, Wervel-hout*; gallicè : *Marseau-Chevrette.*

*In sylvis juxta aquas.*

44. *S. MONANDRA.* Foliis lineari-lanceolatis, glabris, serratis, superioribus obliquis, amentis tomentosis; floribus monandris. *Linn. syst. veget.*, 72 n. 1.

*Salix helix et purpurea. Linn. syst. nat. 648, n. 10—11.*

*Salix pratensis et purpurea. Scop. carn. sp. 1203—1209.*

*Salix monandra. Arduin, memor. 1, sp. 67, tab. 11  
Hall. hist., n. 164.*

*Helice Theophrasti. Dalech, hist. 1, fol. 233.*

Belgicè : *Beekwillig*; gallicè : *Marseau*.

*Juxta rivulos communis. Stamina duo antherifera vidi.*

45. *S. AURITA. Foliis integerrimis, utrinque obovatis, appendiculatis Linn. syst. veget. 73, n. 23.*

*Salix foliis rugosis, reticulatis, integerrimis, infernè tomentosis, julis ovatis. Hall. hist. 1652.*

*Salix pumila folio rotundo. Bauh. hist. 2, fol. 217;  
Rai. hist. 3, fol. 450.*

*Salix minima flore eleganti luteo. Boerh. hort. lugd. 211.*

Belgicè : *Felber, Kleyne Willig*; gallicè : *Petit Marseau*.  
vulgò *in het Terneër-veld*, in sylvis, etc. *Salices omnes*  
*sine aprilis florent.*

18. **FRAXINUS.** *Polygama*, calix nullus, seu 4 partitus; corolla nulla, aut 4 petala; pericarpium biloculare, supernè foliaceo-compressum; semina pauca pèndula.

46. *F. EXCELSIOR. Foliis serratis, floribus apetalis. Linn. sp. pl. 1057, n. 1; Bauh. pin. 416; Boerh. hort. lugd. 171; Blakw. herb., tab. 328; Tourn., inst. 577.*

*Fraxinus ornus. Scop. carn. sp. 1249.*

*Fraxinus. Dodon, kruid-b. 1304; Lobel, kruid-b. 127, p. 2; Dalech. hist. 1, fol. 69; Matthiol., in diosc. 66.*

*Fraxinus apetalà, foliis pinnatis, serratis. Hall. hist., n. 528.*

*Ornus vulgaris. Michel, nov. pl. gen. fol. 223, tab. 103.*

Belgicè : *Esschen Boom*; gallicè : *Frêne*.

*Circum prata inque sylvis, etc. Initio maii floret.*

## DIGYNIA.

19. **ANTHOXANTHUM.** Calix gluma bivalvis uniflora, corollæ gluma bivalvis acuminata, semen unicum.

47. *A. ODORATUM. Spicâ oblongâ ovatâ, flosculis subpedunculatis aristâ longioribus. Linn. sp. pl. 28,*

- n. 1; Scop. carn. sp. 38; Jacquin, fl. austr., fol. 6; Gouan, hort. monsp. 20.*  
 Gramen anthoxanthos. *Dalech. hist. 1, fol. 356.*  
 Gramen pratense, spicâ flavescence. *Bauh. pin. 3.*  
 Gramen spicatum pratense, spicâ flavescence. *Scheuchz. agrast. fol. 88.*  
 Gramen montanum odoratum spicatum. *Scheuchz. id. 89, variet. prioris.*  
 Avena diantha folliculo villosa, calicis glumis inæqualibus, altera de imo dorso, altera de summo aristata. *Hall. hist., n. 1491.*  
 Belgicè : *Riekende Gras*; gallicè : *Foin odorant.*  
 In pratis; non rara. Mense maio floret, perennis.



## CLASSIS TERTIA.

## TRIANDRIA.

## MONOGYNIA.

20. VALERIANA. Calix nullus, corolla monopetala, hinc gibba supera; semen unum vel capsula trilocularis.
48. *V. OFFICINALIS*. Foliis omnibus pinnatis dentatis: *Linn. sp. pl.* 31, n. 5; *Scop. carn. sp.* 39; *Jacq. austr.*, fol. 7; *Gouan, hort. monsp.* 21; *Blakw. herb. tab.* 271.  
*Valeriana* foliis pinnatis, pinnis dentatis. *Hall. hist.*, n. 210.  
*Valeriana sylvestris*. *Dodon, kruid-b.* 565; *Lobel, kruid-b.* 872.  
*Valeriana sylvestris prima*. *Clus. hist. rar.* 55, p. 2.  
*Phu parvum*. *Matthiol. in diosc.* 11; *Dalech. hist.* 1, fol. 910.  
 Belgicè: *St.-Jooris-Kruid*; gallicè: *Valeriane sauvage*.  
 Juxta aquas ubique. Perennis, julio florens.
49. *V. DIOICA*. Foliis pinnatis integerrimis, floribus dioicis. *Linn. sp. pl.*, n. 4; *Scop. carn. sp.* 40; *Jacq. austr.*, fol. 7; *Fl. dan. tab.* 687.  
*Valeriana* foliis radicalibus petiolatis, ovatis, caulinis, pinnatis, sexu distinctis. *Hall. hist.*, n. 208.  
*Valeriana minor*. *Blakw. herb. tab.* 284.  
*Valeriana minima*. *Dodon, kruid-b.* 566; *Dalech. hist.* 1, fol. 910.  
*Valeriana palustris minor*. *Bauh. pin.* 164; *Boerh. hort. lugd.*, fol. 74.  
*Valeriana sylvestris secunda minor*. *Clus. hist. rar.* 55, p. 2.  
 Belgicè: *Kleyn St.-Jooris-Kruid*; gallicè: *Petite Valeriane*.  
 Ad Molenbeek vulgò in 't Broek. Nec alibi. Sexus inconstans, nempe flores monoicos, dioicos et hermaphroditos reperi. Perennis, junio florens.

50. *V. LOCUSTA*. Caule dichotomo, foliis linearibus integerrimis. *Linn. sp. pl.* 33, n. 14; *Scop. carn. sp.* 46; *Gouan, hort. monsp.* 22; *Fl. dan. tab.* 738. *Valerianella* foliis oblongis, serratis, seminis coronâ tridentatâ. *Hall. hist.*, n. 214—215. *Valeriana campestris inodora major. Bauh. pin.* 165. *Pseudo-Valeriana annua, arvensis, præcox, humilis, semine compresso rotundo. Moris. hist.* 3, fol. 104, tab. 16, fig. 30. *Phu minimum alterum. Lobel, kruid-b.*, fol. 874; *Dalech. hist.* 2, fol. 29. *Album olus. Dodon, kruid-b.*, fol. 1010. *Belgicè : Wit-Moes, Veld-Salaed; gallicè : Mâche. In arvis communis. Annua initio septembris florens.*
51. *V. DENTATA*. Caule dichotomo, foliis oblongis, dentatis. *Linn. syst. veget.* 92, n. 17; *Gouan, hort. monsp. sp.* 22. *Pseudo-Valeriana, annua, semine coronato, major, lusitanica. Moris. hist.* 3, fol. 104, tab. 16, fig. 29. *Phu minimum. Lobel, kruid-b.*, fol. 874. *Varietas hujus pumila. Valerianella semine stellato. Bauh. pin.* 165. *Valerianella foliis oblongis, serratis, semine tridentato. Hall. hist.*, n. 215. *Ad Laken, propè la Bagatelle D. Walkiers.*
21. *BRIONIA. Monoïca*, calix quinquedentatus, corolla quinquepartita. *Masc. Antheræ basi connexæ. Fem. Stylus quadrifidus, bacca subglobosa ut plurimum monosperma.*
52. *B. ALBA*. Foliis palmatis, utrinquè calloso-scabris. *Linn. sp. pl.* 1012, n. 1; *Scop. carn. sp.* 1200; *Gouan, hort. monsp.* 498; *Blakw. herb. tab.* 535. *Brionia foliis palmatis, scabris. Hall. hist.*, n. 574. *Brionia alba. Dodon, kruid-b.* 655; *Dalech. hist.* 2, fol. 295. *Vitis alba seu Brionia. Lobel, kruid-b.* 745; *Matthiol. in Diosc.* 408. *Brionia aspera sive alba, baccis rubris. Bauh. pin.* 297; *Boerk. hort. lugd.* 61. *Belgicè : Wilden Wyngaert; gallicè : Coluvrée. In sepibus communis; flores dioïcos interdum gerit. Perennis, fine maii florens.*



22. IRIS. Corolla sexpartita, petalis alternis reflexis; stigmata petaliformia, cuculato-bilabiata.

53. *I. PSEUDO-ACORUS*. Corollis imberbibus, petalis interioribus stigmatibus minoribus, foliis ensiformibus. *Linn. sp. pl.* 38, n. 7; *Scop. carn. sp.* 49; *Fl. dan. tab.* 194; *Gouan, hort. monsp.* 26.

*Pseudo-iris*. *Dodon, kruyd-b.* 395; *Dalech. hist.* 2, fol. 485.

*Acorus nostras palustris*. *Lobel, kruyd-b.* 83.

*Acorus adulterinus*. *Bauh. pin.* 34; *Blakw. herb. tab.* 261.

*Acorum falsum*. *Matthiol. in diosc.*, fol. 3.

Belgicè : *Geél Lisch*; gallicè : *Glaieul*.

In aquis Mœniorum propè portam *Anderlecht*, adque ripas lacuum *Elterbeek*, *Ten-Noode*, etc. Perennis, junio florens.

23. ERIOPHORUM. Glumæ paleaceæ undiquè imbricatæ, corolla nulla, semen triquetrum, lanâ longissimâ cinctum.

54. *E. POLYSTACHION*. Culmis teretibus, foliis planis, spicis pedunculatis. *Linn. sp. pl.* 52, n. 2; *Gouan, hort. monsp.* 32.

*Linagrostis polystachia*. *Scop. carn. sp.* 66.

*Linagrostis paniculâ ampliore*. *Tourn. inst.* 664, *Scheuchz. agrost.* 306.

*Gramen eriophorum*. *Dodon, kruyd-b.*, fol. 892.

*Juncus bombicinus*. *Lobel, kruyd-b.* 121; *Bauh. hist.* 2, fol. 514.

*Eriophorum foliis planis, spicis pendulis*. *Hall. hist.*, n. 1331.

Belgicè : *Wolle-Gras*, *Kwispel-Biesen*; gallicè : *Linagrette*.

In fossis pratorum juxta plateam *Vorst*. Perennis, julio florens.

24. SCIRPUS. Glumæ paleaceæ undiquè imbricatæ, corolla nulla, semen unum imberbe, triquetrum sæpè villosum.

55. *S. LACUSSTRIS*. Culmo triquetro, nudo, spicis ovatis, pluribus pedunculatis lateralibus. *Linn. sp. pl.* 48, n. 8; *Scop. carn. sp.* 59; *Gouan, hort. monsp.* 30.

*Scirpus caule tereti, paniculâ laterali ramosâ, locustis ovalis.* *Hall. hist., n. 1337.*

*Scirpus palustris altissimus.* *Tourn. inst. 528; Scheuchz. agrost. 354.*

*Juncus maximus seu Scirpus.* *Bauh. pin. 12; Boerh. hort. lugd., fol. 164.*

*Juncus aquaticus maximus.* *Lobel, kruyd-b. fol. 120;*

*Juncus holoschænus.* *Dodon, kruyd-b., fol. 956.*

Belgicè : *Matten-Biesen*; gallicè : *Jonc.*

In aquis canalibus propè *de Dry-Gaeten*, inque piscinâ pone pastoratium *Uccle*. Perennis, junio florens.

56. *S. MARITIMUS.* Culmo triquetro, paniculâ foliaceâ spicis intermediis sessilibus, lateralibus pedunculatis, spicularum squamis trifidis, intermediâ subulatâ. *Linn. sp. pl. 51, n. 20; Gouan, hort. monsp. 31.*

*Scirpus maritimus.* *Scop. carn. sp. 57, variet. 3.*

*Cyperus paniculâ sparsâ è spicis longioribus, tenuioribus, teretibus, compositâ.* *Scheuchz. agrost. 398, id. 400, tab. 9, fig. 7, 8, 9, 10.*

*Scirpus caule triquetro, paniculâ foliosâ, ramosâ, locustis ovatis, nutantibus, glumis dentatis, aristatis.* *Hall. hist., n. 1339.*

*Cyperoides aquaticum vulgatius.* *Lobel, kruyd-b. 21; Bauh. hist. 2, fol. 495.*

Belgicè : *Wild Galigaen-gras*; gallicè : *Scirpe marin.*

In aquis Mœniorum propè *de Kleyne Spuy*, inque piscinâ vulgò *den Hond-Nest*. Perennis, junio florens.

57. *S. SYLVATICUS.* Culmo triquetro folioso, umbellâ foliaceâ, pedunculis nudis, supradecompositis, spicis confertis. *Linn. sp. pl. 51, n. 22; Scop. carn. sp. 58; Leers, herb., n. 36, tab. 1, fig. 4; Jacq. austr., fol. 19.*

*Scirpus planifolius, paniculâ ramosissimâ, locustis ovatis.* *Hall. hist. 1340.*

*Cyperus gramineus.* *Bauh. hist. 2, fol. 502, Scheuchz. agrost. 394.*

*Cyperus graminea sive miliacea.* *Lobel, kruyd-b. 109; Dalech. hist. 1, n. 867.*

Belgicè : *Hirs-Galigaen-gras*; gallicè : *Souchet-Millet.*

In paludosis sylvaticis, inque aquis Mœniorum. Perennis, junio florens.

58. *S. CÆSPITOSUS*. Culmo striato nudo, spicâ bivalvi, terminali, longitudine calicis, radicibus squamulâ interstinctis. *Linn. syst. veget.* 125, n. 9; *Fl. dan. tab.* 167.

*Scirpus* caule tereti, aphylo, spicâ pauciflorâ, acuminatâ, calicinæ glumæ longitudine. *Hall. hist.*, n. 1334.

*Juncus parvus montanus*, cum parvis capitulis luteis. *Bauh. hist.* 2, fol. 523; *Moris. hist.* 3, fol. 333, tab. 10, fig. 35.

*Scirpus montanus* capitulo brevior. *Tourn. inst.* 528; *Scheuchz. agrost.* 363, tab. 7, fig. 18.

*Juncus parvus palustris*, cum parvis capitulis equiseti. *Raij. hist.* 1306.

Belgicè : *Katte-Biesen*.

Ad *Ganshoren*, propè castellum comitis. Perennis, fine julii florens.

59. *S. PALUSTRIS*. Culmo tereti, nudo, spicâ subovatâ, terminali. *Linn. sp. pl.* 47, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 56; *Leers, herb.*, n. 34, tab. 1, fig. 3.

*Scirpus* caule tereti, spicâ unicâ terete multiflorâ. *Hall. hist.*, n. 1336.

*Scirpus equiseti* capitulo. *Scheuchz. agrost.* 360 — 361, n. 1 — 3, tab. 7, fig. 17.

*Juncus aquaticus minor*, capitulis equiseti. *Lobel, kroyd-b.* 120.

*Juncus capitulis equiseti major*. *Bauh. pin.* 12; *Boerh. hort. lugd.* 164.

*Juncus clavatus*. *Dalech. hist.* 1, fol. 86.

Belgicè : *Kleyne Water-biesen*; gallicè : *Petit Jonc*. Ad *Molenbeek*, in aquis Mœniorum, etc. Fine junii floret, perennis.

25. *CYPERUS*. Glumæ paleaceæ, distiche imbricatæ; corolla nulla; semen unum nudum.

60. *C. Fuscus*. Culmo triquetro, nudo, umbellâ trifidâ, pedunculis simplicibus, inæqualibus, spicis confertis, linearibus. *Linn. sp. pl.* 46, n. 13; *Leers, herb.*, tab. 1, fig. 2; *Scop. fl. carn.*, n. 54.

*Cyperus* umbellâ trifoliâ, spicis petiolatis, congestis, glumis ovato-lanceolatis. *Hall. hist.*, n. 1349.

*Cyperus minimus*, paniculâ sparsâ nigricante. *Tourn. inst.* 527; *Scheuchz. agrost.* 384.

Gramen cyperoïdes minus, paniculâ sparsâ nigricante;  
*Bauh. pin.* 6.

Belgicè : *Swart Bies-gras* ; gallicè : *Souchet brun* .<sup>1</sup>

In pratis *St.-Gillis* juxta fossas, alibi non vidi. Julio  
 floret, perennis.

26. **TYPHA.** Amentum cylindricum, corolla nulla.  
*Masc.* Calix obsoletus, triphyllus. *Fem.* In eâ-  
 dem plantâ infrâ masculos, calix capillo villosus,  
 semen unum insidens pappo capillari.

61. **T. LATIFOLIA.** Foliis subensiformibus, spicâ mas-  
 culâ femineâque approximatis. *Linn. sp. pl.* 971,  
*n.* 1, *Scop. fl. carn. sp.* 1144; *Gouan, hort. monsp.*  
 480.

*Typha clavâ unicâ. Hall. hist., n.* 1305.

*Typha palustris. Dodon, kruid-b.* 954; *Lobel, kruid-b.*  
 113; *Dalech. hist.* 1, *fol.* 867.

*Typha palustris major. Bauh. pin.* 20; *Moris. hist.* 3,  
*fol.* 246., *tab.* 13, *fig.* 1; *Boerh. hort. lugd.* 167,  
*p.* 2; *Tourn. inst.* 530.

Belgicè : *Lisch-dodde* ; gallicè : *Masse d'eau*.

In piscinis *Jette*, etc. Perennis, julio florens.

27. **SPARGANIUM.** Flores *monoïci*, conglobati,  
 corolla nulla. *Masc.* Calix triphyllus. *Fem.* Calix  
 hexaphyllus, stigma bifidum, drupa exsucca,  
 supera, unilocularis, mono-aut-disperma.

62. **S. ERECTUM.** Foliis lineari-lanceolatis, nervo elevato.  
*Linn. sp. pl.* 971, *n.* 1; *Scop. fl. carn. sp.* 1146;  
*Gouan, hort. monsp.* 480.

*Sparganium ramosum. Bauh. pin.* 15; *Boerh. hort.*  
*lugd.* 168; *Moris. hist.* 3, *fol.* 247; *Tourn. inst.*  
 530.

*Sparganium sive Butomon. Dodon, kruid-b.* 951;  
*Lobel, kruid-b.* 112.

*Sparganium caule foliisque erectis. Hall. hist., n.* 1303;  
*Sparganium. Matthiol. in diosc., fol.* 329.

Belgicè : *Riet-gras* ; gallicè : *Ruban d'eau*.

In aquis *Mœniorum*, etc. Fine julii floret, perennis.

63. **S. SIMPLEX.** Foliis basi triangularibus : lateribus  
 planis, pedunculis simplicibus. *Linn. syst. veget.*  
 147, *n.* 3.

*Platanaria altera*. *Dodon, kruid-b.* 951; *Lobel, kruid-b.* 113.

*Sparganium non ramosum*. *Bauh. pin.* 15; *Tourn. inst.* 531; *Moris. hist.* 3, *fol.* 247.

*Sparganium*. *Dalech. hist.* 888, *tom.* 1.

Belgicè : *Water Lisch*; gallicè : *Petit Ruban d'eau*.

Cum precedenti habitat, etc.

28. *CAREX*. *Monoïca*, amentum imbricatum; calix monophyllus; corolla nulla; nectarium inflatum, tridentatum; stigmata tria, vel unum trifidum; semen triquetrum intrà nectarium.

64. *C. PSEUDO-CYPERUS*. Spicis pendulis, pedunculis geminatis, unicâ androgynâ infernè masculâ. *Linn. sp. pl.* 978, *n.* 34; *Moris. hist.* 3, *fol.* 242, *tab.* 12, *fig.* 5; *Gouan, hort. monsp.* 482.

*Pseudo-cyperus*. *Dodon, kruid-b.* 547; *Lobel, kruid-b., fol.* 109.

*Carex* spicis femininis, pendulis, asperis, capsulis longè aristatis, retroversis. *Hall. hist., n.* 1397.

*Cyperoides* spicâ pendulâ breviorè. *Bauh. pin.* 6; *Tourn. inst.* 529; *Scheuchz. agrost.* 440, *n.* 1; *Boerh. hort. lugd.* 165, *p.* 2.

Belgicè : *Wilden Galigaen*.

In aquis Mœniorum propè *de Groote-Spuye* et alibi. Junio floret, perennis.

65. *C. VESICARIA*. Spicis masculis pluribus, femineis pedunculatis, capsulis inflatis, acuminatis. *Linn. sp. pl.* 979, *n.* 29; *Scop. fl. carn. sp.* 1164; *Leers, herb., n.* 724, *tab.* 16, *fig.* 2.

*Carex* spicis maribus una pluribus, femineis teretibus, pendulis, capsulis conicis, rostratis, bicornibus. *Hall. hist., n.* 1409.

Gramen palustre majus. *Lobel, kruid-b., fol.* 13.

*Cyperoides vesicarium*, glabrum, spicâ pendulâ longiore. *Tourn. inst.* 530.

*Cyperoides vesicarium*, spicis viridantibus vel subfuscis. *Scheuchz. agrost.* 470, *n.* 6, *fol.* 472, *n.* 7.

Belgicè : *Zeghe, Water Riet-gras*.

Juxta aquas in locis sylvaticis. Perennis, junio florens.

66. *C. HIRTA*. Spicis remotis, masculis pluribus, femineis subpedunculatis, erectis, capsulis hirtis. *Linn. sp. pl.* 982, *n.* 39; *Leers, herb., n.* 7, *tab.* 16, *fig.* 3.

*Carex* caule, foliis, capsulisque hirsutis. *Hall. hist.*, n. 1403.

*Cyperoïdes polystachion lanuginosum*. *Scheuchz. agrost.*, fol. 478; *Moris. hist.* 3, fol. 243, tab. 12, fig. 10; *Tourn. inst.* 529.

Ad *Watermaele* juxta rivulos in pratis. Junio florens, perennis.

67. *C. PATULA*. Culmo folioso, foliis retrorsum scabris, spicis gracilibus, masculâ erectâ, triquetrâ, femineis pendulis, laxis, prælongis, capsulis rostratis. *Leers, fl. herb. tab.* 15, fig. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 1160, tab. 59.

*Cyperoïdes sylvarum, tenuius spicatum*. *Tourn. inst.* 530; *Scheuchz. agrost.*, fol. 418, n. 6.

*Gramen cyperoïdes sylvarum, tenuius spicatum*. *Raij. hist.* 1295; *Moris. hist.* 3, fol. 243, tab. 12, fig. 9.

*Carex* spicis femineis pendulis, raris, prælongis, capsulis rostratis, bilidis. *Hall. hist.*, n. 1395.

België : *Bosch-Cypers-gras*.

In sylvis *Linthout, Terkameren, etc.* Perennis, junio florens.

68. *C. ACUTA*. Spicis masculis pluribus, femineis subsessilibus, capsulis obtusiusculis. *Linn. sp. pl.* 978, n. 28; *Leers, fl. herb.*, n. 723, tab. 16, fig. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 1158.

*Carex* spicis maribus ovatis, femineis gracilibus, erectis, capsulis triquetris. *Hall. hist.*, n. 1406.

*Cyperoïdes foliis caryophyllæis, spicis habitioribus, squamis curtis*. *Mich. gen. et sp.* 62, tab. 32, fig. 12.

*Gramen Cyperoïdes*. *Lobel, kruid-b.*, fol. 13; *Dalech. hist.* 1, fol. 363.

*Cyperoïdes latifolium, spicâ rufâ, caule triangulo (et Cyperoïdes nigro-luteum, vernum, minus)*. *Scheuchz. agrost.*, fol. 458—460.

België : *Cypers-gras*; gallicè : *Lèche*.

In aquis ubique. *Variat spicâ rufâ et nigrâ*. Perennis; maio florens.

69. *C. VERNA*. Foliis cæspitosis, brevibus, spicis confertis, erectis, subpetiolatis, brevibus, capsulis ovato-triquetris. *Hall. hist.*, n. 1381.

*Cyperoïdes alpinum, caryophyllatæ foliis, spicis tenuibus, fusco-rufescentibus*. *Scheuchz, agrost.*, fol. 433.

Gramen Cyperoides , vernum ; minimum. *Raij. hist.* 1294.

Gramen spicatum , foliis vetonicae caryophyllatae. *Lobel , kruyd-b. , fol.* 16.

Belgicè : *Genoffel-gras.*

Ad *Schaerbeek* , in pratis vulgò *den Troost* ; ad *Berghem* , etc. Perennis , aprilis fine florens.

70. *C. CÆSPITOSA*. Spicis erectis , cylindricis , ternis , subsessilibus , masculâ terminali , culmo triquetro. *Linn. syst. veget.* 142 , n. 55.

*Carex* spicis approximatis , sessilibus , teretibus folio insidentibus. *Hall. hist.* , n. 1383.

Cyperoides sylvaticum , angustifolium ; spicis parvis , tenuibus , spadiceo-viridibus. *Scheuchz. agrost.* 425 , tab. 10 , fig. 11.

Gramen cyperoides caryophyllatum , folio longiore et angustiore , spicis sessilibus , compactis , erectis. *Moris. hist.* 3 , fol. 243 , tab. 12 , fig. 3.

Belgicè : *Water-gras.*

In humidis , vulgò in *het Broek* ad *Molenbeek* , etc. Perennis.

71. *C. PALLESCENS*. Spicâ masculâ , erectâ , femineis pendulis , ovatis , imbricatis , capsulis confertis , obtusis. *Linn. sp. pl.* 977 , n. 23 ; *Scop. fl. carn. sp.* 1153 ; *Leers , fl. herb.* n. 721 , tab. 15 , fig. 4.

*Carex* spicis femininis pendulis , capsulis ovato-conicis. *Hall. hist.* , n. 1393.

Cyperoides polystachion , flavicans , spicis brevibus , propè summitatem caulis. *Tourn. inst.* 530 ; *Michel , gen. et sp.* 61 , tab. 32 , fig. 13 ; *Scheuchz. agrost.* 430 ; *Ray. hist.* 1294.

In pratis humidis propè *Zellik*. Junio floret , perennis.

72. *C. LIMOSA*. Spicis ovatis pendulis , masculâ longiore , erectiore , radice repente. *Linn. sp. pl.* 977 , n. 21 ; *Scop. fl. carn. sp.* 1156 ; *Leers , fl. herb.* n. 719 , tab. 15 , fig. 3.

*Carex* spicis femininis pendulis , capsulis ovatis , compressis. *Hall. hist.* , n. 1392.

Cyperoides spicâ pendulâ , brevior , squamis è spadiceo vel fusco rutilante viridibus. *Scheuchz. agrost.* 443 , tab. 10 , fig. 13.

Gramen cyperoides , spicâ pendulâ , minus. *Bauh. pin.* 85.

Belgicè : *Slyk-gras* ; gallicè : *Lèche des Bourbiers*.

In paludosis sylvæ *Linthout* , *Lorbeek* , etc. Perennis.

73. *C. FLAVA*. Spicis confertis, subsessilibus, subrotundis, masculâ linearî, capsulis acutis, recurvis. *Linn. sp. pl.* 975, n. 12; *Scop. fl. carn. sp.* 1161; *Leers. fl. herb.*, n. 714, tab. 15, fig. 6.  
*Carex* spicis femininis petiolatis, erectis, ovatis, echinatis. *Hall. hist.*, n. 1380.  
*Cyperoides palustre aculeatum*, capitulo brevior. *Tourn. inst.* 529; *Scheuchz. agrost.* 426.  
*Gramen palustre echinatum*. *Lobel, kruid-b.* 16.  
*Gramen Cyperoides aculeatum*, germanicum, seu minus. *Bauh. pin.* 7; *Moris. hist.* 3, fol. 243, tab. 12, fig. 19.  
 Belgicè : *Steekende Water-gras*.  
*Juxta rivulos*. Perennis, julio florens.
74. *C. MURICATA*. Culmo triquetro, spiculis subovatis, sessilibus, androgynis, remotis, capsulis acutis, bicuspidatis, foliis angulatis. *Linn. sp. pl.* 974, n. 8; *Scop. fl. carn. sp.* 1168; *Leers, fl. herb.*, n. 709, tab. 14, fig. 8.  
*Gramen cyperoides parvum, aquaticum*. *Lobel, kruid-b.* 20.  
*Gramen cyperoides, spicatum, minimum, spicâ divulsâ, aculeatâ*. *Ray. hist.* 1298; *Scheuchz. agrost.* 485, tab. 11, fig. 3.  
*Gramen nemorosum, spicis parvis asperis*. *Bauh. pin.* 7; *Moris. hist.* 3, fol. 244, tab. 12, fig. 27.  
*Carex nemorosa, fibrosâ radice, angustifolia, minima; caule exquisitè triangulari, spicâ brevi, interruptâ*. *Michel, gen. pl.*, fol. 69; tab. 33, fig. 11.  
 Belgicè : *Kleyn Water-Cypers-gras*.  
*Juxta fossas in locis sylvaticis*. Perennis, julio florens.
75. *C. VULPINA*. Culmo triquetro, foliis angulatis, spicâ supradecompositâ, inferne laxiore, spiculis androgynis, ovatis, sessilibus, glomeratis. *Linn. sp. pl.* 973, n. 7; *Scop. carn. sp.* 1169; *Leers. herb.*, n. 708, tab. 14, fig. 5.  
*Carex palustris major, radice fibrosâ, caule exquisitè triangulo, spicâ brevi, habitatiore, compactâ*. *Michel, gen.* 69, tab. 33, fig. 13—14.  
*Gramen palustre cyperoides*. *Lobel, kruid-b.*, fol. 20.  
*Gramen cyperoides palustre, majus, spicâ compactâ*. *Bauh. pin.* 6; *Boerh. hort. lugd.* 165; *Moris. hist.* 3, fol. 244, tab. 12, fig. 14.  
 Belgicè : *Groot Water-Cypers-gras*.  
*Ad ripas aquarum*. Perennis, fine julii florens.



76. *C. Pulicaris*. Culmo teretiusculo, spicâ simplici, androgynâ, supernè masculâ, capsulis divaricatis, reflexis, seminibus teretibus. *Linn. sp. pl.* 972; *n.* 2; *Scop. fl. carn. sp.* 1147; *Leers, fl. herb., tab.* 14, *fig.* 1.

Gramen cyperoïdes, spicâ simplici cassâ. *Scheuchz. agrost.* 497, *tab.* 11, *fig.* 9—10; *Moris. hist.* 3, *tab.* 12, *fig.* 21—22.

*Carex* spicâ unicâ terete, seminibus rostratis. *Hall. hist., n.* 1350.

*Carex minima*, caulibus et foliis capillaceis, capitulo singulari, tenuiori, capsulis oblongis, utrinque acuminatis et deorsum flexis. *Michel. gen. et sp.* 65, *tab.* 33, *fig.* 1.

Belgicè: *Vloey-gras*.

Juxta aquas Mœniorum propè de Kleyne-Spuye. Perennis; fine aprilis florens. Rara.

## DIGYNIA.

29. *PHALARIS*. Calix duplex, uniflorus, uterque bivalvis, carinatus, longitudine æqualis, corollam includens; nectarium diphyllum.

77. *P. ARUNDINACEA*. Paniculâ oblongâ, ventricosâ, amplâ. *Linn. sp. pl.* 55, *n.* 8; *Leers, fl. herb., n.* 49, *tab.* 7, *fig.* 3; *Gouan, hort. monsp.* 34.

Gramen aquaticum paniculatum, phalaridis semine. *Scheuchz. agrost.* 126, *tab.* 3, *fig.* 4; *Tourn. inst.* 523.

Gramen striatum vel sulcatum album. *Lobel, kruidb.* 7. *Varietas hujus est, quæ nisi in hortis occurrat, culmos tenuiores gerit, et folia per longitudinem striis lacteis notata.*

Gramen arundinaceum, acerosâ glumâ, jerseianum. *Moris. hist.* 3, *fol.* 203, *tab.* 6, *fig.* 41.

Arundo locustis unifloris, fasciculatis, imbricatis, glumis floralibus, nitentibus, subhirsutis. *Hall. hist.* 1524.

Belgicè: *Rietpluym-gras*.

Ad ripas piscinarum *Schaerbeek, etc.* Perennis, junio florens.

78. *P. PHLEOÏDES*. Paniculâ cylindricâ, spiciformi, glabrâ, passim viviparâ. *Linn. sp. pl.* 55, *n.* 5; *Gouan, hort. monsp.* 33.

*Gramen typhoïdes*, spicâ purpurascente, foliacea. *Scheuchz. agrost.*, fol. 67.

*Gramen typhoïdes asperum*, primum. *Bauh. pin.* 4 ; *Boerh., hort. lugd.*, fol. 160, p. 2.

*Gramen spicatum*, spicâ cylindraceâ, tenuiore, longâ. *Tourn. inst.* 520.

*Gramen typhoïdes medium*, seu vulgatissimum. *Moris., hist.* 3, fol. 193, tab. 4, fig. 2.

*Phleum culmo recto*, spicis cylindricis, glabris, calice brevissimè mucronato. *Hall. hist.*, n. 1531.

Belgicè : *Dodde-Gras* ; gallicè : *Alpiste*.

In nemoribus propè *Berghem*, etc.

79. *P. CANARIENSIS*. Paniculâ subovatâ, spiciformi, glumis carinatis, pilosis, nectariis binis. *Linn. sp. pl.* 54, n. 1 ; *Leers., fl. herb.*, tab. 7, fig. 5.

*Phalaris major*, semine albo. *Bauh. pin.* 28 ; *Boerh. hort. lugd.* 158 ; *Scheuchz. agrost.*, fol. 52, tab. 2, fig. 3 ; *Moris. hist.* 3, fol. 186, tab. 3, fig. 1.

*Phalaris*. *Dodon., kruid-b.*, fol. 822 ; *Lobel, kruid-b.*, fol. 55.

Belgicè : *Canarie-Zaed* ; gallicè : *Graine de Canarie*.

In hortis seritur. Propè *Ever* sponte. Annuâ, fine julii florens.

30. *PANICUM*. Calix bivalvis, biflorus, flosculo altero hermaphrodito, altero masculo aut neutro.

80. *P. VERTICILLATUM*. Spicâ verticillatâ, involucellis unifloris, bisetis, culmis diffusis, foliis retrorsum scabris. *Linn. sp. pl.* 55, n. 2.

*Panicum* spicâ unicâ, paniculatâ, setis perpaucis. *Hall. hist.*, n. 1543.

*Gramen paniceum*, spicâ asperâ. *Bauh. pin.* 8 ; *Scheuchz. agrost.* 47.

*Panicum vulgare*, spicâ simplici et asperâ. *Tourn. inst.* 515.

Belgicè : *Panik-Koren* ; gallicè : *Panis*.

In hortis inter olera. Annuâ, augusto florens.

*Spica racemis ternis seu quaternis, deorsum secundis, flores virides, pistillis purpurascentibus.*

81. *P. GLAUCUM*. Spicâ tereti, involucellis unifloris, fasciculato-pilosis, seminibus undulato-rugosis. *Linn. sp. pl.* 56, n. 3 ; *Leers., herb.*, n. 39, tab. 2, fig. 2.

*Panicum* spicâ unicâ , flosculis sessilibus, solitariis, setis numerosis. *Hall. hist.*, n. 1542.

Panici effligie gramen, simplici spicâ. *Lobel, kruid-b.*, fol. 14.

Belgicè : *Panik-Koren-gras*.

Ad *Molenbeek, Schaerbeek*, in hortis, viis, etc. *Foliorum vaginae oris pilosæ*.

82. *P. VIRIDE*. Spicâ tereti, involucellis unifloris, trisetis, inermibus. *Linn. sp. pl.* 56, n. 4; *Leers, fl. herb.*, n. 40, tab. 2, fig. 3.

*Panicum cynosuroides. Scop. fl. carn. sp.* 68.

*Panicum vulgare*, spicâ simplici et molliori. *Tourn. inst.* 515.

Gramen paniceum, seu *Panicum sylvestre*, spicâ simplici. *Bauh. pin.* 8; *Scheuchz. agrost.*, fol. 46; *Moris. hist.* 3, fol. 139, tab. 4, fig. 10.

Belgicè : *Groen Panik-Koren*; gallicè : *Panis Verd*. In arvis *Diegem, Haren*, etc. Antecedenti rarior.

83. *P. ITALICUM*. Spicâ compositâ, spiculis glomeratis, setis immixtis, pedunculis hirsutis. *Linn. sp. pl.* 56, n. 5; *Gouan, hort. monsp.* 34.

*Panicum italicum* sive paniculâ majore. *Bauh. pin.* 27; *Tourn. inst.* 515.

*Panicum. Dodon, kruid-b.* 817; *Lobel, kruid-b.* 53.

Belgicè : *Vogel-Zaet*; gallicè : *Millet*.

In hortis *Ever* scriitur. Annuâ, julio florens.

84. *P. CRUS GALLI*. Spicis alternis conjugatisque, spiculis subdivisis, glumis aristatis, hispidis, rachi quinquagulari. *Linn. sp. pl.* 56, n. 7; *Scop. fl. carn. sp.* 70; *Leers, fl. herb.* 41, tab. 2, fig. 5.

*Panicum spicâ ramosâ, setis nullis. Hall. hist.* 1544.

*Panicum herbariorum sylvestre, Lobel, kruid-b.* 53.

Gramen mannæ alterum, sive *Panicum palustre. Dodon, kruid-b.*, fol. 889.

Gramen paniceum, spicâ divisâ. *Bauh. pin.* 8; *Scheuchz. agrost.* 49; *Moris. hist.* 3, fol. 189, tab. 4, fig. 15.

Gramen paniceum, spicâ aristis longis armatâ. *Bauh. pin.* 8; *Scheuchz. agrost.* 48; *Moris. hist.* 3, fol. 189, tab. 4, fig. 16; *Tourn. inst.* 515, *Lobel, kruid-b.*, fol. 15. Varietas hujus est.

Belgicè : *Wild Panik-Koren*; gallicè : *Panis sauvage*. In hortis *Schaerbeek* inter olera. Annuâ, augusto florens.

31. PHLEUM. Calix bivalvis, sessilis, linearis, truncatus, apice bicuspidato; corolla inclusa.

85. *P. PRATENSE*. Spicâ cylindricâ, longissimâ, ciliatâ, culmo erecto. *Linn. sp. pl.* 59, n. 1; *Scop. carn. sp.* 74; *Leers, herb.*, n. 46, tab. 3, fig. 1.

Phleum caule erecto, spicâ cylindricâ, longissimâ, glumis calicinis obliquè truncatis. *Hall. hist.* n. 1528.

Gramen typhoïdes maximum, spicâ longissimâ. *Scheuchz. agrost.*, fol. 60, tab. 2, fig. 5; *Bauh. pin.* 4; *Moris. hist.* 3, fol. 188, tab. 4, fig. 1.

Gramen alopecuroïdes. *Lobel, kruid-b.*, fol. 10.  
Belgicè : *Vosse-Steért*; gallicè : *Queue de Renard*.  
In pratis ubiquè. Perennis, junio florens.

86. *P. Nodosum*. Spicâ cylindricâ, culmo adscendente, foliis obliquis, radice bulbosâ. *Linn. sp. pl.* 59, n. 3; *Scop. carn. sp.* 76, *Leers. herb.*, tab. 3, fig. 2.

Phleum caule imo bulboso, declinante, glumis calicinis obtusè truncatis. *Hall. hist.*, n. 1530.

Gramen typhoïdes asperum, alterum. *Bauh. pin.* 4; *Scheuchz. agrost.*, fol. 62.

Gramen typhinum. *Lobel, kruid-b.* 11; *Dalech. hist.* 1, fol. 363.

Gramen pratense septimum. *Dodon, kruid-b.* fol. 892.

Gramen typhoïdes, minus, nodosum. *Moris. hist.* 3, fol. 194, tab. 4, fig. 3.

Belgicè : *Knoop-Gras*.

Ad margines pratorum. Perennis, fine maii florens.

32. ALOPECURUS. Gluma uniflora, bivalvis; corolla univalvis; nectarium nullum.

87. *A. AGRESTIS*. Culmo spicato, erecto, glumis lævibus. *Linn. sp. pl.* 60, n. 4; *Leers, fl. herb.* 44, tab. 2, fig. 5.

Alopecurus culmo erecto, spicato, calice ciliato. *Hall. hist.* 1540.

Gramen spicatum, spicâ cylindraceâ, tenuissimâ, longiore. *Tourn. inst.* 520; *Scheuchz. agrost.*, fol. 69.

Gramen alopecuroïdes tertium. *Lobel, kruid-b.*, fol. 11.

Gramen alopecuroïdes, spicâ longiore, tenuiore. *Moris. hist.* 3, fol. 139, tab. 4, fig. 12.

- Gramen typhoides, spicâ angustiore. *Bauh. pin. 4; Boerh. hort. lugd., fol. 160.*  
 Belgicè : *Ratten-steêrt*; gallicè : *Qucue de rat.*  
 In agris arvisque. Junio floret, perennis.
88. *A. PRATENSIS.* Culmo spicato, erecto, glumis villosis, corollis muticis. *Linn. sp. pl. 60, n. 3; Leers, fl. herb., n. 43, tab. 2, fig. 4.*  
*Alopecurus* spicâ ovatâ. *Hall. hist. 1539.*  
*Alopecuroïdes* minus. *Lobel, hruid-b., fol. 11.*  
 Gramen myurum, spicâ molli, candicante. *Scheuchz. agrost. 70.*  
 Gramen phalaroides, spicâ molli seu germanicum. *Bauh. pin. 4.*  
 Belgicè : *Kleyn Vosse-Steêrt-gras.*  
 In pratis ubiquè. Perennis, junio florens.
89. *A. GENICULATUS.* Culmo spicato, infracto, corollis muticis. *Linn. sp. pl. 60, n. 2; Scop. carn. sp. 82; Leers, herb. 45, tab. 2, fig. 7; Hall. hist., n. 1541.*  
 Gramen aquaticum geniculatum, spicatum. *Bauh. pin. 3; Scheuchz. agrost., fol. 72; Moris. hist. 3, fol. 194, tab. 4, fig. 15.*  
 Gramen aquaticum spicatum. *Lobel, hruid-b., fol. 14.*  
 Gramen alopecuroïdes aquaticum, geniculatum. *Boerh. hort. lugd., fol. 158.*  
 Belgicè : *Wit Vlot-gras.*  
 In aquis Sennæ et alibi communis. Perennis, junio florens.
33. **MILIUM.** Calix bivalvis, uniflorus, valvis subæqualibus; corolla brevissima; stigmata penicilli-formia.
90. *M. EFFUSUM.* Floribus paniculatis, dispersis, muticis. *Leers, herb. 50, tab. 8, fig. 7.*  
 Milium paniculis raris, petiolis longissimis. *Hall. hist. 1525.*  
 Gramen miliaceum. *Lobel, hruid-b., fol. 6.*  
 Gramen pratense quartum. *Dodon, hruid-b., fol. 892.*  
 Gramen sylvaticum, paniculâ sparsâ, miliacê. *Bauh. pin. 8; Tourn. inst. 523; Boerh. hort. lugd. 162, p. 2; Scheuchz. agrost., fol. 133, tab. 3, fig. 6; Moris. hist. 3, tab. 5, fig. 10.*  
 Belgicè : *Hirs-gras*; gallicè : *Millet sauvage.*  
 In humidis sylvis, etc. Perennis, julio florens.

34. **AGROSTIS.** Calix bivalvis, uniflorus; corolla paulò minor; petalum exterius glabrum; stigmata longitudinaliter hispida.
91. *A. INTERRUPTA.* Petalis integris, exteriore aristato, paniculâ attenuatâ, coarctatâ, interruptâ. *Scop. fl. carn. sp.* 85; *Linn. syst. nat.* 90.  
Gramen arvense paniculatum, spicâ interruptâ. *Scheuchz. agrost.* 146.  
Gramen capillatum, paniculâ angustiore et interruptâ. *Vaill., bot. par.*, 88, *tab.* 17, *fig.* 4.  
Inter segetes circâ *Jette, Laken, etc.* Rarior. Annuâ, julio florens. *Varietas sequentis secundum Hall. hist.*, n. 1481.
92. *A. SPICA-VENTI.* Petalis bifidis, aristâ exteriore rectâ, strictâ, longissimâ, paniculâ patulâ. *Linn. sp. pl.* 91, n. 1; *Leers, fl. herb.* 51, *tab.* 4, *fig.* 1; *Scop. fl. carn. sp.* 84.  
*Avena monantha*, paniculâ adscendente multiflorâ, calice lævi, florali aristâ longissimâ. *Hall. hist.* 1480.  
Gramen pratense tertium. *Dodon, kruid-b.* 892. *Ante anthesin.*  
*Agrorum spica-venti.* *Lobel, kruid-b.*, *fol.* 5. *Ante anthesin.*  
Gramen segetum paniculâ speciosâ, latiori. *Lobel, l. c. Tempore florescentiæ.*  
Gramen segetum, altissimum paniculâ sparsâ. *Bauh. pin.* 3; *Scheuchz. agrost.*, *fol.* 144, *tab.* 3, *fig.* 10, *a, b.*  
Belgicè: *Veld-gras*, *Wind-halme*; gallicè: *Amourette.*  
In agris ubiquè. Annuâ, julio florens.
93. *A. CANINA.* Calicibus elongatis, petalorum aristâ dorsali recurvâ, culmis prostratis, foliis capillaceis. *Leers, fl. herb.*, n. 52, *tab.* 4, *fig.* 2.  
*Avena monantha*, paniculâ diffusâ, multiflorâ, adscendente, glumâ calycinâ exasperatâ. *Hall. hist.* 1479.  
Gramen paniculatum, supinum, ad infima culmorum genicula, foliorum capillarium fasciculis donatum. *Scheuchz. agrost.* 141, *tab.* 3, *fig.* 9, *c.*  
Gramen supinum, caninum, paniculatum, folio varians. *Bauh. pin.* 1.  
In versuris *Boondaël, Watermael.* Perennis, janio florens. *Panicula sæpiùs purpurascens, arista alba, medio geniculo fusco.*

94. *A. CAPILLARIS*. Paniculâ capillari patente, calicibus æqualibus, subulatis, hispidiusculis, coloratis; flosculis muticis. *Linn. sp. pl.* 62, n. 8; *Leers, fl. herb.* 54, tab. 4, fig. 3; *Scop. fl. carn. sp.* 87.

*Avena monantha*, caule erecto, paniculâ diffusâ, calicibus dorso exasperatis. *Hall. hist.*, n. 1475.

Gramen montanum, paniculâ spadiceâ, delicatiore. *Bauh. pin.* 3; *Scheuchz. agrost.* 129, tab. 3, fig. 5—6.

In pratorum versuris, ad muros, etc. Junio florens; annua. *Calicis glumæ spadiceæ, marginibus albis; antheræ flavæ.*

95. *A. STOLONIFERA*. Paniculæ ramulis patentibus, culmo repente, calicibus æqualibus. *Linn. syst. veget.* 170, n. 25; *Fl. dan. tab.* 564; *Gouan, hort. monsp.* 40.

*Poa monantha stolonifera*, calicibus subasperis. *Hall. hist.*, n. 1473.

Gramen parvum, repens, purpureâ spicâ. *Bauh. hist.* 2, fol. 459.

Gramen caninum, supinum, minus. *Bauh. pin.* 1; *Scheuchz. agrost.* 128.

Gramen radice repente, paniculâ densâ, spicatâ, spadiceo-viridi, locustis exiguis, muticis. *Scheuchz. agrost.* 130. *Varietas hujus.*

In arenosis humidis communis.

96. *A. PUMILA*. Paniculâ muticâ, secundâ, culmis fasciculatis, erectis. *Linn. syst. veget.* 170, n. 29.

*Poa monantha*, foliis setaceis, calicibus dorso exasperatis. *Hall. hist.*, n. 1474.

Gramen minimum palustre, paniculâ spadiceâ, delicatâ, tenuifolium, semine exiguo rotundo. *Scheuchz. agrost.* 131.

Ad Berghem, vulgò in het Broek. Perennis, junio florens. *Pro varietate præcedentis habetur à Gmelino.*

35. *CALAMAGROSTIS*. *Calix*, gluma bivalvis, uniflora; corolla basi pilosa.

97. *C. LANCEOLATA*. Paniculâ lanceolatâ, contractâ, spicæ æmulâ; corollis linearibus, basi pilosis, aristâ dorsali rectâ, brevi, culmo ramoso. *Linn. syst. nat.* 3, fol. 100.

*Arundo calamagrostis*. *Linn. sp. pl.* 82; *Fl. dan. tab.* 280; *Gouan, hort. monsp.* 55.

Gramen arundinaceum paniculâ molli, spadiceâ, majus. *Bauh. pin.* 7; *Scheuchz. agrost.* 122, *tab.* 3, *fig.* 3; *prodr.* 21, *tab.* 5; *Tourn. inst.* 523.

Gramen plumosum vel arundinaceum. *Lobel, kruyd-b., fol.* 8.

Arundo locustis unifloris, papposis, muticis, paniculâ alternè contractâ. *Hall. hist., n.* 1519.

Belgicè : *Pluym-Riet-gras.*

Juxta aquas. Perennis, julio florens.

98. *C. ARUNDINACEA.* Paniculâ oblongâ, petalo interiore basi piloso, exteriori glabro, aristâ è basi tortâ, calice longiore. *Linn. syst. veget.* 172, *n.* 3.

*Agrostis arundinacea. Linn. sp. pl.* 61, *n.* 3.

*Arundo agrostis. Scop. fl. carn. sp.* 126.

*Arundo locustis unifloris, glumis ex imo dorso aristatis. Hall. hist., n.* 1522.

Gramen avenaceum montanum, paniculâ angustâ, è dilutissimo fusco-albicante, et papposâ. *Scheuchz. agrost.* 507.

Juxta aquas propè *Ten-Noode, etc.* Perennis, julio florens.

99. *C. ARUNDO.* Paniculâ incrassatâ, petalo exteriori piloso, dorso aristato, culmo ramoso. *Linn. syst. natur.* 3, *fol.* 90.

*Agrostis calamagrostis. Leers, fl. herb. app. fol.* 285; *Gouan, hort. monsp.* 39.

Gramen calamagrostis. *Lobel, kruyd-b., fol.* 8; *Dalech. hist.* 1, *fol.* 364.

*Arundo locustis unifloris, ex summâ glumâ aristatis. Hall. hist., n.* 1521.

Gramen arundinaceum, paniculâ densâ, viridi-argenteâ splendente, aristatâ. *Scheuchz. agrost.* 146, *tab.* 3, *fig.* 11.

Belgicè : *Riet-gras*; gallicè : *Faux Jonc.*

In collibus propè *Berghem.* Perennis, julio florens.

36. *HOLCUS.* Flores monoïci. *Masc.* Gluma bivalvis, corolla nulla. *Fem.* Gluma-uni-bi-autriflora, corolla aristata; semen unicum.

100. *H. AVENACEUS.* Glumis bifloris, aristâ floris masculi dorsali refractâ. *Linn. syst. natur.* 3, *fol.* 99; *Scop. fl. carn.* 1239.



*Avena elatior*. *Leers*, *fl. herb.* 88, *tab.* 10, *fig.* 4;  
*Gouan*, *hort. monsp.* 53.

*Avena diantha*, folliculis basi villosis, aristâ majoris  
geniculatâ. *Hall. hist.*, n. 1492.

*Gramen bulbosum nodosum*. *Lobel*, *kruyd-b.*, *fol.* 23.

*Gramen nodosum*, avenaceâ paniculâ *Bauh. pin.* 2,  
*Scheuchz. agrost.* 237, *tab.* 4, *fig.* 27—28; *Moris.*  
*hist.* 3, *fol.* 214, *tab.* 7, *fig.* 37.

*Gramen avenaceum elatius*, jubâ longâ, splendente.  
*Scheuchz. agrost.* 239.

Belgicè : *Knobbel-gras*, *Klyster-gras*; gallicè : *Fru-*  
*mental*.

In pratis versurisque; Fine maii floret, perennis.

101. *H. LANATUS*. Glumis bifloris, villosis, flosculo hermaphrodito mutico, masculo aristâ recurvâ. *Linn. sp. pl.* 1048, n. 4; *Scop. carn. sp.* 1238; *Leers*, *herb.* 70, *tab.* 7, *fig.* 6.

*Avena diantha*, floribus ovatis, perfecto mutico, imperfecto aristato. *Hall. hist.*, n. 1484.

*Gramen pratense paniculatum*, molle. *Bauh. pin.* 2;  
*Scheuchz. agrost.*, *fol.* 234, *tab.* 4, *fig.* 24.

*Gramen hirsutum*. *Dalech. hist.* 1, *fol.* 356.

Belgicè : *Wollig-gras*; gallicè : *Grame velu*.

In collibus ubique. Perennis, junio florens. *Panícula rubellâ vel albida*.

37. *AIRA*. Calix bivalvis, biflorus; flosculi absque interjecto rudimento.

102. *A. AQUATICA*. Paniculâ patente, floribus muticis, lævibus, calice longioribus, foliis planis. *Linn. sp. pl.* 64, n. 6; *Scop. fl. carn. sp.* 94.

*Gramen caninum*, supinum, paniculatum, dulce.  
*Bauh. pin.* 1, *Bauh. hist.* 2, *fol.* 459.

*Gramen miliaceum aquaticum*. *Raij*, *syn.* 255;  
*Scheuchz. agrost.* 176.

*Poa locustis* bifloris, glabris, florali glumâ majori, plicatâ, serratâ. *Hall. hist.*, n. 1471.

Belgicè : *Honds-gras*.

In pascuis aquosis *Anderlegt*, *St.-Gillis*, etc. Perennis, julio florens.

103. *A. CÆSPITOSA*. Foliis planis, paniculâ patente, petalis basi villosis aristatisque, aristâ rectâ, brevi.

- Linn. sp. pl.* 64, n. 8; *Scop. fl. carn. sp.* 93; *Leers, herb.*, n. 5, tab. 4, fig. 8; *Jacq. austr.* 14.  
*Avena diantha*, paniculâ amplissimâ, patulâ, bicolore.  
*Hall. hist.* n. 1487.  
*Gramen segetum*, paniculâ arundinaceâ. *Scheuchz. agrost.* 244, tab. 5, fig. 2—3.  
*Gramen agrorum*, latiore, arundinaceâ, comosâ paniculâ. *Moris. hist.* 3, tab. 5, fig. 17.  
 In Pratis, agris, nemoribusque, humidis. *Junio florens*, perennis.
104. *A. CANESCENS*. Foliis setaceis, vaginis scabris, floribus paniculatis, aristis calicem non excedentibus. *Linn. sp. pl.* 65, n. 9; *Moris. hist.* 3, tab. 3, fig. 10.  
*Avena diantha*, foliis setaceis, paniculâ strictâ, aristis clavatis. *Hall. hist.* n. 1483.  
*Gramen exile durius*. *Lobel, kruyd-b.* fol. 9.  
*Gramen junceum*. *Dalech. hist.* 1, fol. 356.  
*Gramen foliis junceis, oblongis, radice albâ*. *Bauh. pin.* 5; *Scheuchz. agrost.* 242, tab. 4, fig. 29—30 et 243, n. 2.  
 Belgicè : *Bies-gras*.  
 In monticulis siccis ubiquè. *Calix interdum triflorus, arista medio cincta denticulis, infra crassior et fusca, supra tenuior et albida.*
105. *A. CARYOPHILLÆA*. Foliis setaceis, vaginis glabris, sulcatis, paniculâ divaricatâ, aristis calicem superantibus. *Linn. syst. veget.* 175, n. 22; *Fl. dan. tab.* 382; *Gouan, hort. monsp.* 42; *Leers, fl. herb.* 62, tab. 5, fig. 7.  
*Avena diantha*, foliis setaceis, paniculâ divaricatâ. *Hall. hist.* n. 1482.  
*Gramen paniculatum annuum*, locustis purpureo-argenteis. *Moris. hist.* 3, fol. 200, tab. 5, fig. 11.  
*Gramen paniculatum, minimum, molle*. *Scheuchz. agrost.* 215, tab. 4, fig. 15.  
 Propè molam *Berghem*, alibi rarior occurrit. *Annua*, julii medio florens.
38. *MELICA*. Calix bivalvis, biflorus, corpusculum pedicellatum inter flosculos; nectarium monophyllum, stamina basi dilatata.
106. *M. CÆRULEA*. Paniculâ coarctatâ, floribus cylindricis, foliis planis, culmo enodi. *Linn. sp. pl.* 63,

*n.* 3; *Jacq. fl. austr.* 14; *Leers, herb.* 58, *tab.* 4, *fig.* 7.

*Aira cærulea. Scop. fl. carn. sp.* 91.

*Gramen arundinaceum enode, minus, sylvaticum. Bauh. pin.* 7; *Scheuchz. agrost.* 209.

*Gramen paniculatum, autumnale, paniculâ ampliore ex viridi-nigricante. Tourn. inst.* 521; *Scheuchz. agrost.* 207, *tab.* 4, *fig.* 11—12.

In sylvis prope *Vorst.* Perennis, julio florens. *Acumen vaginale ut in melicâ Lobelii.*

39. POA. Calix bivalvis, multiflorus, spiculæ ovatæ, valvis margine scariosis, acutiusculis.

107. *P. AQUATICA.* Paniculâ diffusâ, spiculis sexfloris, linearibus. *Linn. sp. pl.* 67, *n.* 1; *Scop. fl. carn. sp.* 105; *Leers, herb.* 65, *tab.* 5, *fig.* 5.

*Poa altissima, foliis latissimis, paniculâ amplissimâ, locustis distichis multifloris. Hall. hist. n.* 1454.

*Gramen palustre paniculatum, altissimum. Bauh. pin.* 2; *Scheuchz. agrost., fol.* 191, *tab.* 4, *fig.* 1.

*Gramen aquaticum paniculatum, latifolium. Bauh. pin.* 3; *Moris. hist.* 3, *fol.* 201, *tab.* 6, *fig.* 25.

*Gramen majus aquaticum. Lobel, hruid-b., fol.* 6; *Bauh. hist.* 2, *fol.* 481.

Bellicæ: *Grôot Water-gras.*

Ad ripas æquarum. *Spiculæ decemfloræ, nonquam infra octofloras vidi.* Perennis, junio florens

108. *P. TRIVIALIS.* Paniculâ subdiffusâ, spiculis trifloris basi pubescentibus; foliis planis, vaginis scabris, ligulâ brevi truncatâ. *Linn. sp. pl.* 67, *n.* 3; *Scop. fl. carn. sp.* 99; *Leers, herb.* 66, *tab.* 6, *fig.* 2.

*Gramen pratense, paniculatum, medium. Bauh. pin.* 2, *Scheuchz. agrost.* 180, *n.* 5; *Tourn. inst.* 521.

Bellicæ: *Hoey-gras*; gallicæ: *Foin.*

In pratis ubiquè. *Cum poâ angustifoliâ conjunxit Scopoli. Fl. carn. sp.* 99.

109. *P. ANGUSTIFOLIA.* Paniculâ diffusâ, spiculis quadrifloris, pubescentibus, foliis radicalibus, convolutis, filiformibus, vaginis glabris, ligulâ brevi, truncatâ. *Linn. sp. pl.* 67, *n.* 4; *Leers, fl. herb.* 67, *tab.* 6, *fig.* 3.

*Poa foliis duris, se convolventibus, locustis quadrifloris, villosis. Hall. hist. n.* 1460.

Gramen pratense paniculatum, majus, angustiore folio. *Bauh. pin.* 2; *Scheuchz. agrost.* 178, n. 3, tab. 3, fig. 17, b.; fol. 181, n. 6; fol. 183, tab. 3, fig. 17, c.; *Tourn. inst.* 522.

Ad versuras agrorum, inque pratis. Perennis, junio florens.

110. *PRATENSIS*. Paniculâ diffusâ, spiculis subquinquefloris, foliis planis, vaginis scabris, ligulâ oblongâ acutâ. *Linn. sp. pl.* 67, n. 5; *Scop. fl. carn. sp.* 100; *Leers, fl. herb.* 68, tab. 6, fig. 4.

*Poa* paniculâ diffusâ, locustis trifloris, glabris. *Hall. hist.*, n. 1465.

Gramen pratense paniculatum, majus. *Bauh. pin.* 2; *Scheuchz. agrost.* 177, tab. 3, fig. 17, a.

Gramen pratense primum. *Dodon, kruid-b. fol.* 890.

Gramen pratense. *Lobel, kruid-b., fol.* 4.

Belgicè : *Bempd-gras*; gallicè : *Paturin des prés*.

In pratis ubiquè. Junio floret.

111. *P. ANNUA*. Paniculâ diffusâ, patentissimâ, spiculis subquinquefloris, foliis planis, vaginis glabris, ligulâ brevi, acuminatâ. *Linn. sp. pl.* 68, n. 6; *Scop. fl. carn. sp.* 102; *Leers, fl. herb.* 70, tab. 6, fig. 1.

*Poa* culmo infracto, paniculâ triangulari, locustis trifloris, glabris. *Hall. hist.* n. 1465.

Gramen pratense, secundum. *Dodon, kruid-b.* 890.

Gramen minus. *Lobel, kruid-b., fol.* 4.

Gramen pratense paniculatum, minus. *Scheuchz. agrost.* 189, tab. 3, fig. 17, e.

Gramen pratense, paniculatum, minus, rubrum. *Tourn. inst.* 521; *Scheuchz.* 190.

Belgicè : *Wye-gras*.

In hortis, viis, pratis, etc. Junio florens.

112. *P. PALUSTRIS*. Paniculâ diffusâ, spiculis subtrifloris, pubescentibus, foliis striatis, scabris. *Linn. sp. pl.* 68, n. 9; *Fl. dan. tab.* 570.

*Poa* paniculâ strictâ, locustis trifloris, calicibus aristatis, floribus villosis. *Hall. hist.*, n. 1467.

Gramen paniculatum, aquaticum, angustifolium, paniculâ speciosâ, locustis parvis. *Scheuchz. agrost.* 184.

Gramen palustre, paniculâ speciosâ. *Bauh. pin.* 3; *Moris. hist.* 3, fol. 201, tab. 6, fig. 27.

Belgicè : *Water-gras*.

Ad ripas piscinarum *Etterbeek*, *Ten-Noode*, etc.  
Perennis, julio florens.

113. *P. RIGIDA*. Paniculâ lanceolatâ, subramosâ, secundâ, ramulis alternis, secundis. *Linn. sp. pl.* 69, n. 16; *Gouan, fl. monsp.* 122.

Gramen paniculâ multiplici, majus. *Bauh. pin.* 3; *Scheuchz.* 271, tab. 6, fig. 2—3.

Gramen exile duriusculum, in muris et aridis proveniens. *Raij. syn.* 259.

Gramen loliaceum murorum, duriusculum, spicâ erectâ, rigidâ. *Moris. hist.* 3, fol. 182, tab. 2, fig. 9.

Belgicè : *Muer-gras*.

In siccis collibus *Schaerbeek*, *Stalle*, etc. Annuâ, julio florens.

114. *P. NEMORALIS*. Paniculâ attenuatâ, florente patulâ, spicis subbifloris, mucronatis, glabris, culmo debili. *Linn. sp. pl.* 69; *Scop. fl. carn. sp.* 108; *Leers. herb.* 72, tab. 5, fig. 3.

*Poa* culmo debili, paniculâ nutante, locustis bifloris, flosculis subvillosis. *Hall. hist.*, n. 1469.

Gramen paniculatum, angustifolium, alpinum, locustis rarioribus et angustioribus, non aristatis. *Scheuchz. agrost.* 164, *prodrom.* 18, tab. 2.

Belgicè : *Bosch-gras*.

In sylvis propè *Terkameren*, etc. Perennis, julio florens. *Rara*.

115. *P. PHŒNIX*. Paniculâ laxâ, spiculis tereti-compressis, pendulis, octofloris. *Scop. fl. carn. sp.* 107.

Gramen loliaceum, paniculâ multiplici et spicatâ. *Tourn. inst.* 516. *Scheuchz. agrost.* 200, tab. 4; fig. 6.

Belgicè : *Muysen-gras*; gallicè : *Yvraie de rat*.

In pratis *Schaerbeek*, *Laken*, *Heembeek*, etc., communis. Junio floret.

116. *P. COMPRESSA*. Paniculâ coarctatâ, secundâ, culmo obliquo, compresso. *Linn. sp. pl.* 59, n. 15; *Scop. fl. carn. sp.* 104. *Leers, fl. herb.* 71, tab. 5, fig. 4.

*Poa* culmo compresso, declinato, locustis distichis, sexfloris. *Hall. hist.* 1455.

Gramen murorum radice repente. *Bauh. pin.* 2.

Gramen paniculatum, radice repente, culmo compresso, locustis distichis, pulchellis. *Scheuchz. agrost.* 198.

Gramen paniculatum, radice repente, culmo compresso. *Vaill. bot. par. 91, tab. 18, fig. 5.*

Ad muros hinc inde, in collibus propè *St.-Lambregts-Woluwe*, etc.

40. **BRIZA.** Calix bivalvis, multiflorus, spiculæ distichæ, valvis cordatis obtusis, interiore minutâ.

117. *B. MINOR.* Spiculis triangulis, calice flosculis longiore. *Linn. sp. pl. 70, n. 1; Gouan, hort. monsp. 46.*

Gramen tremulum, minus, paniculâ parvâ. *Bauh. pin. 2; Scheuchz. agrost. 205, tab. 4, fig. 9; Bauh. hist. 2, fol. 470.*

*Poa* petiolis tenerrimis, locustis triangularibus. *Hall. hist. 1449.*

Belgicè : *Beverkens*; gallicè : *Amourettes tremblantes.*  
In siccis, vulgò *den Stuyvenberg*, ad *Laken*, etc., etc.  
Annua, junio florens.

118. *B. MEDIA.* Spiculis ovatis, calice flosculis brevior. *Linn. sp. pl. 70, n. 2; Leers, fl. herb. 64, tab. 7, fig. 2; Scop. fl. carn. sp. 109; Gouan, hort. monsp. 46.*

*Poa* petiolis tenuissimis, locustis ovatis. *Hall. hist. n. 1448.*

Gramen tremulum majus. *Bauh. pin. 2; Scheuchz. agrost. 204, tab. 4, fig. 8.*

Gramen tremulum. *Bauh. hist. 2, fol. 469.*

Gramen tremulum vulgare, locustis rotundioribus. *Moris. hist. 3, fol. 205, tab. 6, fig. 45.*

Belgicè : *Sidder-gras.*

In pratis siccis, versuris, etc. Fine julii floret. Perennis.

41. **DACTYLIS.** Calix bivalvis, multiflorus, valvis altero latere latioribus; corolla bivalvis, semen includens.

119. *D. GLOMERATA.* Paniculâ secundâ glomeratâ. *Linn. sp. pl. 71, n. 2; Leers, fl. herb. 57, tab. 3; Gouan, hort. monsp. 47.*

*Bromus* glomeratus. *Scop. fl. carn. sp. 111.*

Gramen spicatum, folio aspero. *Bauh. pin. 3; Scheuchz. agrost. 299, tab. 6, fig. 15; Moris. hist. 3, tab. 6, fig. 38.*

*Bromus locustis quadrifloris, fasciculatis, imbricatis.*  
*Hall. hist. 1512.*

Gramen paniculatum, spicis crassioribus et brevioribus. *Tourn. inst. 521.*

Belgicè : *Rouw-gras.*

Juxta vias ubique. Biennis, junio florens.

42. **CYNOSURUS.** Involucrum parziale, laterale, diversiforme; calix bivalvis, multiflorus, æqualis; corolla bivalvis, valvâ alterâ concavâ, longiore.

120. *C. CRISTATUS.* Bracteis pinnatifidis. *Linn. sp. pl. 72, n. 1; Leers, fl. herb. 99, tab. 7, fig. 4.*

Phleum cristatum. *Scop. fl. carn. sp. 81.*

Cynosurus involucris pinnatis, retusis. *Hall. hist. 1545.*

Gramen cristatum pratense, seu spicâ cristatâ, lævi.  
*Bauh. pin. 3; Scheuchz. agrost. 79.*

Gramen spicatum, glumis cristatis. *Tourn. inst. 519.*

Gramen cristatum. *Bauh. hist. 2, fol. 468.*

Belgicè : *Veder-gras, Kam-gras.*

In pratis versurisque. Junio florens; perennis.

43. **FESTUCA.** Calix bivalvis, spicula oblonga, tetrinsecula, glumis acuminatis.

121. *F. OVINA.* Paniculâ secundâ contractâ, aristatâ, culmo tetragono, nudiusculo, foliis setaceis. *Linn. sp. pl. 73, n. 1; Leers, fl. herb. 74, tab. 8, fig. 3—4.*

*Bromus ovinus. Scop. fl. carn. sp. 112.*

*Festuca foliis perangustis, paniculâ strictâ. Hall. hist. 1441—1442.*

Gramen foliis juncæis, brevibus, majus, radice nigrâ.

*Bauh. pin. 5; Scheuchz. agrost. 279, tab. 6, fig. 8;*

*id. fol. 282, n. 3; id. fol. 275, tab. 6, fig. 6.*

Belgicè : *Lammer-gras.*

Propè *St.-Lambregts-Woluwe, Linckenbeek, etc. in collibus.*

122. *F. RUBRA.* Paniculâ secundâ scabrâ, spiculis sexfloris, aristatis, flosculo ultimo mutico, culmo semitereti. *Linn. sp. pl. 74, n. 3; Leers, fl. herb. 76, tab. 8, fig. 1.*

*Festuca* foliis perangustis, locustis quinquefloris, teretibus, aristatis, oris membranaceis. *Hall. hist.* 1440.  
*Gramen* alpinum pratense, paniculâ duriore, laxâ, spadiceâ, locustis majoribus. *Scheuchz. agrost.* 287, *tab.* 6, *fig.* 9; *id. fol.* 289, *n.* 8.  
 Ad *St.-Gillis*, vulgò *op de heyde*, inque pratis siccis.

123. *F. ELATIOR*. Paniculâ secundâ, erectâ, spiculis subaristatis, exterioribus teretibus. *Leers, fl. herb.* 79, *tab.* 8, *fig.* 6.

*Poa* foliis latis. asperis, locustis teretibus, muticis, glumarum oris membranaceis. *Hall. hist.*, *n.* 1451.

*Gramen* paniculatum elatius, paniculis seu spicis muticis, squamosis. *Scheuchz. agrost. fol.* 202; *Vaill. bot. paris.* 92.

*Gramen* loliaceum, spicâ divisâ; pratense majus. *Moris. hist.* 3, *fol.* 184, *tab.* 2, *fig.* 15.

*Gramen* arundinaceum aquaticum, paniculâ avenaceâ. *Raij. angl.* 3, *fol.* 411.

Belgicè : *Vese*; gallicè : *Vernal*.

In pratis propè *Laken*, *Jette*, etc. *spiculæ ut plurimum muticæ*.

124. *F. DURIUSCULA*. Paniculâ secundâ, oblongâ, spiculis oblongis, lævibus, foliis setaceis. *Leers, fl. herb.* 75, *tab.* 8, *fig.* 2.

*Festuca* foliis perangustis, paniculâ strictâ, locustis distichis, aristatis, glabris, septemfloris. *Hall. hist.* 1437.

*Gramen* pratense, paniculâ duriore, laxâ, unam partem spectante. *Scheuchz. agrost. fol.* 285; *Raij. angl.* 3, *fol.* 413, *tab.* 19, *fig.* 1.

*Gramen* foliis junceis, brevibus, minus. *Bauh. pin.* 5.

*Gramen* tenue, duriusculum et penè junceum. *Bauh. hist.* 2, *fol.* 463.

In pratis montium communis. Perennis, sine maiore flore.

125. *F. FLUITANS*. Paniculâ ramosâ, erectâ, spiculis sessilibus, teretibus, muticis. *Linn. sp. pl.* 75, *n.* 10; *Leers, fl. herb.* 80, *tab.* 8, *fig.* 5; *Fl. danic.* 237.

*Poa fluitans*. *Scop. fl. carn. sp.* 106.

*Poa* locustis teretibus, multifloris, glumis floralibus, exterioribus truncatis, interioribus bifidis. *Hall. hist.* 1453.

*Gramen* aquis innatans. *Lobel, kruyd-b.*, *fol.* 142.



*Gramen aquaticum*, fluitans, multiplici spicâ. *Bauh. pin.* 3; *Scheuchz. agrost.* 199, *tab.* 4, *fig.* 5.

*Gramen loliaceum*, fluitans, spicâ longissimâ, divisâ. *Moris. hist.* 3, *fol.* 183, *tab.* 3, *fig.* 16.

Belgicè : *Vlot-gras*.

In fossis et paludibus communis. Mense junio floret.

44. **BROMUS.** Calix bivalvis, spicula oblonga, teres, distichia, arista infra apicem.

126. *B. SECALINUS.* Paniculâ patente, spiculis compressis, ovato-lanceolatis, glumis distichis, nudis, aristis subflexuosis, *Linn. sp. pl.* 76, n. 2; *Leers, fl. herb.* 81, *tab.* 11, *fig.* 2.

*Bromus foliis glabris*, locustis duodecimfloris. *Hall. hist.* 1502.

*Gramen avenaceum segetale*, majus, glumâ turgidiore. *Moris. hist.* 3, *tab.* 7, *fig.* 17.

*Festuca graminea*, glumis hirsutis. *Scheuchz. agrost.* 250, *tab.* 5, *fig.* 9.

*Festuca altera.* *Dodon., kruid b.* 862.

*Bromus sterilis altera* *Lobel, kruid-b.* 42; *Dalech. hist.* 1, *fol.* 338.

Belgicè : *Dravik*; gallicè : *Fetu*.

In arvis inter secale et hordeum. Julio florens, annua.

*Bromus hordeaceus sp. pl.*, et *bromus multiflorus* *Weigel. obs. bot.*, hujus sunt varietates.

127. *B. Squarrosus.* Paniculâ nutante, spiculis ovatis, aristis divaricatis. *Linn. sp. pl.*, n. 4; *Gouan, hort. monsp.* 50.

*Avena locustis teretibus*, novemfloris, aristis reflexis. *Hall. hist.* 1501.

*Gramen avenaceum*, locustis amplioribus, candicantibus, glabris et aristatis. *Tourn. inst.* 525.

*Festuca graminea*, glumis vacuis. *Scheuchz. agrost.* 251, *tab.* 5, *fig.* 11.

Belgicè : *Kleynen Dravik*; gallicè : *Averon*.

In siccioribus propè *Woluwe*. Pro varietate precedentis habet *Scop. fl. carn. sp.* 115.

128. *B. Möllis.* Paniculâ erectiusculâ, spiculis ovatis, pubescentibus, aristis rectis, foliis mollissimè villosis. *Linn. sp. pl.* 76, n. 3; *Leers, fl. herb.* 82, *tab.* 11, *fig.* 1.

- Bromus hirsutus*, locustis septifloris; ovato-conicis. *Hall. hist.* 1504.
- Gramen avenaceum locustis villosis, angustis, candidantibus et arista is. *Scheuchz. agrost.* 254, *tab.* 5, *fig.* 12; *Tourn. inst.* 526.
- Gramen avenaceum, pratense, paniculâ squamatâ et villosâ. *Moris. hist.* 3, *fol.* 213, *tab.* 7, *fig.* 18.
- Belgicè : *Muyse-koren*.
- In pratis et arvis, etc. Communis. Biennis, junio florens.
129. *B. ASPER*. Paniculâ nutante scabrâ, spiculis villosis, aristatis, foliis scabris. *Linn. syst. veget.* 189, *n.* 15.
- Bromus foliis hirsutis, oris asperissimis, locustis glabris, teretibus, novemfloris.* *Hall. hist.* 1503.
- Gramen avenaceum, villosum, locustis amplioribus, viridantibus, margine argenteo cinctis. *Scheuchz. agrost.* 253, *tab.* 5, *fig.* 10.
- Festuca graminea, nemoralis, latifolia, mollis.* *Bauh. pin.* 10.
- Festuca graminea dumetorum, jubâ longiore.* *Moris. hist.* 3, *fol.* 213, *tab.* 7, *fig.* 27.
- Ad margines *Elterbeek, St.-Gillis, Ganshoren, etc.* Perennis.
130. *B. STERILIS*. Paniculâ patulâ, spiculis oblongis, distichis; glumis subulato-aristatis. *Linn. sp. pl.* 77, *n.* 5; *Lobel. kryd-b.* 41; *Scop. fl. carn. sp.* 113; *Leers, fl. herb.* 83, *tab.* 11, *fig.* 4.
- Bromus paniculâ nutante, locustis septifloris, glumis argutè lanceolatis, lineatis, subhirsutis.* *Hall. hist.* 1505.
- Gramen avenaceum, paniculâ sparsâ, locustis majoribus, aristatis. *Scheuchz. agrost.* 258, *tab.* 5, *fig.* 14.
- Bromos herba.* *Dodon, kryd-b., fol.* 863.
- Festuca avenacea, sterilis, elatior.* *Moris. hist.* 3, *fol.* 212, *tab.* 7, *fig.* 11—13.
- Belgicè : *Ydel-haver*; gallicè : *Avoine stérile*.
- In agrorum versuris, viis, tectis, etc. *Una cum bromo tectorum.*
131. *B. ARVENSIS*. Paniculâ nutante, spiculis ovato-oblongis. *Linn. sp. pl.* 77, *n.* 6; *Leers, herb.* 84, *tab.* 11, *fig.* 3.
- Bromus glaber, locustis nutantibus, octifloris, glumis marginatis.* *Hall. hist., n.* 1509.

*Festuca graminea*, jubâ elîusa. *Bauh. pin.* 9; *Scheuchz. agrost.* 262, *tab.* 5, *fig.* 15.

*Gramen avenaceum*, dumetorum, paniculatum, majus, hirsutum. *Moris. hist.* 3., *fol.* 213.

In dumetis *Anderlegt*, *Itterbeek*, etc. Annuâ; julio floret.

45. AVENA. Calix bivalvis, multiflorus, aristâ dorsali contortâ.

132. *A. SATIVA*. Paniculata, calicibus dispermis, seminibus lævibus, altero aristato. *Linn. sp. pl.* 79, n. 6; *Gouan, hort. monsp.* 52. *Blakw. herb. tab.* 422.

*Avena diantha*, locustis pendulis, floribus cartilagineis, inæqualibus, majori aristatâ. *Hall. hist.* 1494.

*Avena vesca*. *Lobel, kruid-b.* 40; *Dodon, kruid-b.* 823.

*Avena*. *Matthiol. in diosc.*, *fol.* 168; *Dalech. hist.* 1, *fol.* 337.

*Avena vulgaris*. *Boerh. hort. lugd.* 161.

Belgicè : *Haver*; gallicè : *Avoine*.

In arvis ubiquè seritur. Annuâ.

133. *A. PUBESCENS*. Subspicata, calicibus subtrifloris, basi pilosis, foliis planis, pubescentibus. *Linn. sp. pl.* 79, n. 10; *Leers, fl. herb.* 91, *tab.* 9, *fig.* 2.

*Avena triantha*, locustis teretibus, erectis, petiolis sericeis, glumâ exteriori lacerâ. *Hall. hist.* 1458.

[ *Gramen avenaceum*, paniculâ purpureo-argenteâ splendente. *Scheuchz. agrost.* 226, *tab.* 4, *fig.* 20; *Raij. angl.* 3, *fol.* 406; *tab.* 21, *fig.* 1.

*Festuca dumetorum*. *Bauh. pin.* 20, *prodr.* 19; *Vaill. bot. par.* 89.

In pratis communis. Culmi basi hirsuti, folia brevina, panicula splendens.

134. *A. FATUA*. Paniculata, calicibus trifloris, flosculis omnibus aristatis, basi pilosis. *Linn. sp. pl.* 80, n. 12; *Leers, fl. herb.* 90, *tab.* 9, *fig.* 4; *Gouan, hort. monsp.* 53.

*Avena triantha*, locustis patulis, villosis. *Hall. hist.* 1495.

*Avena sylvestris*, pilosa, aristis recurvis. *Boerh. hort. lugd.* 161, p. 2; *Moris. hist.* 3, *fol.* 209.

*Festuca prior*. *Dodon, kruid-b.* 862.

*Ægilops bremoides* Belgarum. *Lobel, kruid-b.* 42.

Gramen avenaceum, utriculis lanugine flavescens. *Scheuchz. agrost. 239, tab. 5, fig. 1; Tourn. inst. 525.*

Belgicè : *Wilde Haver*; gallicè : *Coquiolo*.

Inter segetes, in què pratis propè *Laken*. Annuæ, julio florens.

135. *A. NUDA*. Paniculata, calicibus trifloris, receptaculo brevioribus, petalis dorso aristatis, flosculo tertio mutico. *Linn. sp. pl. 79, n. 7; Boerh. hort. lugd. 161, p. 2; Lobel, kruyd-b. 41; Dodon, kruyd-b. 823; Bauh. pin. 23; Bauh. hist. 2, fol. 339; Moris. hist. 3, fol. 209, tab. 7, fig. 4.*

Belgicè : *Nakte Haver*; gallicè : *Avoine bâtarde*.

Inter avenam sativam quandoque reperitur.

136. *A. PRATENSIS*. Subspicata, calicibus quinquefloris. *Linn. sp. pl. 80, n. 14; Gouan, hort. monsp. 53; Leers, fl. herb. 92, tab. 9, fig. 1.*

Avena petiolis brevibus unifloris, locustis teretibus quinquefloris basi pubescentibus. *Hall. hist. 1499.*

Gramen avenaceum montanum, spicâ simplici, aristis recurvis. *Raij. angl. 3, fol. 152, tab. 21, fig. 1; Scheuchz. agrost. fol. 230.*

Gramen avenaceum elatius, foliis angustioribus, glabris. *Moris. hist. 3, fol. 217, tab. 7, fig. 1.*

Belgicè : *Bemd-haver*; gallicè : *Avoine des prés*.

In pratis et pascuis. *Scopoli conjunxit n. 132—135 in unam speciem quam avenam pilosam vocat. Fl. carn. sp. 124.*

#### 46. ARUNDO. Calix bivalvis, multiflorus; flosculi lanâ cincti.

137. *A. PHRAGMITES*. Calicibus quinquefloris, paniculâ laxâ. *Linn. sp. pl. 81, n. 3; Scop. fl. carn. sp. 128; Leers, fl. herb. 94, tab. 7, fig. 1; Dodon. kruyd-b. fol. 952.*

Arundo foliis secantibus, locustis trifloris, papposis, muticis. *Hall. hist. 1515.*

Arundo vallatoria sive phragmites. *Lobel, kruyd-b. 70; Dalech. hist. 1, fol. 871.*

Arundo vulgaris sive phragmitis Dioscoridis. *Bauh. pin. 17; Boerh. hort. lugd. 161, p. 2; Scheuchz. agrost. 161, tab. 3, fig. 14. d.*

Belgicè : *Deh-riet*; gallicè : *Roseau*.

In aquis canalis, mœniorum, etc. Augusto floret:

47. **LOLIUM**. Calix monophyllus, fixus, multiflorus; spiculæ alternæ.

138. *L. PERENNE*. Spicâ muticâ, spiculis compressis, multifloris. *Linn. sp. pl.* 83. n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 129; *Leers, herb.* 97, tab. 12, fig. 1.

Lolium radice perenni, locustis octifloris, contiguis. *Hall. hist.* 1416.

Lolium rubrum. *Lobel, kruid-b.*, fol. 43.

Phœnix. *Dodon, kruid-b.* 863; *Dalech, hist.* 1, fol. 348.

Gramen loliaceum, angustiore folio et spicâ. *Bauh. pin.* 9; *Scheuchz. agrost.* fol. 25 et 29, n. 1, tab. 1, fig. 7, *agrost. prodr.* 16, tab. 2.

Belgicè : *Ray-gras*; gallicè : *Fausse Ivraie*.

Juxta vias et muros ubiquè. julio floret.

139. *L. TEMULENTUM*. Spicâ aristatâ, spiculis compressis, multifloris. *Linn. sp. pl.* 83, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 130; *Leers, fl. herb.* 98, tab. 12, fig. 2; *Lobel, kruid-b.* 44.

Lolium. *Dodon, kruid-b.* 860; *Dalech. hist.* 1, fol. 348; *Matthioli in diosc.* 170.

Gramen loliaceum, spicâ longiore; seu lolium Dioscoridis. *Bauh. pin.* 9; *Scheuchz. agrost.* 31, tab. 1, fig. 7, e. f.

Lolium verum Gesneri album. *Moris. hist.* 3, fol. 181; *Boerh. hort. lugd.* 157.

Belgicè : *Dolik*; gallicè : *Ivraie*.

Inter triticum et secale. Ad *Diegem*, *Saventhem*, etc.

48. **SECALE**. Calix oppositus, bivalvis, biflorus, solitarius.

140. *S. CEREALE*. Glumarum ciliis scabris. *Linn. sp. pl.* 84, n. 1; *Hall. hist.* 1421; *Blakw. herb. tab.* 124.

Secale. *Dodon, kruid-b.* 86; *Lobel, kruid-b.* 51; *Dalech. hist.* 1, fol. 331.

Secale hybernium (et vernum). *Bauh. pin.* 23; *Boerh. hort. lugd.* 156. n. 1—2.

Belgicè : *Rogge*, *Koörn*; gallicè : *Seigle*.

In arvis seritur.

49. HORDEUM. Calix lateralis, bivalvis, uniflorus, ternus.

141. *H. VULGARE*. Flosculis omnibus hermaphroditis, aristatis, ordinibus duobus erectioribus. *Linn. syst. veget.* 198, n. 1; *Blakw. herb. tab.* 423.

Hordeum spicâ subdistichâ, calice folioso, setaceo, floribus omnibus hermaphroditis, longè aristatis. *Hall. hist.*, n. 1533.

Hordeum polystichum vernum. *Bauh. pin.* 22; *Moris. hist.* 3, tab. 6, fig. 3.

Hordeum. *Lobel, kruid-b.* 32; *Dodon, kruid-b.* 808; Belgicè : *Winter-gerste*; gallicè : *Gros Orge*.

In arvis seritur.

142. *H. HEXASTICHON*. Flosculis omnibus hermaphroditis, aristatis, seminibus sexfariam æqualiter posititis. *Linn. syst. veget.* 198, n. 2; *Dodon, kruid-b. fol.* 809.

Hordeum spicâ polystichâ, floribus omnibus hermaphroditis, longè aristatis. *Hall. hist.*, n. 1534.

Hordeum polystichon. *Lobel, kruid-b. fol.* 33.

Hordeum hexastichon pulchrum. *Bauh. hist.* 2, fol. 129.

Belgicè : *Somer-gerste*; gallicè : *Orge d'été*.

In arvis præ aliis commune.

143. *H. DISTICHON*. Spiculis lateralibus masculis, muticis, seminibus angularibus, imbricatis. *Hall. hist.*, n. 1535; *Lobel, kruid-b.* 33; *Dodon, kruid-b. fol.* 809; *Bauh. pin.* 22; *Moris. hist.* 3, tab. 6, fig. 1; *Bauh. hist.* 2, fol. 429; *Dalech. hist.* 1, fol. 33.

Belgicè : *Kleyne Gerste*; gallicè : *Orge pomole*.

In arvis seritur.

144. *H. MURINUM*. Flosculis lateralibus masculis, aristatis, dorso glabris, involucris intermediis ciliatis. *Linn. syst. veget.* 199, n. 9; *Fl. dan. tab.* 629; *Scop. fl. carn. sp.* 1241.

Hordeum spicis crassis, longè aristatis, calicinis gemmis aristatis. *Hall. hist.*, n. 1536.

Hordeum spontaneum spurium. *Lobel, kruid-b.* 37.

Gramen hordeaceum minus vulgare. *Bauh. pin.* 9; *Scheuchz. agrost.*, fol. 14, et fol. 17, n. 3.

Gramen secalinum vulgatissimum viarum. *Moris. hist.* 3, fol. 179, tab. 6, fig. 4.

Belgicè : *Wilde Gerste* ; gallicè : *Orge sauvage*.  
Juxta vias, muros, etc., ubiquè.

50. TRITICUM. Calix bivalvis, solitarius, subtriflorus, flos obtusiusculus.

145. *T. ÆSTIVUM*. Calicibus quadrifloris, ventricosis, glabris, imbricatis, aristatis. *Linn. syst. veget.* 199, n. 1; *Bauh. pin.* 21; *Blakw. herb.*, tab. 40, fig. 4—5. *Triticum locustis imbricatis, quadrifloris, glabris, aristatis. Hall. hist.*, n. 1422.

*Triticum aristis circumvallatum. Lobel, kruid-b.* 27.  
*Triticum typhinum. Dodon, kruid-b.* 794; *Dalech. hist.* 1, fol. 329.

Belgicè : *Bruyne Terwe, Somer Terwe* ; gallicè : *Bled de Mars*.

In arvis colitur.

146. *T. HYBERNUM*. Calicibus quadrifloris, ventricosis, lævibus, imbricatis, submuticis. *Linn. syst. veget.* 199, n. 2; *Blakw. herb. tab.* 4, fig. 1, 2, 3; *Gouan, hort. monsp.* 57.

*Triticum locustis imbricatis, quadrifloris, glabris, muticis. Hall. hist.*, n. 1421.

*Siligo spicâ muticâ. Lobel, kruid-b.*, fol. 27; *Dalech. hist.* 1, fol. 317.

*Triticum. Dodon, kruid-b.* 792.

*Triticum hybernum, aristis carens. Bauh. pin.* 21; *Boerh. hort. lugd.*, fol. 153.

Belgicè : *Winter Terwe, Witte Terwe* ; gallicè : *Froment muttet*.

In arvis colitur.

147. *T. REPENS*. Calicibus quadrifloris, subulatis, acuminatis, foliis planis. *Linn. syst. veget.* 200, n. 12; *Leers, fl. herb. born.* 95, tab. 12, fig. 3; *Blakw. herb. tab.* 53, fig. 7; *Fl. dan. tab.* 748.

*Bromus glaber. Scop. fl. carn. sp.* 120.

*Triticum radicibus repentibus, vaginosis, foliis hirsutis, locustis quinquefloris. Hall. hist.*, n. 1426.

*Gramen caninum arvense, seu gramen dioscoridis. Bauh. pin.* 1; *Scheuchz. agrost.*, fol. 5, n. 2; *Moris. hist.* 3, fol. 178, tab. 1, fig. 8.

*Gramen canarium. Lobel, kruid-b.* 21.

*Gramen. Dodon, kruid-b.*, fol. 887; *Dalech. hist.* 1, fol. 353.

Belgicè : *Honds-gras*, *Lid-gras*, *Peën*; gallicè : *Chien-dent*.  
In agris ubiquè. Perennis, julio florens.

## TRIGYNIA.

51. AMARANTHUS. Flores *monoïci*, corolla nulla; calix tri-aut-quinquefidus. *Masc.* Stamina tria aut quinque. *Fem.* Capsula unilocularis, circumscissa, subcompressa, calici insidens, mono-sperma.

148. *A. BLITUM*. Glomerulis lateralibus; floribus trifidis, foliis oblongo-ovatis, retusis, caule diffuso. *Linn. sp. plant.* 990; n. 6.

*Amaranthus sylvestris* et vulgaris. *Tourn. paris.* 2, fol. 248.

*Blitum majus*. *Scop. fl. carn. sp.* 1178; *Dodon, kruid-b.*, fol. 965, n. 1; fol. 966, n. 3.

*Blitum rubrum supinum*. *Lobel, kruid-b.* 302.

*Blitum album* (et rubrum). *Lobel, kruid-b.* 301; *Bauh. pin.* 118; *Bauh. hist.* 2, fol. 967; *Moris. hist.* 2, fol. 599. *In solo pinguiori*.

Belgicè : *Groote Meyer*; gallicè : *Blette*.

In versuris communis. *Varietas erecta in arvis inter Solanum tuberosum frequens*.

149. *A. VIRIDIS*. Floribus glomeratis, masculis trifidis, foliis emarginatis, caule erecto. *Linn. syst. veget.* 205, n. 12.

*Blitum album minus*. *Bauh. pin.* 118; *Moris. hist.* 2, fol. 599; *Bauh. hist.* 2, fol. 967; *Boerh. hort. lugd.* 95; *Lobel kruid-b.* 302.

*Blitum minus*. *Dodon, kruid-b.* 965.

*Blitum sylvestre spicatum*. *Tourn. paris.* 2, fol. 273.

Belgicè *Kleyne Meyer*; gallicè : *Petite Blette*.

Propè *Ganshoren*, *Koningsloo*, etc., sub sepibus. Annuæ, julio florens.

*Caulis ruber, striatus, folia margine rubicundo undata, flores quinquefidi*.



## CLASSIS QUARTA.

## TETRANDRIA.

## MONOGYNIA.

52. **DIPSACUS.** Calix communis polyphyllus, proprius superus, receptaculum paleaceum.
150. *D. FULLONUM.* foliis connatis integerrimis, paleis recurvatis. *Linn. sp. plant.* 97, n. 1; *Gouan, hort. monsp.* 60; *Scop. fl. carn. sp.* 141.  
*Dipsacus sativus.* *Dodon, kruyd-b.* 1151; *Lobel, kruyd-b.* 20; *Bauh. pin.* 385; *Bauh. hist.* 3, fol. 73; *Morris. hist.* 3, fol. 168.  
 Labrum veneris. *Matthiol. in diosc.*, fol. 234.  
 Belgicè : *Volders Kaerden*; gallicè : *Chardon à foulon*.  
 Ad *Schaerbeek*, *Elmet*, etc. Biennis, julio florens.
151. *D. SYLVESTRIS.* Foliis sessilibus serratis, paleis rectis. *Linn. syst. veget.* 227, n. 2; *Jacq. fl. austr. tab.* 402; *Dodon, kruyd-b.* 1151; *Bauh. pin.* 385; *Blakw. herb. tab.* 50.  
*Dipsacus capitulo ovato*, foliis arcuatis circumvallato, glumis erectis. *Hall. hist.*, n. 198.  
 Labrum veneris. *Lobel, kruyd-b.* fol. 20, p. 2.  
*Dipsacus sylvestris sive labrum veneris.* *Bauh. hist.* 3, fol. 74.  
 Belgicè : *Wilde Kaerden*; gallicè : *Chardon à bonnetier*.  
 Ad margines pratorum, etc. Biennis, julio florens.
152. *D. PILOSUS.* Foliis petiolatis, appendiculatis. *Linn. syst. veget.* 227, n. 4; *Jacq. fl. austr. tab.* 248; *Blakw. herb. tab.* 124.  
*Dipsacus foliis bauribus*, capitulis hemisphaericis. *Hall. hist.* 199.  
*Dipsacus tertius.* *Dodon, kruyd-b.*, fol. 1152.  
*Virga pastoris.* *Lobel, kruyd-b.*, fol. 21, p. 2; *Dalech. hist.* 2, fol. 329.

*Virga pastoris minor.* *Matthiol. in diosc.* 234; *Bauh. pin.* 385.

Belgicè : *Kleyne Wilde Kaerden.*

Inveni juxta arcem dictam *het Motteken*, propè *den Hoogen-Leest*, ad *Laken*, nec alibi. Biennis, augusto florens.

53. SCABIOSA. Calix communis polyphillus, proprius duplex, superus; receptaculum paleaceum vel nudum, involvens semen duplicatum, lignosum.

153. *S. Succisa.* Corollulis quadrifidis, æqualibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. *Linn. sp. pl.* 98, n. 4; *Blakw. herb. tab.* 142; *Scop. fl. carn. sp.* 138.

*Succisa* caule trifloro, floribus convexis, foliis radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis. *Hall. hist.*, n. 201.

*Succisa* vel morsus diaboli. *Dodon, kruyd-b.* 175; *Lobel, kruyd-b.* 646; *Matthiol. in diosc.* 218; *Dalech. hist.* 1, fol. 932.

*Scabiosa integrifolia*, glabra, radice præmorsâ. *Boerh. hort. lugd.* 129.

Belgicè : *Duyvels-Bête*; gallicè : *Mors de diable.*

In pascuis umbrosis. Perennis, augusto florens.

154. *S. Arvensis.* Corollulis quadrifidis, radiantibus, foliis pinnatifidis, incisis, caule hispido. *Linn. sp. pl.* 99, n. 8; *Scop. carn. sp.* 135; *Blaw. herb. tab.* 185. *Scabiosa vulgaris major.* *Dodon, kruyd-b.* 171; *Lobel, kruyd-b.* 636.

*Scabiosa pratensis hirsuta.* *Bauh. pin.* 269; *Boerh. hort. lugd.* 129.

*Scabiosa* foliis petiolatis, ovato-lanceolatis, dentatis, superioribus semi-pinnatis. *Hall. hist.*, n. 206.

Belgicè *Schurft-kruyd*; gallicè : *Scabieuse.*

Ad margines siccos ubique. Perennis, augusto florens.

155. *S. COLUMBARIA.* Corollulis quinquesfidis, radiantibus, foliis radicalibus simplicibus, crenatis, caulinis compositis. *Linn. sp. pl.* 99, n. 10; *Scop. fl. carn. sp.* 140.

*Succisa* foliis imis ovatis, superioribus pinnatis, pinnis semipinnatis, acutis, ciliis flosculorum longitudine. *Hall. hist.*, n. 202.

*Scabiosa minor.* *Matthiol. in diosc.* 325; *Lobel, kruyd-b.* 636; *Dalech. hist.* 1, *fol.* 931.

*Scabiosa media.* *Dodon, kruyd-b., fol.* 173.

*Scabiosa capitulo globoso minor.* *Bauh. pin.* 270; *Moris. hist.* 3, *fol.* 48; *Boerh. hort. lugd., fol.* 130; *Tourn. inst.* 466.

Belgicè : *Kleyn Schurft-kruyd*; gallicè : *Petite Scabieuse.*

Propè *Stalle, Linkenbeek, etc.* Perennis, augusto florens.

54. *ASPERULA.* Corolla monopetala, infundibuliformis, semina duo globosa, suberosa.

156. *A. ARVENSIS.* Foliis senis, floribus terminalibus sessilibus, aggregatis. *Linn. sp. pl.* 103, *n.* 2; *Scop. fl. carn. sp.* 159; *Gouan, hort. monsp.* 65.

*Asperula* foliis octonis, obtusis, floribus sessilibus, congestis, bracteis ciliatis. *Hall. hist., n.* 733.

*Asperula cærulæa.* *Dodon, kruyd-b.* 577; *Lobel, kruyd-b.* 977; *Dalech. hist.* 1, *fol.* 756.

*Galium arvense* flore cærulæo. *Tourn. inst.* 115.

*Asperula erecta cærulæa.* *Boerh. hort. lugd., fol.* 149.

*Asperula cærulæa arvensis.* *Bauh. pin.* 334; *Moris. hist.* 3, *fol.* 332.

Belgicè : *Blauwe Wal-meester*; gallicè : *Hépatique des champs.*

Ad *Diegem*, propè *molam, etc.* Annuâ, junio florens.

157. *A. LÆVIGATA.* Foliis quaternis, ellipticis, enerviis, læviusculis, pedunculis divaricatis, trichotomis, seminibus scabris. *Linn. syst. veget.* 235, *n.* 10; *Jacq. fl. austr. tab.* 94.

*Gallium rotundifolium.* *Scop. carn. sp.* 150; *Linn. sp. pl.* 108, *n.* 18.

*Rubia quadrifolia, seu rotundifolia, lævis.* *Bauh. pin.* 334.

*Rubia quadrifolia* semine duplici, hispido. *Moris. hist. tab.* 21, *fig.* 4—5; *Bauh. hist.* 3, *fol.* 718.

*Cruciata lusitanica latifolia, glabra, flore albo.* *Tourn. inst.* 115.

Belgicè : *Bosch-Walmeester*; gallicè : *Hépatique des bois.*

Propè *Vorst*, inter fruteta. Perennis, maio florens. *Rarior.*

55. *GALIMUM*. Corolla monopetala, campanulata, brevis, semina duo subglobosa, suberosa, infera.
158. *G. PALUSTRE*. Foliis quaternis, obovatis, inæqualibus, caulibus diffusis. *Linn. sp. pl.* 105, n. 2; *Dodon, kruyd-b.*, fol. 576; *Bauh. pin.* 335; *Fl. dan. tab.* 423; *Gouan, hort. monsp.* 66.  
Cruciata palustris alba. *Tourn. inst.* 115.  
Cruciata palustris parva procumbens, flore albo, spicato. *Boerh. hort. lugd.* 149.  
Galium caule radiato, diffuso, foliis quaternis, ovatis, obtusis. *Hall. hist.* 719.  
Galium palustre album. *Bauh. pin.* 335.  
Belgicè : *Water-Walstroo*.  
Juxta aquas, in pratis humidis, etc. Perennis, junio florens.
159. *G. ULIGINOSUM*. Foliis senis, lanceolatis, retrorsum scabris, serrato-aculeatis, mucronatis, rigidis, corollis fructu majoribus. *Linn. syst. veget.* 237, n. 9; *Gouan, fl. monsp.* 11.  
Galium caule subaspero, foliis senis, elliptico-lanceolatis, aristatis. *Hall. hist.* n. 713.  
Mollugo montana minor, galio albo similis. *Raij, hist.* 482.  
Rubia quædam minor. *Bauh. hist.* 3, fol. 716.  
In pascuis aquosis *Vorst, Anderlegt, etc.* Maio florens.
160. *G. SPURIUM*. Foliis senis, lanceolatis, carinatis, scabris, retrorsum aculeatis, geniculis simplicibus, fructubus scabris, recurvatis. *Linn. syst. veget.* 239, n. 34.  
Galium foliis serratis, petiolis divaricatis, seminibus rugosis. *Hall. hist.* 724.  
Aparine vulgaris semine minori. *Vaill. bot. par. tab.* 4, fig. 3.  
Aparine semine lævi. *Boerh. hort. lugd.* 150; *Tourn. inst.* 114; *Raij. hist.* 484.  
Aparine foliis crebrioribus, semine lævi. *Moris. hist.* 3, fol. 332.  
Belgicè : *Kleyn Kleef-kruyd*; gallicè : *Petit Grateron*.  
In versuris *Boondaël*, propè sylvam *Linthout*. Annua, junio florens. *Affinis galii aparines sed minor*.
161. *G. VERUM*. Foliis octonis, linearibus, sulcatis, ramis floriferis brevibus. *Linn. sp. pl.* 107, n. 11; *Scop. fl. carn. sp.* 153; *Blakw. herb. tab.* 435.

- Galium foliis octonis, linearibus, perangustis, racemis multifloris, spicatis. Hall. hist., n. 710.*  
*Galium luteum. Lobel, kruyd-b., fol. 979; Bauh. pin. 335; Tourn. inst. 115; Moris. hist. 3, fol. 327; Boerh. hort. lugd. 148.*  
*Galium. Matthiol. in diosc., fol. 366; Dalech. hist. 1, fol. 953; Dodon, kruyd-b. 575.*  
 Belgicè : *Walstroo*; gallicè : *Caille-lait jaune*.  
 Ad margines ubiquè. Junio floret; perennis.
162. *G. MOLLUGO. Foliis octonis, ovato-linearibus, subserratis, patentissimis, mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. Linn. sp. pl. 107, n. 12; Scop. fl. carn. sp. 155.*  
*Galium foliis octonis ellipticis, caule anguloso. Hall. hist., n. 711.*  
*Mollugo. Clus. hist. rar. 176, p. 2; Dodon, kruyd-b. 575; Dalech. hist. 1, fol. 953.*  
*Mollugo montana. Dodon. loc. cit.; Dalech. id.*  
*Mollugo vulgaris herbariorum (et belgarum). Lobel, kruyd-b. 977.*  
*Galium album latifolium. Blakw. herb. tab. 168.*  
*Rubia sylvestris lævis. Bauh. pin. 333.*  
 Belgicè : *Sagt-kruyd*; gallicè : *Caille-lait blanc*.  
 In sepibus ubiquè. Perennis, julio florens.
163. *G. APARINE. Foliis octonis lanceolatis, carinatis, scabris, retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructus hispidis. Linn. sp. pl. 108, n. 19; Scop. fl. carn. sp. 157; Blakw. herb. tab. 39.*  
*Galium caule tereti, foliis senis, linearibus, serratis, petiolis unifloris, seminibus hispidis. Hall. hist., n. 723.*  
*Aparine. Dodon, kruyd-b. 574; Lobel, kruyd-b. 976; Matthiol. in diosc. 282.*  
*Aparine vulgaris. Bauh. pin. 334; Boerh. hort. lugd. 150.*  
 Belgicè : *Kleef-kruyd*; gallicè : *Gratteron*.  
 In sepibus. Annua, julio florens.
56. VALANTIA. Flores masculi hermaphroditis sæpius intersiti; corolla monopetala, campanulata, brevis, semina duo globosa, suberosa, infera.
164. *V. CRUCIATA. Floribus masculis quadrifidis, pedunculis diphyllis. Linn. sp. pl. 1052, n. 4; Blakw. herb. tab. 76; Gouan, hort. monsp. 516.*

*Galium cruciata*. Scop. *fl. carn. sp.* 145.

*Galium foliis quaternis, hirsutis, petiolis octifloris.*

*Hall. hist.* n. 709.

*Cruciata*. Dodon. *kruyd-b.* 578.

*Cruciata minor*. Lobel, *kruyd-b.* 979.

*Cruciata hirsuta*. Bauh. *pin.* 335; *Tourn. inst.* 115.

Belgicè : *Kruys-kruyd*; gallicè : *Croisette*.

In sepibus et marginibus. Floret per totam æstatem:

57. **PLANTAGO.** Calix quadrifidus, corolla quadrifida, persistens, limbo reflexo; stamina longissima; capsula bilocularis, circumscissa, superæra.

165. *P. MAJOR.* Foliis ovatis glabris, scapo tereti, spicâ flosculis imbricatis. *Linn. sp. pl.* 112, n. 3; *Scop. fl. carn. sp.* 161; *Dodon. kruyd-b.*, fol. 149.

*Plantago foliis petiolatis, ovatis, glabris, spicâ tereti.* *Hall. hist.* n. 660.

*Plantago latifolia lævis.* Lobel, *kruyd-b.*, fol. 373.

*Plantago latifolia sinuata.* Bauh. *pin.* 189; *Boerh. hort. lugd.* 100.

*Plantago latifolia vulgaris.* *Moris. hist.* 3, fol. 258, tab. 15, fig. 6; *Matthiol in Diosc.* 185; *Dalech. hist.* 2, fol. 147.

Belgicè : *Groote Wegbree*; gallicè : *Grand Plantain*.

In viis *Anderlegt*, *Ruysbroek*, etc. Perennis, julio florens.

166. *P. MEDIA.* Foliis ovato-lanceolatis, pubescentibus, spicâ cylindricâ, scapo tereti. *Linn. sp. pl.* 113, n. 3; *Fl. dan. tab.* 581; *Scop. fl. carn. sp.* 162; *Dodon. kruyd-b.* fol. 149.

*Plantago foliis subhirsutis, ellipticis, spicâ cylindricâ, densâ.* *Hall. hist.* n. 659.

*Plantago major incana.* *Clus. hist. rar.* 109; *Lobel, kruyd-b.* 373.

*Plantago latifolia incana.* Bauh. *pin.* 189; *Moris. hist.* 3, fol. 259, tab. 15, fig. 7.

*Plantago major.* *Matthiol. in Diosc.* 185; *Dalech. hist.* 2, fol. 147.

Belgicè : *Wegbree*; gallicè : *Plantain*.

In viis humidis ubiquè. Perennis, julio florens.

167. *P. LANCEOLATA*. Foliis lanceolatis, spicâ subovatâ nudâ, scapo angulato. *Linn. sp. pl.* 113, n. 4; *Scop. fl. carn. sp.* 163; *Matthiol. in Diosc.* 185; *Blakw. herb. tab.* 14.

*Plantago minor seu lanceolata. Dodon. kruid-b. fol.* 149.

*Plantago quinquenervia. Lobel, kruid-b.* 375.

*Plantago angustifolia major. Bauh. pin.* 189; *Moris. hist.* 3, fol. 259; *Boerh. hort. lugd. fol.* 100.

*Plantago foliis lanceolatis, quinquenerviis, scapo nudo, spicâ ovatâ. Hall. hist., n.* 656.

Belgicè : *Honds-ribbe*; gallicè : *Plantain lancéolé*;  
In pratis ubiquè. Perennis, julio florens.

168. *P. CORONOPIFOLIA*. Foliis linearibus, dentatis, scapo tereti. *Linn. sp. pl.* 115, n. 16; *Gouan, hort. monsp.* 70; *Fl. danic. tab.* 272.

*Plantago foliis subhirsutis, semipinnatis, pinnis raris, lanceolatis. Hall. hist., n.* 658.

*Coronopus hortensis. Bauh. pin.* 190; *Boerh. hort. lugd.* 101; *Blakw. herb. tab.* 460.

*Herba stella seu cornu cervinum. Dodon. kruid-b.* 150.

*Coronopus vel cornu cervinum. Lobel, kruid-b.* 524.

*Coronopus. Matthiol. in Diosc.* 187; *Dalech. hist.* 1, fol. 571.

Belgicè : *Herts-horen*; gallicè : *Corne de cerf*.

Ad Stalle, St.-Gillis, Elmet, etc. Augusto floret.

58. *CORNUS*. Involucrum sæpius tetraphyllum, petala quatuor supera; drupa succulenta, infera, bilocularis, ossicula solitaria.

169. *C. MISCULA*. Arborea, umbellis involucrum æquantibus. *Linn. sp. pl.* 117, n. 2; *Hall. hist.* 815; *Blakw. herb. tab.* 121; *Scop. fl. carn. sp.* 170.

*Cornus mas. Dodon. kruid-b.* 1256; *Lobel, kruid-b., fol.* 200.

*Cornus mas pumilio. Clus. hist. rar., fol.* 13.

*Cornus. Matthiol. in Diosc.* 105; *Dalech. hist.* 1, fol. 277.

*Cornus sylvestris mas. Bauh. pin.* 447.

Belgicè : *Cornoeliën-boom*; gallicè : *Cornouillier*;  
In sepiibus, sylvulis, etc. Maio floret.

59. **TRAPA.** Calix quadripartitus, corolla tetrapetala; nux spinis oppositis cincta quæ fuere calicis folia; hinc maturæ, cornuta, unilocularis, monosperma.
170. *T. NATANS.* Nucibus quadricornibus, spinis patentibus. *Linn. supplm., fol. 128.*  
*Trapa foliis natantibus, petiolis ventricosus Hall. hist., n. 527.*  
*Tribulus aquaticus. Dodon. kruid-b. 922; Lobel; kruid-b., fol. 706; Bauh. pin. 194; Matthiol. in diosc. 326; Dalech. hist. 1, fol. 947.*  
*België: Water-noten; gallicè: Châtaigne d'eau.*  
*In piscinâ propè abbatiam Vorst, vulgò den Roetaerd.*
60. **PARIETARIA.** Flores *feminei* hermaphroditis in eodem trunco intersiti, calix quadrifidus, corolla nulla; semen unum, superum, elongatum.
171. *P. OFFICINALIS.* Foliis lanceolato-ovatis, pedunculis dichotomis, calicibus diphyllis. *Linn. sp. pl. 1052, n. 1; Scop. fl. carn. sp. 1242.*  
*Parietaria foliis elliptico-lanceolatis, hirsutis. Hall. hist., n. 1612.*  
*Parietaria officinarum et Dioscoridis. Bauh. pin. 121.*  
*Parietaria. Dodon. kruid-b. 140; Lobel, kruid-b. 311; Dalech. hist. 2, fol. 135; Tourn. inst. 509.*  
*België: Glas-kruid; gallicè: Pariétaire.*  
*Juxta muros, hortos, etc. Julio floret, perennis.*
61. **URTICA.** Flores *diclini*, calix tetraphyllus; corolla nulla. *Masc.* Nectarium centrale, cyathiforme. *Fem.* Calix foliola duo opposita exigua, stygma villosum; semen unicum, ovatum, nitidum.
172. *U. Dioïca.* Floribus dioïcis, foliis oppositis, cordatis, racemis geminis. *Linn. sp. pl. 984, n. 2; Scop. fl. carn. sp. 1175; Fl. dan. tab. 746; Blakw. herb. tab. 12.*  
*Urtica stirpibus sexu distinctis, foliis ovato-lanceolatis, productis, serratis. Hall. hist., n. 1614.*



*Urtica communis.* *Lobel, kruid-b., fol.* 617.

*Urtica urens maxima.* *Bauh. pin.* 232.

*Urtica major vel femina.* *Dodon. kruid-b.* 224.

Belgicè : *Groote Netel*; gallicè : *Grande Ortie*.

Sub sepibus, etc. Perennis, junio florens.

173. *U. URENS.* Floribus monoïcis, foliis oppositis, ovalibus, caule ramoso. *Linn. sp. pl.* 984, n. 3; *Scop. fl. carn. sp.* 1174; *Fl. dan. tab.* 739.

*Urtica sexubussede distinctis, foliis ovato-lanceolatis, serratis, spicis oblongis.* *Hall. hist. n.* 1615.

*Urtica urens minima.* *Dodon. kruid-b., fol.* 224.

*Urtica minor acrior.* *Lobel, kruid-b.* 618.

*Urtica urens minor.* *Bauh. pin.* 232; *Boerh. hort. lugd.* 105.

Belgicè : *Heete Netel*; gallicè : *Ortie brûlante*.

Ad margines ubiquè.

62. *VISCUM.* Flores dioïci, corolla nulla. *Masc.* Calix quadripartitus, filamenta nulla, antheræ calici adnatæ. *Fem.* Calix tetraphyllus, superus; stylus nullus; bacca pulposa, unilocularis, monosperma; semen cordatum.

174. *V. ALBUM.* Foliis lanceolatis, obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus. *Linn. sp. pl.* 1023; *Scop. fl. carn. sp.* 1217; *Hall. hist. n.* 1609.

*Viscum.* *Dodon. kruid-b.* 1294; *Lobel, kruid-b.* 775; *Blakw. herb. tab.* 184; *Matthiol. in Diosc.* 281; *Dalech. hist.* 1, fol. 14; *Tourn. inst.* 609.

*Viscum baccis albis.* *Bauh. pin.* 423; *Boerh. hort. lugd.* 228.

Belgicè : *Maren-takken*; gallicè : *Gui*.

Parasitica in arboribus crescens, *quercubus, etc.* Maio florens.

63. *ALCHEMILLA.* Calix octofidus, corolla nulla, semen unum aut alterum, calice vestitum.

175. *A. VULCANIS.* Foliis lobatis. *Linn. sp. pl.* 123, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 174; *Blakw. herb. tab.* 72; *Clus. hist. rar.* 108; *Bauh. pin.* 319; *Boerh. hort. lugd.* 92. *Alchemilla.* *Dodon. kruid-b.* 204; *Lobel, kruid-b.* 810.

*Stellaria. Matthiol. in Diosc. 376, Dalech. hist. 1, fol. 173.*

Belgicè : *Leeuwen-voet*; gallicè : *Pied de lion*.

Propè arcem D. *Stordeur* ad *Laken*, juxta rivulum;  
Junio florens; perennis. *Rarior*.

DIGYNIA.

64. *BETULA*. Flores *monoïci*, calix monophyllus; tri-aut-quinque-fidus; corolla quadripartita. *Masc.* Calix triflorus. *Fem.* Calix biflorus, semina duo aut tria.

176. *BALBA*. Foliis deltoïdibus, acutis, duplicato-serratis, glabris, ramis erectis strictis. *Linn. sp. pl. 982, n. 1; Scop. fl. carn. sp. 1171.*

*Betula* foliis cordato-lanceolatis, serratis. *Hall. hist., n. 1628.*

*Betula. Dodon. kruid-b. 1313; Lobel, kruid-b. 222, p. 2; Bauh. pin. 427; Bauh. hist. 1, fol. 148; Boerh. hort. lugd. 182; Matthiol. in Diosc. 69.*

Belgicè : *Berken-boom*; gallicè : *Bouleau*.

In sylvis omnibus. Initio aprilis floret.

177. *B. ALNUS*. Pedunculis ramosis, cuneiformibus, obtusissimis, foliis subrotundis, glutinosis, venarum axillis subtus villosis. *Linn. sp. pl. 983, n. 5; Scop. fl. carn. sp. 1172.*

*Alnus* foliis glabris, rotundis, rotundè crenatis, spongiolis ad nervorum angulos. *Hall. hist., n. 1630.*

*Alnus rotundifolia*, glutinosa, viridis. *Bauh. pin. 428; Boerh. hort. lugd. 181.*

*Alnus. Dodon. kruid-b. 1312; Lobel, kruid-b. 224, p. 2; Matthiol. in Diosc. 69.*

*Alnus altera. Clus. hist. rar. 12.*

Belgicè : *Elsen-boom*; gallicè : *Aune*.

In sylvis, juxta rivulos, etc. Initio aprilis floret.

TETRAGYNIA.

65. *ILEX*. Flores rariùs *polygami*, calix quadridentatus; corolla rotata, stylus nullus, bacca tetrasperma.

178. *IL. AQUIFOLIUM*. Foliis ovatis acutis, spinosis, pe-

tiolatis, floribus axillaribus subumbellatis. *Linn. sp. pl.* 125, n. 1; *Hall. hist.*, 667; *Blakw. herb. tab.* 305.

*Aquifolium ilex. Scop. fl. carn. sp.* 177.

*Aquifolium haccis rubris. Boerh. hort. lugd.*, 219, p. 2.

*Aquifolium vel agrifolium. Dodon. kruid-b.* 1188;

*Lobel, kruid-b.* 184, p. 2; *Bauh. hist.* 1, fol. 114.

Belgicè : *Hulst*; gallicè : *Houx*.

In sylva Soniæ, propè *Tervuren*. Junio floret.

## 66. POTAMOGETON. Calix nullus, petala quatuor, stylus nullus, semina quatuor.

179. *P. NATANS*. Foliis oblongo-ovatis, petiolatis, nantibus. *Hall. hist.*, n. 844.

*Potamogeton rotundifolium. Bauh. pin.* 193; *Raij. synop.* 60; *Boerh. hort. lugd.*, fol. 196; *Tourn. inst.* 233.

*Potamogeton vel fontinalis. Dalech. hist.* 1, fol. 878.

*Potamogeton rotundiori folio. Bauh. hist.* 3, fol. 776.

Belgicè : *Swem-kruid*; gallicè : *Epi d'eau*.

In fossis Mœniorum, piscinis *Etterbeek*, etc. Perennis, septembri florens.

180. *P. PERFOLIATUM*. Foliis cordatis, amplexicaulibus.

*Linn. sp. pl.* 126, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 179;

*Hall. hist.* n. 845; *Raij. hist.* 188.

*Potamogeton foliis latis splendentibus. Bauh. pin.* 195.

*Potamogeton tertium. Dodon. kruid-b.* 923.

*Potamogeton altera. Bauh. hist.* 3, fol. 277.

Belgicè : *Water-patik*.

In aquis Mœniorum, et canalis propè pontem *Laken*, etc. Fine augusti floret.

181. *P. CRISPUM*. Foliis lanceolatis, alternis vel oppositis, undulatis, serratis. *Linn. sp. pl.* 126, n. 5; *Hall. hist.*, n. 848; *Scop. fl. carn. sp.* 181.

*Potamogeton seu fontinalis crispa, foliis alternis, cauliculis compressis. Boerh. hort. lugd.* 197; *Bauh. hist.* 3, fol. 778.

*Potamogeton foliis crispis, seu lactuca ranarum, samentis planis. Bauh. pin.* 193.

*Fontilappatum pusillum. Lobel, kruid-b.* 351.

*Tribulus aquaticus minor. Clus. hist. rar.* 252.

Belgicè : *Fonteyn-kruid*.

In aquis Sennæ, propè *Veewyde*, inque canali, septembri floret.

182. *P. SERRATUM*. Foliis lanceolato-ovatis, subpetiolatis, superioribus oppositis. *Linn. sp. pl.* 126, n. 6; *Scop. fl. carn. sp.* 178.

Potamogeton longo serrato folio. *Bauh. pin.* 193.

Potamogeton foliis tenuibus, ellipticis, nervis convergentibus *Hall. hist.* n. 846.

Lappatum fluitans longo serrato folio. *Bauh. hist.* 2, fol. 988.

Potamogeton altera. *Dodon. kruid-b.* 923.

Belgicè : *Groot Fonteyn-kruid.*

In aquis Sennæ propè *Ruyschbroek*, in rivulis, etc. Floret septembris initio.

67. *SAGINA*. Calix tetraphyllus, persistens, petala quatuor; capsula unilocularis, quadrivalvis, polysperma.

183. *S. PROCUMBENS*. Ramis procumbentibus. *Linn. sp. pl.* 128, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 183; *Gouan, hort. monsp.* 77.

Alsine tetrastemon, foliis connatis lanceolatis. *Hall. hist.*, n. 861.

Alsine minima, flore fugaci. *Raij. suppl.* 501.

Alsine pusilla graminea, flore tetrapetalo. *Tourn. inst.* 243.

Alsine pusilla, folio capillaceo, flosculo albo. *Boerh. hort. lugd.* 209.

Ad *Berghem* in collo propè *D. De Roovere*, ad murum supra portam canalis, etc. *Folia basi connata, linearia, superiora fasciculata.*

68. *RADIOLA*. Calix tetraphyllus, corolla tetrapetala; capsula globosa, quadrivalvis, octolocularis; semina solitaria.

184. *R. LINOIDES*. Foliis oppositis, caule dichotomo. *Linn. syst. nat.* 225; *Fl. danic. tab.* 178.

Linum tetrapetalon, caule ramosissimo dichotomo; *Hall. hist.* 840.

Polygonum minimum sive millegrana minima. *Bauh. pin.* 282; *Moris. hist.* 2, fol. 693,

*Radiola vulgaris serpillifolia.* *Raij. angl.* 3, *fol.* 161, *tab.* 15, *fig.* 3.

*Millegrana minima.* *Lobel, kruyd-b.* *fol.* 506.

*Knawel folio alsines glabro, flosculis plurimis.* *Boerh. hort. lugd.*, 93, *p.* 2.

Belgicè : *Duysend-zaed*; gallicè : *Millegraine.*

In agris inter *Stalle* et *Vorst*, propè den *Spytigen Duyvel.* *Annua.*



---

## CLASSIS QUINTA.

---

### PENTANDRIA.

---

#### MONOGYNIA.

69. *MYOSOTIS*. Corolla hypocrateriformis, quinquefida, emarginata, fauce clausâ squamulis fornicatis; nuces quatuor imperforatæ.
185. *M. PALUSTRIS*. Seminibus lævibus, calicibus obovatis, obtusis, glabris, corollæ tubum æquantibus, foliis lanceolatis. *Linn. syst. veget.* 315, n. 1.  
*Scorpiurus radice longâ, fibrosâ, perenni. Hall. hist. n. 591.*  
*Echium scorpioïdes palustre. Bauh. pin. 254.*  
*Heliotropium minus, angustifolium, palustre seu glabrum. Boerh. hort. lugd. 191.*  
*Scorpiurus palustris, perennis, viridioribus foliis. Moris. hist. 3, fol. 451, tab. 3, fig. 4.*  
*Lithospermum palustre minus, flore cæruleo. Tourn. inst. 137.*  
*Myosotis scorpioïdes partim repens, partim erecta. Lobel, kruyd-b. 546.*  
 Belgicè : *Water-scorpioen-kruyd.*  
 Juxta aquas *Etterbeek, Elsen, etc.* Perennis, julio florens.
186. *M. ARVENSIS*. Seminibus lævibus, calicibus ovalibus, acuminatis, hirsutissimis, tubo corollæ longioribus, foliis ovato-lanceolatis. *Linn. syst. veget.* 315, n. 2; *Fl. dan. tab. 58.*  
*Scorpiurus annuus, radice exigua. Hall. hist. 590.*  
*Alsine myosotis. Lobel, kruyd-b. 546.*  
*Scorpioïdes tertium. Dodon. kruyd-b., fol. 96.*  
*Echium scorpioïdes arvense. Bauh. pin. 254.*  
*Heliotropium minus, angustifolium, arvense, seu hirsutum. Boerh. hort. lugd. 190.*  
*Lithospermum arvense minus. Tourn. inst. 137.*

*Scorpiurus annuus*, arvensis, hirsutus, cæruleus. *Morris. hist.* 3, *fol.* 450, *tab.* 3, *fig.* 3.

Belgicè : *Scorpioen-kruyd*; gallicè : *Oreille de Souris*.  
In pratis campisque communis. Annua, maio florens.

70. **LITHOSPERMUM.** Corolla infundibuliformis, tubo longo, gracili, fauce perforatâ, nudâ; calix quinquepartitus, nuces quatuor lapideæ.

187. *L. OFFICINALE.* Seminibus lævibus, corollis vix calicem superantibus, foliis lanceolatis. *Linn. sp. pl.* 132, *n.* 1; *Scop. fl. carn. sp.* 186; *Blakw. herb. tab.* 436.

*Lithospermum* caule erecto, ramosissimo, floribus calicem vix superantibus. *Hall. hist.*, *n.* 595.

*Lithospermum* minus. *Dodon. kruyd-b.* 113; *Lobel, kruyd-b.* 542; *Matthiol. in Diosc.* 310; *Dalech. hist.* 2, *fol.* 75.

*Lithospermum* majus erectum. *Bauh. pin.* 258; *Boerh. hort. lugd.* 190.

Belgicè : *Steen-zaed*, *Peêrel-kruyd*; gallicè : *Grémil*.  
in arvis *Schaerbeek*, *Etterbeek*, etc. Junio floret. Perennis.

188. *L. ARVENSE.* Seminibus rugosis, corollis vix calicibus superantibus. *Linn. sp. pl.* 132, *n.* 2; *Scop. fl. carn. sp.* 187; *Jacq. fl. austr.*, *fol.* 29.

*Heliotropium* foliis ligulatis, floribus tubulosis. *Hall. hist.*, *n.* 594.

*Lithospermum* minus alterum. *Dodon. kruyd-b.* 113.

*Lithospermum* arvense, radice rubrâ. *Bauh. pin.* 258.

Belgicè : *Kleyn Steen-zaed*; gallicè : *Petit Grémil*.  
Propè *Elmet*, *Ever*, etc. Pro varietate præcedentis habetur à *Lobelio* l. cit.

71. **ANCHUSA.** Corolla infundibuliformis, fauce clausâ squamulis fornicatis; nuces quatuor, uniloculares, basi perforatæ.

189. *A. OFFICINALIS.* Foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. *Linn. sp. pl.* 133, *n.* 1; *Scop. fl. carn. sp.* 189; *Blakw. herb. tab.* 500.

*Buglossum* foliis linguiformibus, asperis, spicis supremis gemellis. *Hall. hist.*, *n.* 599.

- Buglossa sylvestris*. *Dodon. kruid-b.*, fol. 980.  
*Buglossum erraticum asperum*, *echinoides*. *Lobel. kruid-b.* 678.  
*Echium Fuschii*. *Dalech. hist* 2, fol. 9; *Bauh. hist.* 3, fol. 581.  
*Buglossum sylvestre minus*. *Bauh. pin.* 256; *Boerh. hort. lugd.* 188.  
 Belgicè : *Wilde Osse-tonge*; gallicè : *Buglosse*.  
 In versuris *Schaerbeek*, *Elsen*, etc. Biennis.

72. **CYNOGLOSSUM.** Corolla infundibuliformis, fauce clausâ squamulis fornicatis; nuces quatuor depressæ, latere interiore tantum stylo affixæ, imperforatæ.
190. **C. OFFICINALE.** Staminibus corollâ brevioribus, foliis lato-lanceolatis, tomentosis, sessilibus. *Linn. sp. pl.* 134, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 191; *Blakw. herb. tab.* 249.  
*Cynoglossum foliis ellipticis, lanceolatis, sericeis, caule folioso*. *Halk. hist.*, n. 587.  
*Cynoglossum*. *Dodon. kruid-b.* 69, *Lobel, kruid-b.* 685.  
*Cynoglossum vulgare*. *Matthiol. in Diosc.* 379; *Dalech. hist.* 2, fol. 155.  
*Cynoglossum majus vulgare*. *Bauh. pin.* 257; *Boerh. hort. lugd.* 192, n. 1—3.  
 Belgicè : *Honds-tonge*; gallicè : *Langue de Chien*.  
 In ruderatis ubique. Biennis, augusto florens.
191. **C. OMPHALODES.** Repens, foliis radicalibus cordatis. *Linn. sp. pl.* 135, n. 6; *Scop. fl. carn. sp.* 190, tab. 3.  
*Omphalodes pumila, verna, symphiti folio*. *Tourn. inst.* 140.  
*Borrigo minima herbariorum*. *Lobel, kruid-b.* 680; *Bauh. hist.* 3, fol. 597.  
*Borrigo sempervirens*. *Dodon. kruid-b.* 979; *Dalech. hist.* 1, fol. 491.  
*Borrigo minor, verna, repens, folio lævi*. *Moris. hist.* 3, fol. 437, tab. 26, fig. 3.  
*Symphitum minus, borraginis facie*. *Bauh. pin.* 259.  
 Belgicè : *Kleyne Bernagie*; gallicè : *Petite Bourrache*.  
 In sylvulâ inter *Elegem* et *Bygaerde*. Perennis, sine martis florens. *Rarissima*.



73. SYMPHITUM. Corolla infundibuliformis, supernè ventricosa, fauce clausâ radiis fistulosis, extus sub limbo foramine hiantibus; nuces quatuor perforatæ.

192. *S. OFFICINALE*. Foliis ovato-lanceolatis, decurrentibus. *Linn. sp. pl.* 136, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 195; *Hall. hist.*, n. 600; *Blakw. herb. tab.* 252.

Symphitum magnum. *Dodon. kruid-b.* 193; *Lobel, kruid-b.* 689; *Bauh. hist.* 3, fol. 593; *Dalech. hist.* 1, fol. 939.

Symphitum Consolida major. *Bauh. pin.* 259; *Moris. hist.* 3, fol. 444.

Consolida major. *Matthiol. in Diosc.* 323.

Belgicè: *Wael-wortel*, *Smeêr-wortel*; gallicè: *Grande Consoude*.

Ad ripas aquarum ubiquè. Julio floret, perennis.

74. PULMONARIA. Corolla infundibuliformis, fauce perviâ, calix prismatico-pentagonus.

193. *P. OFFICINALIS*. Foliis radicalibus ovato-cordatis, scabris. *Linn. sp. pl.* 135, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 194; *Hall. hist.*, n. 597; *Blakw. herb. tab.* 376.

Pulmonaria maculosa. *Dodon. kruid-b.* 195; *Lobel, kruid-b.* 692.

Pulmonaria vulgaris, maculoso folio. *Clus. hist. rarior.* 169, p. 2.

Pulmonaria vulgaris, latifolia, flore albo. *Tourn. inst.* 136; *Boerh. hort. lugd.* 193, n. 1, 4.

Belgicè: *Longer-kruid*; gallicè: *Pulmonaire*.

In sylvæ Soniæ locis humidis, propè *Rood-klooster*, etc. Non communis. Perennis, fine aprilis florens.

75. ECHIUM. Corolla irregularis, fauce nudâ; stamina inæqualia, nuces quatuor scabræ, imperforatæ.

194. *E. VULGARE*. Caule tuberculato-hispido, foliis caulinis lanceolatis, hispidis, floribus spicatis, lateralibus. *Linn. sp. pl.* 139, n. 3; *Scop. fl. carn. sp.* 200; *Clus. hist. rar.* 143, p. 2; *Blakw. herb. tab.* 299;

*Bauh. pin.* 254; *Boerh. hort. lugd.* 194; *Moris. hist.* 3, fol. 440.

*Echium* foliis lingulatis, hispidis, calicibus pungentibus, hirsutis. *Hall. hist.*, n. 603.

*Echium. Dodon. kruyd-b.* 984; *Lobel, kruyd-b.* 684; *Dalech. hist.* 2, fol. 8; *Matthiol. in Diosc.*, fol. 331.

Belgicè : *Slangen-hoofd*; gallice : *Vipérine*.

In Mœniis, juxta vias, etc. Biennis, per integram æstatem florens.

76. PRIMULA. Involucrum umbellulæ, corollæ tubus cylindricus, ore patulo; capsula unilocularis, teres, dentibus decem dehiscens, polysperma.

195. *P. OFFICINALIS*. Foliis ovalibus, dentatis, rugosis, scapis multifloris, floribus omnibus nutantibus, corollarum limbo concavo *Linn. syst. veget.* 326, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 205; *Jacq. Miscell. aust.* 159.

*Primula pratensis. Lobel, kruyd-b.* 669.

*Primula veris* flavo flore, elatior. *Clus. hist. rar.* 301.

*Primula veris umbellata*, odorata, *pratensis. Boerh. hort. lugd.* 199.

*Primula* foliis rugosis, dentatis, hirsutis, scapis multifloris. *Hall. hist.*, n. 610.

Belgicè : *Sleutel-bloem*; gallicè : *Primérole*.

In pratis humidis ubiquè.

196. *P. ELATIOR*. Foliis oblongis, crenato-dentatis, rugosis, scapis multifloris, floribus exterioribus nutantibus, corollarum limbo plano. *Linn. syst. veget.* 326, n. 2; *Fl. dan. tab.* 434; *Hall. hist.* 609.

*Primula veris* pallido flore, elatior. *Clus. hist. rar.* 301.

*Primula pratensis*, inodora, luteo pallido flore. *Lobel, kruyd-b.* 670.

*Primula veris major* sive herba Sti.-Petri. *Dodon., kruyd-b.* 214.

*Primula veris caulifera*, pallido flore, inodoro. *Bauh. hist.* 3, fol. 496.

Belgicè : *St.-Peeters-bloem*; gallicè : *Herbe à la paralysie*.

In pratis *Heembeek*, sed precedenti rarior. Maio floret.

197. *P. ACAULIS*. Foliis obovatis, subdentatis, rugosis, pedunculis radicalibus unifloris. *Linn. syst. veget.* 326, n. 3; *Fl. dan. tab.* 104; *Jacq. Misc. austr.* 158.

*Primula sylvestris. Scop. fl. carn. sp. 204.*

*Primula foliis hirsutis, rugosis, dentatis, scapo unifloro. Hall. hist., n. 608.*

*Sylvarum primula. Lobel, kruyd-b. 670.*

*Primula veris minor. Dodon. kruyd-b. 215.*

*Primula veris pallido flore, humilis. Clus. hist. rar. 302.*

Belgicè : *Bosch-sleutel-bloem*; gallicè : *Braies de cocu*.

Vidi aliquot specimina hujus, juxta sepimentum prati propè *Mootebeek*, non procul à villâ *Deraed*. Flores tunc non erant aperti, et quùm mihi non licebat quovis momento illuc recurrere, post aliquot tempus non amplius inveni. *Rarior in sylvestribus, in hortis verò ubique occurrit.*

77. **MENYANTHES.** Corolla hirsuta, nectaria quinque ad basin germinis; stigma bilobum, capsula unilocularis.

198. *M. NYMPHOÏDES.* Foliis cordatis, integerrimis, corollæ laciniis margine alatis, inciso-dentatis. *Linn. sp. pl. 145, n. 1; Fl. danic. tab. 339.*

*Nymphoïdes aquis innatans. Tourn. inst. 153; Boerh. hort. lugd. 282.*

*Nymphæa lutea minor, septentrionalium. Lobel, kruyd-b. 704.*

*Nymphæa lutea minor. Dodon. kruyd-b. 928.*

*Nymphæa lutea minor, flore simbricato. Bauh. pin. 194; Bauh. hist. 3, fol. 772.*

Belgicè : *Kleyne Geële Plompen*; gallicè : *Petit Nenuphar*.

Ad *Wemmel* in piscinâ marchionis, propè *Elegem*, etc. Junio floret.

199. *M. TRIFOLIATA.* Foliis ternatis, corollæ laciniis margine integris, supernè barbatis. *Linn. sp. pl. 145, n. 3; Scop. fl. carn. sp. 212; Hall. hist., n. 633.*

*Trifolium aquaticum aut fibrinum. Dodon. kruyd-b. 921.*

*Trifolium paludosum. Lobel, kruyd-b. 36, p. 2.*

*Trifolium palustre. Bauh. pin. 327; Blakw. herb. tab. 474.*

*Menyanthes palustre, latifolium, triphyllon. Tourn. inst. 117.*

Belgicè : *Bokx-boonen, Water-klaivers*; gallicè : *Trefle d'eau.*

In paludosis *Berghem, Haren, etc.* Perennis, fine julii florens.

78. **HOTTONIA:** Corolla hypocrateriformis, stamina tubo corollae imposita; stigma globosum, capsula unilocularis.

200. *H. PALUSTRIS.* Pedunculis verticillato-multifidis. *Linn. syst. veget.* 329, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 213; *Fl. dan. tab.* 487.

*Hottonia* florum verticillis spicatis. *Hall. hist.* 632.

*Viola* aquatilis. *Dodon. kruid-b., fol.* 926.

*Myriophyllum* equisetifolium fluviatile. *Lobel, kruid-b.* 966.

*Hottonia.* *Boerh. hort. lugd., fol.* 207.

*Millefolium* aquaticum, seu *viola* aquatica, caule nudo.

*Bauh. pin.* 141.

*Myriophyllum* equisetifolium. *Dalech. hist.* 1, fol. 891.

*Myriophyllum* alterum. *Matthiol. in Diosc., fol.* 374.

Belgicè : *Water-violieren*; gallicè : *Giroflée d'eau.*

In fossis pratorum juxta ambulacrum *Laken, etc.*

Junio floret. Perennis.

79. **LYSIMACHIA.** Corolla rotata, capsula globosa, mucronata, unilocularis, quinquevalvis, polysperma.

201. *L. VULGARIS.* Paniculata, racemis terminalibus. *Linn. sp. pl.* 146, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 214; *Blakw. herb. tab.* 278.

*Lysimachia* foliis ovato-lanceolatis, spicis paniculatis. *Hall. hist., n.* 630.

*Lysimachia* lutea communis. *Clus. hist. rar.* 114.

*Lysimachia* lutea. *Lobel, kruid-b., fol.* 416; *Bauh. hist.* 3, fol. 901.

*Lysimachia.* *Matthiol. in Diosc.* 320; *Dalech., hist.* 1, fol. 925.

*Lysimachium.* *Dodon. kruid-b., fol.* 114.

*Lysimachia* lutea major. *Bauh. pin.* 245; *Boerh. hort. lugd.* 202.

Belgicè : *Wiederik*; gallicè : *Lysimachie commune.*

In sylvâ *Diligem, etc.* Julio floret. Perennis.

202. *L. NUMMULARIA.* Foliis subcordatis, floribus soli-

tariis, caule repente. *Linn. sp. pl.* 148; *Scop. fl. carn. sp.* 216; *Blakw. herb. tab.* 542.

*Lysimachia* caule prostrato, foliis subrotundis, petiolis alaribus unifloris. *Hall. hist.*, n. 629.

*Nummularia* lutea major. *Bauh. pin.* 309. *Moris. hist.* 2, fol. 567; *Boerh. hort. lugd.*, fol. 203.

*Nummularia*. *Dodon.*, *kruyd-b.* 949; *Lobel, kruyd-b.* 558; *Matthiol. in diosc.* 335; *Dalech. hist.* 1, fol. 928.

*Lysimachia* humifusa, folio rotundiore, flore luteo. *Tourn. inst.* 141.

Belgicè : *Penning-kruyd*; gallicè : *Nummulaire*.

Juxta fossas pratorum humidorum, inque alnetis, etc.

### 30 ANAGALLIS. Corolla rotata, capsula circumscissa, unilocularis, polysperma.

203. *A. ARVENSIS*. Foliis ovato-lanceolatis, caule procumbente, calicis segmentis lanceolatis. *Linn. sp. pl.* 148, n. 1; *Blakw. herb. tab.* 43; *Hall. hist.* n. 625.

*Anagallis* phænicea. *Scop. fl. carn. sp.* 217.

*Anagallis* phænicea mas. *Lobel, kruyd-b.* 549; *Bauh. hist.* 3, fol. 369.

*Anagallis* mas. *Dodon. kruyd-b.* 39; *Matthiol. in Diosc. fol.* 218; *Dalech. hist.* 2, fol. 131.

*Anagallis* phæniceo flore. *Bauh. pin.* 252.

Belgicè : *Guychel-heyl-manneken*; gallicè : *Morgeline mâle*.

In arvis hortisque communis.

204. *A. CÆRULEA*. Foliis ovato-lanceolatis, caule procumbente, calicis segmentis subulatis. *Linn. syst. veget.* 332, n. 2; *Hall. hist.*, n. 626; *Blakw. herb. tab.* 274.

*Anagallis* femina cærulæa. *Lobel, kruyd-b.* 549; *Bauh. hist.* 3, fol. 369.

*Anagallis* purpurascente flore. *Clus. hist. rar.*, fol. 183, p. 2.

*Anagallis* cæruleo flore. *Bauh. pin.* 252; *Boerh. hort. lugd.* 204.

*Anagallis* femina. *Dodon.*, *kruyd-b.* 39; *Matthiol. in Diosc.* 218; *Dalech, hist.* 2, fol. 131.

Belgicè : *Guychel-heyl-wyfken*; gallicè : *Morgeline femelle*.

In arvis inter *Itterbeek* et *Neérpede*. Rarior. Pro varietate precedentis à *Scopolio* habetur.

81. CONVOLVULUS. Corolla campanulata, plicata; nectarium coronâ germen basi ambiens; stigmata duo, capsula bi-aut-trilocularis, loculis dispersis.

205. *C. ARVENSIS*. Foliis sagittatis, utrinquè acutis, pedunculis subunifloris. *Linn. sp. pl.* 153, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 219; *Gouan, hort. monsp.* 93.

Convolvulus foliis sagittatis, latescentibus, petiolis unifloris, stipulis remotis, subulatis. *Hall. hist.*, n. 664.

Convolvulus minor purpureus. *Lobel, kruid-b.* 738.

Smilax lævis minor. *Dodon. kruid-b.*, fol. 644.

Convolvulus minor arvensis. *Bauh. pin.* 294; *Boerha. hort. lugd.* 245.

Convolvulus minor. *Clus. hist. rar.* 50, p. 2, *Bauh. hist.* 2, fol. 157.

Helxine cissampelos. *Matthiol. in Diosc.* 335; *Dalech. hist.* 2; fol. 307.

Belgicè : *Akker-winde*; gallicè : *Petit Liseron*.

In arvis, ad margines pratorum, etc. Julio floret; perennis.

206. *C. SEPIMUM*. Foliis sagittatis, posteriùs truncatis, pedunculis tetragonis, unifloris. *Linn. sp. pl.* 153, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 220; *Blakw. herb. tab.* 38; *Gouan, hort. monsp.* 93.

Smilax lævis major. *Dodon. kruid-b.*, fol. 643; *Lobel, kruid-b.*, fol. 738.

Smilax lævis. *Matthiol. in Diosc.* 384; *Dalech. hist.* 2, fol. 306.

Convolvulus foliis sagittatis, hamis emarginatis, angulosis, petiolis unifloris, stipulis cordatis, maximis. *Hall. hist.*, n. 663.

Convolvulus major albus. *Bauh. pin.* 294; *Bauh. hist.* 2, fol. 154.

Belgicè : *Haeg-winde*; gallicè : *Grand Liseron*.

In sepibus ubiquè communis.

82. CAMPANULA. Corolla campanulata, filamenta basi dilatata, fornicata; stigma triplex, capsula infera poris lateralibus dehiscens, trilocularis.

207. *C. ROTUNDIFOLIA*. Foliis radicalibus subrotundis;

- acuminātis, caulinis linearibus. *Linn. sp. pl.* 163, n. 3; *Scop. fl. carn. sp.* 124; *Gouan, hort. monsp.* 96.
- Campanula foliis serratis, radicalibus cordatis, caulinis lanceolatis. Hall. hist., n.* 701.
- Campanula sylvestris minima. Dodon. kruid-b.* 249.
- Campanula minor, alpina, rotundioribus imis foliis. Clus. hist. rar.* 173, p. 2.
- Campanula minor rotundifolia. Lobel, kruid-b.* 403; *Bauh. pin.* 93; *Dalech. hist.* 1, fol. 715.
- Campanula parva Anguillaræ cantabrica. Bauh. hist.* 2, fol. 796.
- Belgicè : *Kleyne Klokskens*; gallicè : *Clochette*.  
Ad margines *Laken, Strombeek, etc.* Julio floret.
208. *C. PATULA*. Foliis strictis, radicalibus lanceolato-ovalibus, paniculâ patulâ. *Linn. sp. pl.* 163, n. 4; *Scop. fl. carn. sp.* 227.
- Campanula caule brachiato, foliis lanceolato-linearibus, glabris, petiolis paucifloris, nudis. Hall. hist., n.* 698.
- Campanula minor rotundifolia, flore in summis caulibus. Bauh. pin.* 93.
- Campanula pratensis. Dalech. hist.* 1, fol. 713.
- Belgicè : *Wye-klokskens*; gallicè : *Campanette des prés*.  
Ad margines arborum *Schaerbeek, etc.*, non æque ac *precedens communis*.
209. *C. RAPUNCULUS*. Foliis undulatis, radicalibus lanceolato-ovalibus, paniculâ coarctatâ. *Linn. sp. pl.* 164, n. 5; *Scop. fl. carn. sp.* 231; *Gouan, hort. monsp.* 96.
- Campanula foliis ellipticis, serratis, subhirsutis, caule aspero, floribus paniculatis. Hall. hist., n.* 699.
- Rapuntium. Dodon. kruid-b., fol.* 245.
- Rapuntium parvum. Lobel, kruid-b., fol.* 403.
- Rapunculus esculentus. Bauh. pin.* 92.
- Rapunculus vulgaris campanulatus. Bauh. hist.* 2, fol. 795.
- Campanula radice esculentâ, flore cæruleo. Boerh. hort. lugd.* 248.
- Belgicè : *Kleyne Raephens*; gallicè : *Raiponce*.  
Ad *Berghem, Ganshoren, etc.*, sub sepibus.
210. *C. TRACHELIUM*. Caule angulato, foliis petiolatis, calicibus ciliatis, pedunculis trifidis. *Linn. sp. pl.*

166, n. 18; *Scop. fl. carn. sp.* 234; *Gouan, hort. monsp.* 97.

*Campanula* foliis cordato-lanceolatis, acutè serratis, hirsutis, petiolis ex alis paucifloris, calicibus hispidis. *Hall. hist.*, n. 690.

*Trachelium* vulgare. *Clus. hist. rar.* 170, p. 2.

*Cervicaria*. *Lobel, kruyd-b.*, fol. 400.

*Cervicaria* major. *Dodon. kruyd-b.*, fol. 244.

*Campanula* vulgatio, foliis urticæ; vel major et asperior. *Bauh. pin.* 94; *Moris. hist.* 2, fol. 459; *Bauh. hist.* 2, fol. 805; *Boerh. hort. lugd.* 249.

*Trachelium*. *Dalech. hist.* 1, fol. 718.

Belgicè : *Hals-kruyd*; gallicè : *Gant de Notre-Dame*.  
In sylvis communis; Augusto florens.

211. *C. GLOMERATA*. Caule angulato, simplici, floribus sessilibus, capitulo terminali. *Linn. sp. pl.* 166, n. 19; *Scop. fl. carn. sp.* 235; *Gouan, hort. monsp.* 97.

*Campanula* caule simplici, aspero, foliis amplexicaulibus, floribus capitatis. *Hall. hist.*, n. 685.

*Campanula* pratensis, flore glomerato. *Bauh. pin.* 94; *Boerh. hort. lugd.* 249; *Moris. hist.* 2, fol. 461.

*Cervicaria* minor. *Dodon. kruyd-b.*, fol. 246.

*Trachelium* minus. *Lobel, kruyd-b.* 400; *Clus. hist. rar.* 171, p. 2; *Dalech. hist.* 1, fol. 718.

Belgicè : *Kleyen Hals-kruyd*; gallicè : *Gantelée*.

Ad margines *Schaerbeek, Laken, etc.*

212. *C. SPECULUM*. Caule ramosissimo, diffuso, foliis oblongis, subcrenatis, floribus solitariis, capsulis prismaticis. *Linn. sp. pl.* 168, n. 22; *Scop. fl. carn. sp.* 237.

*Campanula* caule procumbente, fructubus prismaticis, floribus rotatis, longissimè petiolatis, solitariis. *Hall. hist.*, n. 703.

*Campanula* arvensis minima. *Dodon. kruyd-b.* 251; *Moris. hist.* 2, fol. 457, tab. 2, fig. 21.

*Campanula* arvensis erecta. *Bauh. pin.* 215; *Boerh. hort. lugd.* 248.

*Avicularia* sylvii quibusdam. *Bauh. hist.* 2, fol. 800.

Belgicè : *Vrouwen-spiegel*.

In arvis *Ten-Noode, Etterbeek, etc., etc.*

213. *C. HYBRIDA*. Caule basi subramoso, stricto, foliis oblongis, crenatis, calicibus aggregatis corollâ longioribus, capsulis prismaticis. *Linn. syst. veget.* 252, n. 67.



*Campanula caule erecto, fructibus prismaticis, floribus rotatis, sessilibus, congestis. Hall. hist., n. 704.*

*Campanula arvensis minima erecta. Moris. hist. 2, fol. 457, tab. 2, fig. 22.*

*Onobrychis altera Belgarum et Dodonei. Lobel, kruyd-b. 504.*

*Onobrychis prima Dodonei. Dalech. hist. 1, fol. 412.*

*Speculum veneris minus. Raij. hist., n. 743.*

Belgicè : *Kleynen Vrouwen-spiegel.*

In arvis propè *Stokkel, Roodebeek, etc.* Annuæ, julio florens. Non communis.

83. **PHYTEUMA.** Corolla rotata, quinquepartita, laciniis linearibus; stigma bi-aut-trifidum; capsula infera, bi-aut-trilocularis, foramine laterali.

214. *P. SPICATA.* Spicâ conicâ, bracteis linearibus, longissimis, capsulis bilocularibus, foliis radicalibus cordatis. *Linn. sp. pl. 171, n. 4; Gouan, hort. monsp. 97.*

*Rapunculus foliis radicalibus cordatis, tubis bicornibus, revolutis. Hall. hist., n. 684.*

*Rapunculus spicatus. Scop. fl. carn. sp. 238.*

*Rapunculus alopecuroides, longiore spicâ. Clus. hist. rar. 171, p. 2.*

*Rapunculum alopecuron. Dodon. kruyd-b. 246.*

*Rapuntium majus, alopecuri comoso flore. Lobel, kruyd-b. 403.*

*Rapuntium majus. Dalech. hist. 1, fol. 546.*

*Rapunculus corniculatus seu spicatus. Moris. hist. 2, fol. 463, tab. 5, fig. 6.*

Belgicè : *Groote Raponcelen*; gallicè : *Grande Rai-ponce.*

Ad margines in locis umbrosis, sub sepibus, etc.

84. **LONICERA.** Corolla monopetala, tubulosa, irregularis; bacca bi-aut-trilocularis, polysperma, infera.

215. *L. CAPRIFOLIUM.* Caule volubili, floribus verticillatis, terminalibus, ringentibus, sessilibus, foliis deciduis, summis connato-perfoliatis. *Linn. sp. pl. 173, n. 1; Scop. fl. carn. sp. 242; Jacq. fl. austr. tab. 357.*

*Caprifolium italicum.* *Dodon. kruyd-b.* 676; *Boerh. hort. lugd.* 226.

*Caprifolium perfoliatum.* *Dalech. hist.* 2, fol. 310; *Bauh. pin.* 302.

*Periclymenum perfoliatum calidarum regionum.* *Lobel, kruyd-b.* 769.

Belgicè : *Memmekens-kruyd*, *Geyten-blad*; gallicè : *Chevrefeuille.*

Inter fruteta propè *Scheut*, *Berghem*, *St.-Peeters-Woluwe*, etc. Junio florens.

85. VERBASCUM. Corolla rotata, subæqualis, capsula bilocularis, bivalvis, polysperma.

216. *V. Thapsus.* Foliis decurrentibus, utrinquè tomentosis, caule simplici, stigmatè globoso. *Linn. sp. pl.* 177, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 247; *Hall. hist.*, n. 581; *Blakw. herb. tab.* 3.

*Verbascum mas latifolium*, foliis incanis, floribus luteis arcuè caulibus adhærentibus. *Moris. hist.* 2, fol. 485, tab. 9; fig. 1.

*Verbascum mas latifolium luteum.* *Bauh. pin.* 239.

*Verbascum latius.* *Dodon. kruyd-b.*, fol. 208.

*Verbascum aut Phlomos vulgaris mas Dioscoridis.* *Lobel, kruyd-b.* 663.

*Verbascum.* *Dalech. hist.* 2, fol. 189; *Matthiol. in Diosc.*, fol. 368.

Belgicè : *Wit Wollc-kruyd*; gallicè : *Bouillon blanc.*

Ad margines *Schaerbeek*, *Elmet*, *Ever*, etc. Junio florèt; biennis.

217. *V. Lychneitis.* Foliis cuneiformi-oblongis. *Linn. sp. pl.* 177, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 248; *Matthiol. in Diosc.*, fol. 368; *Fl. danic. tab.* 586.

*Verbascum spicâ ramosâ*, foliis ovato-lanceolatis, inferioribus petiolatis. *Hall. hist.*, n. 583.

*Verbascum Lychneitis*, flore albo parvo. *Bauh. pin.* 240.

*Verbascum femina Lobelii.* *Dalech. hist.* 2, fol. 190.

*Phlomos mas alter sive Verbascum Lychneitis Matthioli.* *Lobel, kruyd-b.* 663.

Belgicè : *Wolle-kruyd-Wyfsken*; gallicè : *Bouillon femelle.*

In mœniis pone den *Dikken-Toren*, ad *Schaerbeek*, *Ten-Noode*, etc., etc. Biennis, junio florens.

218. *V. Nigrum.* Foliis cordato-oblongis, petiolatis. *Linn.*

*sp. pl.* 178, n. 3; *Scop. fl. carn. sp.* 249; *Dodon. kruid-b.*, fol. 209.

*Verbascum* foliis imis petiolatis, cordato-lanceolatis, superioribus sessilibus, ovatis, acutis. *Hall. hist.*, n. 584.

*Verbascum nigrum*, flore ex lateo purpurascente. *Bauh. pin.* 240.

*Verbascum nigrum* flore parvo, apicibus purpurascens. *Bauh. hist.* 3, fol. 172.

*Verbascum tertium*. *Matthiol. in Diosc.* 368; *Dalech. hist.* 2, fol. 190.

Belgicè : *Swart Wolle-kruid*; gallicè : *Bouillon noir*.

Ad margines *Schaerbeek*, in *de Groen-straet*, ad *Elmet*, *Uccle*, etc. Perennis initio augusti florens.

219. *V. BLATTARIA*. Foliis amplexicaulibus, oblongis, glabris, pedunculis solitariis. *Linn. sp. pl.* 178, n. 4; *Scop. fl. carn. sp.* 251.

*Verbascum* spicâ rarissimâ, foliis glabris, serratis, cordato-lanceolatis, imis semi-pinnatis, superioribus amplexicaulibus. *Hall. hist.*, n. 585.

*Blattaria*. *Dodon. kruid-b.* 211; *Dalech. hist.* 2, fol. 195; *Matthiol. in Diosc.* 369.

*Blattaria* Plinii. *Lobel, kruid-b.* fol. 667.

*Blattaria lutea*, folio longè laciniato. *Bauh. pin.* 240.

Belgicè : *Motten-kruid*; gallicè : *Herbe aux mittes*.

In hortis arvisque *Molebeek*, *Anderlegt*, etc. Biennis.

86. *HYOSCIAMUS*. Corolla infundibuliformis, obtusa, irregularis; stamina inclinata, capsula operculata, bilocularis; semina plura reniformia.

220. *H. NIGER*. Foliis amplexicaulibus, sinuatis, floribus sessilibus. *Linn. sp. pl.* 179, n. 1; *Hall. hist.*, n. 580; *Scop. fl. carn. sp.* 253; *Lobel, kruid-b.*, fol. 328; *Dodon. kruid-b.* 738; *Blakw. herb.*, tab. 550.

*Hyoscyamus niger vulgaris*. *Clus. hist. rar.* 83, p. 2.

*Hyoscyamus vulgaris vel niger*. *Bauh. pin.* 169; *Moris. hist.* 2, fol. 494; *Boerh. hort. lugd.* 229.

*Hyoscyamus vulgaris*. *Bauh. hist.* 3, fol. 627.

Belgicè : *Swart Rilsen-kruid*; gallicè : *Jusquiame noire*.

Ad *Schaerbeek*, *Laken*, etc., etc. Biennis, sine junii florens.

87. **DATURA.** Corolla infundibuliformis, plicata, calix tubulosus, angulosus, cum corollâ deciduus; capsula quadrivalvis.

221. *D. STRAMONIUM.* Pericarpis spinosis, erectis, ovatis, foliis ovatis, angulatis, glabris. *Linn. sp. pl.* 179, n. 1; *Blakw. herb. tab.* 313.

Stramonium foliis angulosis, fructu erecto, muricato, calice pentagono. *Hall. hist.*, n. 586.

Stramonium fœtidum. *Scop. fl. carn. sp.* 152.

Stramonium peregrinum. *Lobel, kruyd-b. fol.* 321.

Stramonium. *Dodon. kruyd-b.* 752; *Matthiol. in Diosc.* 352; *Dalech. hist.* 1, fol. 534.

Stramonium fructu spinoso rotundo. *Tourn. inst.* 118; *Boerh. hort. lugd.* 261.

Belgicè : *Doörn-appel*; gallicè : *Pomme épineuse.*

Propè *Tres-Fontes* juxta pratum, ad *Schaerbeek*, *Elmet*, etc. Annuæ.

88. **ATROPA.** Corolla campanulata, stamina distantia, bacca globosa, bilocularis.

222. *A. BELLADONA.* Caule herbaceo, foliis ovatis integris. *Linn. sp. pl.* 181, n. 1; *Blakw. herb. tab.* 564; *Jacq. fl. austr. tab.* 309.

Belladonna caule herbaceo, brachiato, foliis ovato-lanceolatis, integerrimis. *Hall. hist.* 579.

Belladonna trichotoma. *Scop. fl. carn. sp.* 255.

Solanum lethale. *Dodon. kruyd-b.* 747; *Clus. hist. rar.* 86, p. 2.

Solanum sumniferum et lethale. *Lobel, kruyd-b.* 319.

Solanum melanocerasos. *Bauh. pin.* 166.

Belladonna majoribus foliis et floribus. *Tourn. inst.* 77.

Belgicè : *Dulle-beziën*; gallicè : *Belle-Dame.*

Propè *Boschfort*, ad sylvæ margines. Perennis, julio florens.

89. **SOLANUM.** Corolla rotata, antheræ subcoalitæ, poro gemino dehiscentes, bacca bilocularis.

223. *S. TUBEROSUM.* Caule inermi herbaceo, foliis pinnatis, integerrimis, pedunculis subdivisis. *Linn. sp.*

*pl.* 185, *n.* 11; *Gouan, hort. monsp.* 109; *Blakw. herb. tab.* 523, 587.

*Solanum tuberosum esculentum.* *Bauh. pin.* 167, *prodrom.* 89, *tab.* 89; *Boerh. hort. lugd.* 67, *p.* 2.

*Papas americanum.* *Bauh. hist.* 3, *fol.* 621.

Belgicè : *Aerd-appels*; gallicè : *Pomme de terre.*

In hortis arvisque.

224. *S. NIGRUM.* Caule inermi, herbaceo, foliis ovatis, dentato-angulatis, racemis distichis, nutantibus. *Linn. sp. pl.* 186, *n.* 12; *Scop. carn. sp.* 258; *Hall. hist.*, *n.* 576; *Blakw. herb. tab.* 107.

*Solanum hortense.* *Dodon. kruid-b.* 743; *Lobel, kruid-boek*, 318; *Matthiol. in Diosc.*, *fol.* 350; *Dalech. hist.* 1, *fol.* 505.

*Solanum Afficinarum.* *Bauh. pin.* 166; *Boerh. hort. lugd.* 67, *n.* 4—8.

Belgicè : *Nagt-schaede*; gallicè : *Morelle.*

Sub sepibus ubiquè. Annuæ, augusto florens. *Variat foliis integerrimis, angulatis, glabris, ramisque subvillosis.*

225. *S. DULCAMARA.* Caule inermi frutescente, flexuoso: foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. *Linn. sp. pl.* 185, *n.* 5; *Scop. fl. carn. sp.* 257; *Blakw. herb. tab.* 34.

*Solanum caule flexuoso frutescente, foliis cordatis et tripartitis.* *Hall. hist.*, *n.* 575.

*Dulcamara.* *Dodon. kruid-b.*, *fol.* 660.

*Amaradulcis.* *Lobel, kruid-b.*, *fol.* 323.

*Solanum scandens sive Dulcamara.* *Bauh. pin.* 167; *Boerh. hort. lugd.* 67, *n.* 1—3.

*Dulcamara vel Vitis sylvestris.* *Dalech. hist.* 2, *fol.* 298.

*Vitis sylvestris.* *Matthiol. in Diosc.*, *fol.* 407.

*Glycypheros sive Amara dulcis.* *Bauh. hist.* 2, *fol.* 109.

Belgicè : *Alfranke, Bitter-zoet*; gallicè : *Douce Amère.*

Juxta aquas in locis opacis. Julio floret.

90. RHAMNUS. Calix tubulosus, squamis stamina munientibus; corolla nulla, drupa clausa ossiculis quatuor.

226. *R. FRANGULA.* Inermis, floribus monogynis, hermaphroditis, foliis integerrimis. *Linn. sp. pl.* 193, *n.* 3; *Scop. carn. sp.* 263; *Blakw. herb. tab.* 272.

*Rhamnus inermis*, foliis ovato-lanceolatis, integris, floribus androgynis, quinquesidis. *Hall. hist.*, n. 821.  
*Frangula. Dodon. kruid-b.* 1228; *Lobel, kruid-b.* 204, p. 2.

*Alnus nigra baccifera. Dalech. hist.* 1, fol. 82; *Bauh. pin.* 428, *Bauh. hist.* 1, fol. 560.

Belgicè: *Sporken-hout*, *Pyl-hout*; gallicè: *Bourdaine*,  
In sylvis omnibus. Mense aprili floret.

91. **EVONYMUS.** Corolla pentapetala, capsula colorata, pentagona, quinquelocularis, quinquevalvis, theca antrosa, semina calyptrata.

227. *E. EUROPEUS.* Floribus plurimis quadrifidis, foliis sessilibus. *Linn. sp. pl.* 19; *Bulliard, herb. franc. tab.* 135.

*Evonymus* foliis ovato-lanceolatis, serratis, ramis teragonis. *Gouan, hort. monsp.* 113; *Hall. hist.*, n. 829.

*Evonymus vulgaris. Scop. fl. carn. sp.* 267.

*Evonymus. Dodon. kruid-b.*, fol. 1227.

*Evonymus secundus. Clus. hist. rar.*, fol. 57.

*Evonymus Theophrasti. Lobel, kruid-b.*, fol. 199, p. 2.

*Fusoria. Dalech. hist.* 1, fol. 229.

Belgicè: *Papen-hout*; gallicè: *Fusain*.

In sepibus sylvisque. Aprili floret.

92. **VIOLA.** Calix pentaphyllus, supra basin corollæ dehiscens; corolla pentapetala, irregularis, posterius cornuta; antheræ cohærentes, capsula trivalvis, unilocularis.

228. *V. ODORATA.* Acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus. *Linn. sp. pl.* 934; *Gouan, hort. monsp.* 467, n. 8; *Scop. fl. carn. sp.* 1097; *Hall. hist.*, n. 558; *Blakw. herb. tab.* 55.

*Viola nigra seu purpurea. Dodon. kruid-b.*, fol. 231, *Dalech. hist.* 1, fol. 688.

*Viola martia precox purpurea et alba. Lobel, kruid-b.*, fol. 724; *Bauh. pin.* 199; *Boerh. hort. lugd.* 243, n. 1—6.

*Viola purpurea. Matthiol. in Diosc.*, fol. 376.

Belgicè : *Violetten* ; gallicè : *Violette de mars*.  
In collibus et versuris.

229. *V. CANINA*. Caule adultiore adscendente, foliis oblongo-cordatis, floribus caulinis apetalis. *Linn. syst. veget.* 413, n. 12; *Scop. fl. carn. sp.* 1098; *Gouan, hort. monsp.* 467.

*Viola* caule procumbente, ramoso, foliis petiolatis, cordatis. *Hall. hist.*, n. 563.

*Viola sylvestris inodora*. *Dodon. kruid-b.*, fol. 231.

*Viola canina cærulea, inodora, sylvestris, serotina*. *Lobel, kruid-b.* 724.

*Viola martia inodora, sylvestris*. *Bauh. pin.* 199; *Boerh. hort. lugd.*, fol. 243.

Belgicè : *Wilde Violette* ; gallicè : *Violette sauvage*.

In sylvis *Dilgem, Lorbeek, etc.* Aprili floret; perennis.

230. *V. TRICOLOR*. Caule angulato, diffuso, stipulis pinnatifidis, foliis ovatis, dentatis, corollis calice glabro duplo majoribus. *Linn. syst. veget.* 413, n. 24; *Fl. dan. tab.* 623; *Hall. hist.*, n. 568; *Dodon. kruid-b.*, fol. 233; *Blakw. herb. tab.* 44.

*Viola flammea, coloria, calida*. *Lobel, kruid-b.* 726.

*Herba Trinitatis*. *Fusch. hist.*, 803.

*Viola tricolor hortensis repens*. *Bauh. pin.* 199; *Boerh. hort. lugd.* 244, n. 11—18.

*Jacea tricolor, sive Flos Trinitatis*. *Bauh. hist.* 3, fol. 547.

Belgicè : *Penseën* ; gallicè : *Pensée*.

In arvis *Diegem, Haren, Saventhem, etc.* Annua, junio florens.

231. *V. ARVENSIS*. Caule triquetro, diffuso, erecto, stipulis pinnatifidis, foliis ovato-oblongis, dentatis, corollis calice hirsuto subæqualibus. *Linn. syst. veget.* 413, n. 25; *Murray, prodrom.* 73; *Hall. hist.*, n. 569.

*Viola tricolor*. *Scop. fl. carn. sp.* 1100.

*Viola assurgens*. *Dodon. kruid-b.*, fol. 234.

*Viola martia surrectis cauliculis*. *Lobel, kruid-b.* 726.

*Viola martia arborescens purpurea*. *Bauh. pin.* 199.

*Viola erecta flore cæruleo*. *Moris. hist.* 2, fol. 475.

*Jacea tricolor surrectis caulibus*. *Bauh. hist.* 3, fol. 547.

Belgicè : *Wilde Penseën* ; gallicè : *Pensée sauvage*.

Ad *Laken, Koningsloo, Strombeek, etc.* Varietas præcedentis à *Lobelio* dicitur.

93. **IMPATIENS.** Calix diphyllus, corolla pentapetala, irregularis, nectario cucullato; stamina cohærentia, capsula supera, unilocularis in valvis quinque spiraliter dissiliens.
232. *I. NOLITANGERE.* Pedunculis multifloris, solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. *Linn. sp. pl.* 938; *n.* 7; *Fl. danic. tab.* 588.  
*Balsamina nolitangere. Scop. fl. carn. sp.* 1101.  
*Impatiens caule geniculato, pedunculis ramosis, foliis petiolatis, ovatis, crenatis. Hall. hist., n.* 557.  
*Noli me tangere, herba impatiens. Dodon. kruyd-b.* 1030.  
*Persicaria siliquosa, vel Noli me tangere. Lobel, kruyd-b.* 392.  
*Noli me tangere. Dalech. hist. 2, fol.* 102.  
*Belgice: Spring-kruyd; gallicè: Impatiente.*  
*In sylvis Vorst, Ter-Kameren, locis humentibus.*
94. **RIBES.** Petala quinque, stamina calici inserta; stylus bifidus, bacca polysperma, infera, unilocularis.
233. *R. RUBRUM.* Inerme, racemis glabris, pendulis, floribus planiusculis. *Linn. sp. pl.* 200, *n.* 1; *Blakw. herb. tab.* 285; *Gouan, hort. monsp.* 114.  
*Ribes inerme, foliis planiusculis, stipulis minimis. Hall. hist.* 818.  
*Grossularia rubra. Scop. fl. carn. sp.* 269; *Dalech. hist. 1, fol.* 109.  
*Ribesium fructu rubro. Dodon. kruyd-b., fol.* 1172.  
*Ribes arabum. Lobel, kruyd-b., fol.* 236, *p.* 2.  
*Ribes vulgaris acidus ruher. Bauh. hist. 2, fol.* 97.  
*Belgicè: Ael-beziën; gallicè: Groseillier rouge.*  
*In sepibus Elmet, Ever, etc.*
234. *R. UVA CRISPA.* Ramis aculeatis, baccis glabris, pedicellis bractea monophylla. *Linn. sp. pl.* 201, *n.* 6; *Blakw. herb. tab.* 277.  
*Ribes ramis aculeatis, foliis rotundè lobatis. Hall. hist., n.* 820.  
*Grossularia uva. Scop. fl. carn. sp.* 270.  
*Uva crispa. Dodon. kruyd-b., fol.* 1171; *Lobel, kruyd-b.* 239, *p.* 2; *Fusch. hist., n.* 187; *Dalech. hist. 1, fol.* 109.



Uva crispa sive Grossularia. *Bauh. hist.* 1, fol. 47.  
 Belgicè : *Steken-beziën*; gallicè : *Groseillier épineux*.  
 Ad margines, sub sepibus ubiquè. *Cum Ribe Grossu-*  
*lariâ conjunxit Scopoli.*

95. *HEDERA*. Petala quinque oblonga, bacca quinquelocularis, pentasperma, exsucca, calice cinctâ.

235. *H. HELIX*. Foliis ovatis lobatisque. *Linn. sp. pl.* 202, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 271; *Blakw. herb. tab.* 188.

*Hedera* foliis sterilibus trilobatis, fructiferis ovato-lanceolatis. *Hall. hist.*, n. 826.

*Hedera* arborea. *Dodon. kruid-b.* 680; *Lobel, kruid-b.* 731.

*Hedera helix* et arborea. *Dalech. hist.* 2, fol. 302.

*Hedera* arborea (poëtica, sterilis et humi repens). *Bauh. pin.* 305.

Belgicè : *Heyl*; gallicè : *Lierre*.

Ad arbores, muros antiquos, etc., etc.

96. *VINCA*. Contorta. Folliculi duo erecti; semina nudâ.

236. *V. MINOR*. Caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. *Linn. sp. pl.* 209, n. 1.

*Pervinca minor*. *Scop. fl. carn. sp.* 273; *Hall. hist.*, n. 572.

*Clematis daphnoïdes*. *Dodon. kruid-b.* 665; *Lobel, kruid-b.* 774.

*Vinca pervinca*. *Dalech. hist.* 1, fol. 720; *Matthioli in Diosc.*, fol. 321.

*Pervinca vulgaris angustifolia*. *Tourn. inst.* 120; *Boerh. hort. lugd.* 311, n. 3—8.

*Clematis daphnoïdes minor*. *Bauh. pin.* 301.

Belgicè : *Maegde-palm*; gallicè : *Pervenche*.

In sylvis, locisque umbrosis. Perennis, fine martis-florens.

## DIGYNIA.

97. *HERNIARIA*. Calix quinquepartitus, corolla nulla; stamina quinque sterilia quorum filamenta reliquis tenuiora; capsula monosperma.

237. *H. GLABRA*. Glabra, glomerulis multifloris. *Linn.*

- sp. pl.* 218, *n.* 1; *Scop. fl. carn. sp.* 276; *Hall. hist.*, *n.* 1552; *Blakw. herb. tab.* 320; *Boerh. hort. lugd.* 96; *Bauh. hist.* 3, *fol.* 378; *Moris. hist.* 2, *fol.* 593.  
*Herniaria* sive *Millegrana*. *Dodon. kruid-b.* 158.  
*Polygonum minus* sive *Millegrana major*. *Bauh. pin.* 281.  
*Herba turca* sive *Herniaria*. *Lobel. kruid-b.* 506; *Dalech. hist.* 2, *fol.* 28.  
 Belgicè : *Duyzend-koren*; gallicè : *Herbe du Turc*.  
 In arvis propè *St.-Lambregts-Woluwe*, etc., etc.
238. *H. Hirsuta*. *Hirsuta*, glomerulis paucifloris. *Linn. sp. pl.* 218, *n.* 2; *Hall. hist.*, *n.* 1553; *Scop. fl. carn. sp.* 277; *Bauh. hist.* 3, *fol.* 379.  
*Polygonum minus* sive *Millegrana major hirsuta*. *Bauh. pin.* 381.  
 Belgicè : *Breuk-kruid*; gallicè : *Herniaire*.  
 In arvis propè *Stalle*, sed præcedenti rarior, cujus varietas videtur.
98. **CHENOPODIUM**. Calix quinquefidus, quinquecostatus; corolla nulla, semen unum lenticulare, superum, horizontale, calice connivente tectum.
239. *C. Bonus-Henricus*. Foliis triangulari-sagittatis, integerrimis, spicis compositis, aphyllis, axillari-bus. *Linn. sp. pl.* 218, *n.* 1; *Scop. fl. carn. sp.* 278.  
*Chenopodium* foliis triangularibus, undulatis, integerrimis, subtus farinosis. *Hall. hist.*, *n.* 1578.  
*Chenopodium folio triangulo*. *Tourn. inst.* 506; *Boerh. hort. lugd.* 90.  
*Tota-bona*. *Dodon. kruid-b.* 1016; *Lobel, kruid-b.*, *fol.* 309.  
*Bonus-Henricus*. *Bauh. hist.* 2, *fol.* 965.  
*Lapathum unctuosum*, folio triangulo, sive *Bonus-Henricus*. *Bauh. pin.* 115.  
 Belgicè : *Lammekens-Oor*; gallicè : *Toute-bonne*.  
 Juxta sepes, domos *St.-Gillis*, *Droogen-bosch*, etc.
240. *C. Rubrum*. Foliis cordato-triangularibus, obtusiusculis, dentatis, racemis erectis, compositis, subfoliosis, caule brevioribus. *Linn. sp. pl.* 218, *n.* 3.  
*Chenopodium Pes anserinus*. *Tourn. inst.* 506.  
*Pes anserinus*. *Dodon. kruid-b.* 964; *Dalech. hist.* 1, *fol.* 457.

*Atriplex sylvestris* sive *Pes anserinus*. *Lobel, kruid. b.* 307.

*Atriplex sylvestris latifolia*. *Bauh. pin.* 119; *Moris. hist.* 2, fol. 604, tab. 31.

Belgicè : *Gansen-voet* ; gallicè : *Pied d'oie*.

Juxta muros, vias *Koekelberg*, *Molebeek*, etc.

241. *C. ALBUM*. Foliis rhomboïdeo-triangularibus, crosis, postice integris, summis oblongis, racemis erectis. *Blakw. herb. tab.* 553.

*Atriplex sylvestris*. *Dodon. kruid. b.*, fol. 962; *Bauh. hist.* 2, fol. 972; *Dalech. hist.* 1, fol. 451; *Matthiol. in Diosc.*, fol. 181.

*Chenopodium folio sinuato candicante*. *Tourn. inst.* 506.

*Atriplex sylvestris folio sinuato candicante*. *Bauh. pin.* 119.

*Chenopodium foliis subtùs farinosis, rhomboïdeis, dentatis, superioribus integerrimis*. *Hall. hist.*, n. 1579.

Belgice : *Witte Melde* ; gallice : *Arroche blanche*.

In hortis inter olera ubiquè. Annuæ ; julio florens.

242. *C. VIRIDE*. Foliis Rhomboïdeis, dentato-sinuatis, racemis racemosis, subfoliaceis. *Linn. sp. plant.* 219, n. 7; *Scop. fl. carn. sp.* 280.

*Chenopodium foliis rhomboïdeis, dentatis, subtùs incanis*. *Hall. hist.*, n. 1580.

*Chenopodium folio laciniato, comâ purpurascente*. *Tourn. inst.* 506.

*Atriplex sylvestris folio sinuato, saturate virente, spicâ rubrâ*. *Moris. hist.* 2, fol. 604.

*Chenopodium sylvestre Opuli folio*. *Vaill. bot. paris.*, fol. 36, tab. 7, fig. 1.

Belgicè : *Groene Melde* ; gallicè : *Arroche verte*.

Inter olera communis. *Vix à præcedentibus distinguenda.*

243. *C. HYBRIDUM*. Foliis cordatis, angulato-acuminatis, racemis ramosis, nudis. *Linn. sp. pl.* 219, n. 8; *Gouan, hort. monsp.* 124.

*Chenopodium Stramonii folio*. *Boerh. hort. lugd.* 91, p. 2; *Vaill. bot. par.*, fol. 36, tab. 7, fig. 2.

*Atriplex sylvestris tertia*. *Dalech. hist.* 1, fol. 451.

*Chenopodium foliis glabris, septangulis, floribus paniculatis*. *Hall. hist.*, n. 1581.

Belgicè : *Ganse Melde* ; gallicè : *Arroche bâtarde*.

In hortis *Molebeek*, *St.-Gillis*, etc., inter olera,

244. *C. VULVARIA*. Foliis integerrimis, rhomboïdeo-ovatis, floribus conglomeratis, axillaribus. *Linn. sp. pl.* 220, n. 13; *Scop. fl. carn. sp.* 281.  
*Chenopodium fœtidum. Tourn. inst.* 506; *Boerh. hort. lugd.* 90, p. 2.  
*Atriplex hircina. Lobel, kruid-b., fol.* 308.  
*Garosmos. Dodon, kruid-b., fol.* 965.  
*Vulvaria. Dalech. hist.* 1, fol. 457; *Blakw. herb. tab.* 100.  
*Atriplex fœtida. Bauh. hist.* 2, fol. 974; *Bauh. pin.* 119; *Moris. hist.* 2, fol. 605, tab. 31, fig. 6.  
 Belgicè : *Bokx-kruid*; gallicè : *Herbe de bouc*.  
 Ad *Schaerbeek, Ever*, juxta muros mœniorum, etc.
245. *C. POLYSPERMUM*. Foliis integerrimis, ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis, aphyllis, calicibus fructus patulis. *Linn. sp. pl.* 220, n. 15, *Scop. fl. carn. sp.* 279.  
*Polyspermum Cassiani. Lobel, kruid-b.* 309; *Dalech. hist.* 1, fol. 452.  
*Chenopodium caule erecto, foliis ovatis, integris. Hall. hist., n.* 1276.  
*Blitum majus polyspermum. Bauh. pin.* 118; *Moris. hist.* 2, tab. 30, fig. 6.  
 Belgicè : *Wilde Mayer*.  
 In hortis inter olera ubiquè.
99. *ATRIPLEX*. Corolla nulla, flores alii hermaphroditi, alii in eâdem plantâ mere feminei. *Masc.* Calix pentaphyllus. *Fem.* Calix diphyllus, semen unum compressum.
246. *A. HORTENSIS*. Caule erecto, herbaceo, foliis triangularibus. *Blakw. herb. tab.* 99 et 552; *Dodon. kruid-b.* 962; *Boerh. hort. lugd.* 89, 1-3.  
*Atriplex sativa alba (et altera). Lobel kruid-b.* 306.  
*Atriplex hortensis alba (et rubra). Bauh. pin.* 119; *Bauh. hist.* 2, fol. 970.  
 Belgicè : *Tamme Melde*; gallicè : *Arroche cultivée*.  
 In hortis olitoriiis *Koekelberg, Jette, etc.*, sponte.
247. *A. PATULA*. Caule herbaceo patulo, foliis subdeltoïdeo-lanceolatis, calicibus seminum disco dentatis. *Linn. sp. pl.* 1053, n. 7; *Scop. fl. carn. sp.* 1245.

- Atriplex foliis imis hamatis, reliquis ligulatis, vasculis seminalibus dentatis. *Hall. hist.*, n. 1616.
- Atriplex sylvestris Polygoni aut Helxines foliis. *Lobel, kruid-b.* 310; *Dalech. hist.* 1, fol. 451.
- Atriplex sylvestris humillima. *Dodon. kruid-b.* 963.
- Atriplex angusto oblongo folio. *Bauh. pin.* 119; *Boerh. hort. lugd.* 89.
- Belgicè : *Wilde Melde*; gallicè : *Arroche sauvage*.  
In agris *Laken*, *Koekelberg* et alihi.
100. HUMULUS. Flores dioïci, corolla nulla. Masc. Calix pentaphyllus. Fem. Calix monphyllus, obliquè patens, integer, semen unum intra calicem foliatum.
248. *H. LUPULUS*. *Linn. syst. veget.* 451. *Blakw. herb. tab.* 536.
- Lupulus. *Hall. hist.* 1618; *Dodon. kruid-b.* 672; *Boerh. hort. lugd.* 104; *Clus. hist. rar.*, fol. 126; *Dalech. hist.* 2, fol. 299; *Matthiol. in Diosc.* 385.
- Lupulus salictarius. *Lobel, kruid-b.*, fol. 752; *Fusch. hist.*, n. 124.
- Belgicè : *Hoppe*; gallicè : *Houblon*.  
Feminea planta seritur in hortis, mascula spontè crescit in sepibus *Etterbeek*, *Elsen*, etc., etc.
101. ULMUS. Calix quinquefidus, corolla nulla; capsula supera unilocularis, foliaceo-compressa, semen solitarium.
249. *U. CAMPESTRIS*. Foliis duplicato-serratis, basi inæqualibus, floribus sessilibus, conglomeratis. *Linn. sp. pl.* 225, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 286.
- Ulmus foliis ovato-lanceolatis, dentatis, dentibus serratis. *Hall. hist.*, n. 586.
- Ulmus campestris et Theophrasti. *Bauh. pin.* 426.
- Ulmus. *Matthiol. in Diosc.* 70; *Dodon. kruid-b.* 1310; *Lobel, kruid-b.* 221, p. 2; *Bauh. hist.* 1, fol. 139.
- Belgicè : *Olm-boom*; gallicè : *Orme*.  
Juxta vias, pagos, etc.
250. *U. HOLLANDICA*. Foliis ovatis, acuminatis, rugosis, inæqualiter serratis, cortice fungoso. *Linn. syst. veget.* 456, n. 5; *Miller, Gardener's Dictionary*.

*Ulmus folio latissimo scabro. Boerh. hort. lugd. 220, p. 2.*

*Ulmus. Dalech. hist. 1, fol. 67.*

Belgicè: *Fetten Olm*; gallicè: *Orme à larges feuilles*.  
In ambulacris, locisque humidis.

102. CANNABIS. Flores dioïci, corolla nulla. *Masc.* Calix quinquepartitus. *Fem.* Calix monophyllus, integer, latere hians; nucula bivalvis, intra calicem clausum.

251. *C. SATIVA. Linn. sp. pl. 1027; Blakw. herb. tab. 322; Gouan, hort. monsp. 504; Hall. hist., n. 1616; Bauh. pin. 320; Boerh. hort. lugd. 104, p. 2, n. 1—2.*

*Cannabis mas. (et femina). Tourn. inst. 535.*

*Cannabis. Lobel, kruid-b. 622; Dodon. kruid-b. 856; Matthiol. in Diosc. 313; Tabern. pl. icon. 250, p. 2.*

Belgicè: *Kemp*; gallicè: *Chanvre*.

Juxta hortos *Etterbeek, Elsen, etc.* Annuæ.

103. GENTIANA. Corolla monopetala, receptacula duo longitudinalia; capsula bivalvis, unilocularis.

252. *G. CENTAURIUM. corollis quinquefidis, infundibuliformibus, caule dichotomo, pistillo simplici. Linn. sp. pl. 229, n. 14; Scop. fl. carn. sp. 293; Blakw. tab. 452.*

*Centaurium minus. Dodon, kruid-b. 541; Bauh. pin. 278; Tourn. inst. 122; Boerh. hort. lugd. 223, n. 1, 2; Matthiol. in Diosc., fol. 231.*

*Gentiana caule dichotomo, floribus infundibuliformibus, strictis. Hall. hist., n. 648.*

*Centaurium parvum. Lobel, kruid-b. 486; Dalech. hist. 2, fol. 180.*

Belgicè: *Kleyn Santorie*; gallicè: *Petite Centaurée*.  
In pratis sylvis *Vorst, etc.* Julio floret; biennis.

104. XANTHIUM. Flores monoïci. *Masc.* Calix communis imbricatus, corollæ monopetalæ quinquefidæ, infundibuliformes, receptaculum

paleaceum. *Fem.* Calix involucrum diphyllum, biflorum, corolla nulla, capsula duplicata, muricata, bifida, nucleus bilocularis.

153. *X. STRUMARIUM.* Caule inermi, foliis cordatis, trinervatis. *Linn. sp. pl.* 987, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 1177; *Blakw. herb. tab.* 444.

*Xanthium* foliis trilobatis, aculeis uncinatis. *Hall. hist., n.* 1621.

*Xanthium.* *Dodon. kruid-b.* 49; *Lobel, kruid-b.* 695; *Dalech. hist.* 1, fol. 923; *Matthiol. in Diosc.* 382; *Boerh. hort. lugd.* 103, p. 2; *Fusch. hist.* 579.

*Xanthium* sive *Lappa minor.* *Bauh. hist.* 3, fol. 572.

Belgicè : *Kleyne Klissen*; gallicè : *Petit Glouteron*.

Ad margines pratorum *Ganshoren*, *Jette*, etc. Augusto floret.

105. *SANICULA.* Umbellæ confertæ, subcapitatæ; involucrum dimidiatum; involucella undiquè ambiens; flores disci abortientes, fructus muricatus, aculeis hamatis.

254. *S. EUROPEA.* Foliis radicalibus orbiculatis, quinque-lobis, flosculis omnibus sessilibus. *Linn. syst. veget.* 468, n. 1; *Fl. danic. tab.* 283; *Blakw. herb. tab.* 63.

*Sanicula* foliis radicalibus trilobatis, lateralibus lobis tripartitis, umbellis globosis. *Hall. hist., n.* 737.

*Sanicula* officinarum. *Bauh. pin.* 319; *Moris. hist.* 2, fol. 616; *Boerh. hort. lugd.* 74, p. 2.

*Sanicula.* *Dodon. kruid-b.* 204; *Lobel, kruid-b.* 810; *Matthiol. in Diosc.* 337.

*Sanicula mas.* *Dalech. hist.* 2, fol. 161; *Bauh. hist.* 3, fol. 639.

Belgicè : *Sanikel*; gallicè : *Sanicle*.

In sylvis montosis propè *Vorst*, *Berghem*, etc. Perennis, maio florens.

106. *CAUCALIS.* Involucra foliolis lanceolatis indivisis; corollæ radiatæ, flosculi disci masculi, petala inflexo-emarginata; semina setis aut aculeis obsessa.

255. *C. GRANDIFLORA*. Seminibus ovatis, costis dorsalibus approximatis quatuor, aculeis diffusis, petalis exterioribus maximis. *Linn. syst. veget.* 472, n. 1; *Gouan, hort. monsp.* 135; *Jacq. fl. austr. tab.* 24. Caulalis umbellis planis, petalis extremis et involucri maxims. *Hall. hist.*, n. 740.  
*Daucus grandiflorus. Scop. fl. carn. sp.* 308.  
*Caucalis arvensis echinata, magno flore. Bauh. pin.* 152; *Tourn. inst.* 323.  
*Caucalis albis floribus. Lobel, hruid-b.* 890; *Clus. hist. rar.* 201.  
*Caucalis. Dodon. hruid-b.* 1094; *Dalech. hist.* 1, fol. 613.  
 Belgicè : *Akker-kletten*.  
 Sub sepibus, adque margines *Elsen, etc.* Junio floret.
256. *C. ANTHRISCUS*. involucro nullo, seminibus ovalibus aculeatis, foliolis ovato-lanceolatis, pinnatifidis, scabris. *Linn. syst. veget.* 473, n. 10; *Scop. fl. carn. sp.* 311.  
*Tordilium Anthriscus. Linn. sp. pl.* 240, n. 6; *Gouan, hort. monsp.* 134; *Jacq. fl. austr. tab.* 261.  
*Daucus annuus minor, flosculis rubentibus. Tourn. inst.* 308.  
*Caucalis semine aspero, flosculis rubentibus. Bauh. pin.* 152.  
*Caucalis minor flore rubente. Moris. hist.* 3, fol. 308, tab. 14, fig. 8.  
*Anthriscus quorundam semine aspero, hispido. Bauh. hist.* 3, fol. 27.  
 Belgicè : *Kleyne Kletten*.  
 Sub sepibus, ad margines pratorum, etc., etc.
257. *C. SCANDICINA*. Seminibus ovato-acuminatis, dorso aculeis brevibus, sparsis, caule lævi. *Linn. syst. veget.* 473, n. 11.  
*Scandix anthriscus. Linn. sp. pl.* 257, n. 4; *Jacq. fl. austr. tab.* 154.  
*Caucalis Scandix. Scop. fl. carn. sp.* 312.  
*Caucalis vaginis lanuginosis, foliis triplicato-pinnatis, seminibus rostratis. Hall. hist.*, n. 743.  
*Caucalis sylvestris folio Chærophylli. Boerh. hort. lugd.* 63.  
*Chærophyllum sylvestre, seminibus brevibus, sub-hirsutis. Tourn. inst.* 314.  
 Belgicè : *Wilde Kervel*, gallicè : *Cerfeuil sauvage*.



In pratis juxta den Schaepen-weg ad Molebeek. Folia albo maculata quasi calce adpersa.

107. **DAUCUS.** Involucrum polyphyllum foliolis linearibus, pinnatifidis; involucella simplicior, corolla subradiata, flosculi disci abortivi; semina subrotunda, hispida.
258. **D. CAROTA.** Seminibus ad angulos quatuor distantes hispidis, petiolis subtus nervosis. *Linn. sp. pl.* 242, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 307; *Blakw. tab.* 546.  
**Daucus** involucris cavis, communibus pinnatis, peculiaribus lineari-lanceolatis, *Hall. hist.*, n. 746.  
**Daucus vulgaris.** *Clus. hist. rar.* 198; *Boerh. hort. lugd.* 62, n. 1—5.  
**Pastinaca sativa lutea,** *Dodon. kruid-b.* 1060; *Lobel, kruid-b.* 883.  
 Belgicè : *Geële Peën*; gallicè : *Carotte*.  
 In hortis et arvis ubiquè.
108. **CONIUM.** Involucrum polyphyllum, involucella dimidiata, subtriphylla; fructus ovatus, gibbus, costis compressis, ante maturitatem undulatis.
259. **C. MACULATUM.** Seminibus striatis inermibus, caule ramosissimo, maculato, glabro. *Linn. sp. pl.* 243, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 340; *Jacq. fl. austr. tab.* 156.  
**Cicuta major vulgaris.** *Clus. hist. rar.* 200; *Moris. hist.* 3, fol. 290.  
**Cicuta major.** *Bauh. pin.* 160; *Boerh. hort. lugd.* 56.  
**Cicuta.** *Dodon. kruid-b.* 756; *Lobel, kruid-b.* 894; *Hall. hist.* n. 766; *Blakw. herb. tab.* 451, 573; *Matthiol. in Diosc.* 357; *Dalech. hist.* 1, fol. 68a.  
 Belgicè : *Scheérlink*; gallicè : *Ciguë*.  
 In locis humidis *Anderlegt, Molebeek, etc.* Biennis, julio florens.
109. **HERACLEUM.** Involucrum polyphyllum caducum; involucella extrorsum dimidiata; co-

rolla difformis, petalis inflexo-emarginatis; semina foliaceo-compressa, glabra, margine membranaceo angustissimo cincta.

260. *H. SPONDILIUM*. Foliis pinnatifidis, hirsuto-scabris, floribus uniformibus. *Linn. sp. pl.* 249, n. 1; *Blakw. herb. tab.* 540.

*Spondilium foliis hirsutis, pinnatis, pinnis quinquefidis. Hall. hist., n.* 809.

*Spondilium Branca. Scop. fl. carn. sp.* 335.

*Spondilium. Dodon. kruid-b.* 493; *Lobel, kruid-b.* 856; *Matthiol. in Diosc., fol.* 273.

*Spondilium vulgare hirsutum. Bauh. pin.* 157; *Moris. hist.* 3, fol. 313.

Belgicè : *Beeren-klaauw*; gallicè : *Panaïs sauvage*.  
In pratis omnibus.

110. *ANGELICA*. Umbellula florens exactè globosa; corollæ æquales, petalis incurvis; styli reflexi; fructus subrotundus, angulatus, bipartibilis.

261. *A. SYLVESTRIS*. Foliolis æqualibus, ovato-lanceolatis, serratis. *Linn. sp. pl.* 251, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 327; *Dodon. kruid-b.* 512; *Lobel, kruid-b.* 850; *Dalech. hist.* 1, fol. 624; *Matthiol. in Diosc.* 374.

*Imperatoria pratensis major. Tourn. inst.* 317.

*Angelica foliis duplicato-pinnatis, ovatis, serratis. Hall. hist., n.* 806.

*Angelica sylvestris major. Bauh. pin.* 155; *Moris. hist.* 3, fol. 280.

Belgicè : *Wilden Angelica*; gallicè : *Angélique sauvage*.

Ad muros, pagos, vias, etc. ubique. Biennis, julio florens.

111. *SIUM*. Involucrum polyphyllum reflexum, petala cordata, styli deflexi; fructus ovatus, oblongus, striatus, transversim crassior.

262. *S. LATIFOLIUM*. Foliis pinnatis, foliolis æqualiter argutè serratis, ovato-lanceolatis, impari nido,

- umbellis terminalibus. *Linn. sp. pl.* 251, n. 1;  
*Gouan, hort. monsp.* 142; *Jacq. fl. austr. tab.* 66;  
*Bauh. pin.* 154; *Boerh. hort. lugd., fol.* 55.  
*Sium* foliis pinnatis, argutè dentatis, umbellis erectis. *Hall. hist., n.* 777.  
*Sium* maximum latifolium. *Bauh. hist.* 2, fol. 175.  
*Sium* magnum Cratævæ. *Dalech. hist.* 1, fol. 956.  
*Sium*. *Dodon. kruid-b.* 933; *Label, kruid-b.* 219.  
 Belgicè : *Water-Eppe*; gallicè : *Berle*.  
 Ad ripas Sennæ, propè *Vilvordiam*, etc.

263. *S. ANGUSTIFOLIUM*. Foliis pinnatis, foliolis auritis, involucrio pinnatim dissecto, umbellis axillaribus pedunculatis. *Linn. syst. veget.* 483, n. 5; *Jacq. fl. austr. tab.* 67.  
*Sium* foliis radicalibus ovatis, pinnulis dentatis, caulinis appendiculatis, umbellis axillaribus. *Hall. hist., n.* 778.  
*Sium* verum Matthioli. *Dalech. hist.* 1, fol. 956.  
*Sium* sive *Apium* palustre, foliis oblongis. *Bauh. pin.* 154.  
*Sium* umbelliferum. *Bauh. hist.* 3, fol. 172.  
 Belgicè *Kleyne Eppe*; gallicè : *Berle commune*.  
 In rivulis ubiquè.

112. *CENANTHE*. flosculi diffformes, in disco sessiles, steriles; fructus suberoso-corticatus, oblongus, striatus, calice stylisque persistentibus, rectis, coronatus.

264. *OE. FISTULOSA*. Stolonifera, foliis caulinis pinnatis, filiformibus, fistulosis. *Linn. sp. pl.* 254, n. 1;  
*Fl. danic. tab.* 846; *Gouan, hort. monsp.* 144.  
*Oenanthe* aquatica. *Lobel, kruid-b.* 893; *Bauh. pin.* 162.  
*Juncus* odoratus. *Dodon. kruid-b.* 935.  
*Oenanthe* sive *Filipendula* aquatica. *Bauh. hist.* 3, fol. 191.  
*Oenanthe* aquatica triflora. *Moris. hist.* 3, fol. 269, tab. 7, fig. 8.  
 Belgicè : *Pyp-biesen*; gallicè : *Oenanthe*.  
 In fossis pratorum propè *Mon-Plaisir*. Alibi non vidi. Perennis, augusto florens.

113. PHELLANDRIUM. Involucrum nullum, involucella heptaphylla; flosculi disci minores; fructus ovatus, lævis, calice et pistillo coronatus.

265. *P. AQUATICUM*. Foliorum ramificationibus divaricatis. *Linn. sp. pl.* 255, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 363; *Blakw. herb. tab.* 570; *Gouan, hort. monsp.* 145.

Phellandrium foliis refractis. *Hall. hist.*, n. 757.

Phellandrium. *Dodon. kruid-b.* 936; *Boerh. hort. lugd.* 56; *Tourn. inst.* 306.

Cicutaria palustris. *Lobel, kruid-b.* 897; *Bauh. pin.* 161.

Phellandrium Plinii. *Dalech. hist.* 1, fol. 957.

Belgicè : *Philander*; gallicè : *Phelandre*.

In fossis et paludibus. Biennis, julio florens.

114. ÆTHUSA. Involucrum nullum, involucella dimidiata, triphylla, deflexa, extus posita; fructus subglobosus, profundè sulcatus.

266. *Æ. CYNAPIUM*. Foliis conformibus, fructibus subglobosis. *Linn. sp. pl.* 256, n. 1; *Hall. hist.*, n. 765; *Scop. fl. carn. sp.* 339; *Blakw. herb. tab.* 517.

Cicutaria fatua. *Lobel, kruid-b. fol.* 895.

Cicutaria Apii folio. *Bauh. hist.* 3. fol. 179.

Cicutaria minor Petroselino similis. *Bauh. pin.* 160; *Tourn. inst.* 306.

Belgicè : *Wilde Petersilie*; gallicè : *Persil sauvage*.

In hortis inter olera, ad margines, etc. Annua, julio florens.

115. SCANDIX. Involucrum nullum, involucella pentaphylla; corolla radiata, petala emarginata; styli persistentes, fructus longissimus sulcatus.

267 *S. PECTEN*. Rostro seminum longissimo, foliolis multipartitis. *Linn. sp. pl.* 156, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 349; *Jacq. fl. aust. tab.* 263.

Myrrhis seminis cornu longissimo. *Hall. hist.*, n. 754.

*Pecten veneris* Plinii. *Lobel, kruyd-b.* 888; *Dalech. hist.* 1, fol. 611.

*Scandix*. *Dodon. kruyd-b.* 1098; *Bauh. hist.* 3, fol. 71.

*Scandix vulgaris* semine rostrato. *Bauh. Pin.* 152.

Belgicè : *Naelde-kervel*; gallicè : *Aiguille à berger*.

In arvis inter segetes. Annuæ, junio florens.

268. *S. CEREFOLIUM*. Seminibus nitidis, tereti-rostratis, umbellis sessilibus, lateralibus. *Linn. sp. pl.* 257, n. 3; *Jacq. fl. austr. tab.* 390; *Gouan, hort. monsp.* 146.

*Cerefolium*. *Dodon. kruyd-b.* 1096; *Blakw. herb. tab.* 236.

*Cerefolium* foliis glabris, triplicato-pinnatis, lobulis obtusis. *Hall. hist.*, n. 747.

*Chærophylloides sativum*. *Bauh. pin.* 152; *Boerh. hort. lugd.* 70.

*Cerefolium* aut *Gingidium*. *Lobel, kruyd-b.* 886; *Dalech. hist.* 1, fol. 610.

Belgicè : *Kervel*; gallicè : *Cerfeuil*.

In hortis seritur, ad margines *Schaerbeek* sponte.

116. *CHÆROPHYLLUM*. Involucrum nullum, involucella foliolis lanceolatis, concavis, reflexis; petala inflexo-cordata, fructus nitens, lævis, oblongus.

269. *C. SYLVESTRE*. Caule striato, lævi, geniculis tumidiusculis. *Linn. sp. pl.* 358, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 366; *Jacq. austr. tab.* 149.

*Cherophyllum sylvestre*, perenne *Cicutæ* folio. *Tourn. inst.* 314.

*Myrrhis sylvestris* seminibus lævibus. *Bauh. pin.* 160.

*Cerefolium* foliis acutè dentatis, triplicato-pinnatis, glabris, nervis hirsutis. *Hall. hist.*, n. 748.

*Cicutaria vulgaris*. *Bauh. hist.* 3, fol. 181.

Belgicè : *Winterling*; gallicè : *Persil d'âne*.

In pratis *Laken* communis. Perennis, julio florens.

270. *C. BULBOSUM*. Caule lævi geniculis tumido, basi hirsuto. *Linn. sp. pl.* 258, n. 2; *Jacq. fl. austr. tab.* 63.

*Myrrhis radice bulbosâ*, caule inferne hirsuto, superne lævi, foliis triplicato-pinnatis, acutè incis. *Hall. hist.*, n. 752.

*Cicutaria bulbosa.* Bauh. pin. 161.  
*Cicutaria odorata bulbosa.* Bauh. hist. 3, fol. 183.  
*Cicutaria pannonica.* Clus. hist. rar. 200, p. 2.  
*Myrrhis annua*, semine striato, lævi, tuberosa, nodosa, coniophyllon. Moris. hist. 3, fol. 302; Boerh. hort. lugd. 69.

Belgicè : *Spaensche Kervel*; gallicè : *Cerfeuil d'Espagne*.

In sepibus abundè vidi propè sacellum S.<sup>ti</sup>-Lenderik, sub *Koningsloo*.

271. *C. TEMULUM*. Caule geniculis tumido, maculato, foliisque scabris, foliolis incisus acutis. Linn. sp. pl. 258, n. 3; Jacq. fl. austr. tab. 65.

*Myrrhis* foliis hirsutis, laciniis obtusis, caule geniculato. Hall. hist., n. 750.

*Chærophyllo* sylvestre. Bauh. pin. 152.

*Myrrhis annua*, semine striato, lævi. Boerh. hort. lugd. 69.

*Myrrhis annua*, vulgaris caule fusco. Moris. hist. 3, fol. 302, tab. 10, fig. 7.

Belgicè : *Swarte Kervel*.

Sub sepibus, juxta vias ubiquè.

117. *PIMPINELLA*. Involucra nulla, petala inflexa, stili recti, stigmata subglobosa, fructus exigui, ovato-oblongi, striis quinque elevatis.

272. *P. SAXIFRAGA*. Caule striato glabro, foliis pinnatis glabris, radicalibus foliolis subrotundis, argutè dentatis, caulinis bipinnatis, linearibus. Linn. sp. pl. 263, n. 1; Jacq. austr. tab. 395; Blakw. herb. tab. 472; Matthiol. in Diosc., fol. 340.

*Pimpinella rotundifolia*. Scop. fl. carn. sp. 345.

*Tragoselinum* foliis pinnatis, pinnis ovatis. Hall. hist., n. 786.

*Tragoselinum minus*. Boerh. hort. lugd. 55; Tourn. inst. 309.

*Saxifraga parva*. Dodon. kruid-b., fol. 506.

*Bipinella saxifraga minor*. Lobel, kruid-b. 877.

*Saxifraga Pimpinella germanica minor*. Clus. hist. rar. 197.

Belgicè : *Bevernelle*; gallicè : *Pimprenelle*.

In pascuis ubiquè.

273. *P. MAGNA*. Foliis uniformibus pinnatis, foliolis

- omnibus lobatis, impari trilobo. *Linn. syst. veget.* 492, n. 3; *Jacq. fl. austr. tab.* 396—397.  
 Tragoselinum foliis pinnatis, pinnis lanceolatis, serratis, extremis trilobatis. *Hall. hist.*, n. 785.  
*Saxifraga magna. Dodon. kruid-b.* 505; *Lobel, kruid-boek* 877.  
*Pimpinella Saxifraga. Scop. fl. carn. sp.* 345.  
*Saxifraga Pimpinella germanica major. Clus. hist. rar.* 197.  
*Tragoselinum majus umbellâ candidâ. Tourn. inst.* 309.  
 Belgicè : *Bevenaert*; gallicè : *Saxifrage*.  
 In pratis *Laken, Molebeek, etc.* Augusto floret; perennis.

118. *ÆGOPodium*. Involucra nulla, fructus ovatus, oblongus, utrinquè attenuatus.

274. *Æ. PODAGRARIA*. Caule triangulari, foliis inferioribus biternatis, summis ternatis. *Linn. sp. pl.* 265; *Fl. danic. tab.* 670.  
*Seseli Ægopodium. Scop. fl. carn. sp.* 359.  
*Podagraria. Hall. hist.*, n. 759; *Lobel, kruid-b.* 848.  
*Herba Gerardi. Dodon. kruid-b.* 514.  
*Angelica sylvestris repens. Bauh. hist.* 3, fol. 145; *Moris hist.* 3, fol. 281.  
 Belgicè : *Fliersyn-kruid*; gallicè : *Herbe à la goutte*;  
 Juxta muros, sepes, etc. Julio floret; perennis.

---

 TRIGYNIA.

119. *VIBURNUM*. Calix quinquepartitus, superus; corolla quinquefida; drupa unilocularis, monosperma.

275. *V. OPULUS*. Foliis lobatis, petiolis glandulosis. *Linn. sp. pl.* 268, n. 7; *Scop. fl. carn. sp.* 370; *Gouan, hort. monsp.* 153.  
*Opulus Ruellii. Boerh. hort. lugd.* 224, p. 2.  
*Sambucus palustris. Dodon. kruid-b.* 1323.  
*Sambucus aquatica. Lobel, kruid-b.* 235, p. 2; *Bauh. hist.* 1, fol. 552; *Dalech. hist.* 1, fol. 227.  
*Opulus. Tourn. inst.* 607; *Hall. hist.*, n. 668.  
 Belgicè : *Swelken-hout, Balroos*; gallicè : *Obier*.

In sepibus, sylvis, etc. *Varietas flore pleno Viburnum roseum dicitur.*

120. **SAMBUCUS.** Calix quinquepartitus, corolla regularis, semi-quinquefida; drupa succulenta, clausa, polysperma.

276. *S. EBULUS.* Caule herbaceo, stipulis foliaceis, cymis tripartitis. *Linn. sp. pl.* 269, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 371; *Blakw. herb. tab.* 488.

*Sambucus herbacea floribus umbellatis. Hall. hist., n.* 671.

*Ebulus*, vel *Sambucus humilis. Dodon. kruid-b.* 620; *Lobel, kruid-b.* 195, p. 2; *Matthiol. in Diosc.* 403; *Dalech. hist.* 1, fol. 226; *Fusch. hist.* 65.

*Sambucus humilis sive Ebulus. Bauh. pin.* 456; *Boerh. hort. lugd.* 223.

*Ebulus sive Sambucus herbacea. Bauh. hist.* 1, fol. 456.

Belgicè : *Leege Vlier*; gallicè : *Hieble*.

In locis sylvosis ubiquè. Julio floret.

277. *S. NIGRA.* Caule arboreo, foliis pinnatis; foliolis subovatis, serratis, cymis quinquepartitis. *Linn. sp. pl.* 269, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 372; *Blakw. herb. tab.* 151.

*Sambucus arborea floribus umbellatis. Hall. hist., n.* 670.

*Sambucus. Matthiol. in Diosc.* 403; *Dodon. kruid-b.* 1321; *Dalech. hist.* 1, fol. 224; *Lobel, kruid-b.* 193, p. 2.

*Sambucus fructu in umbellâ nigro. Bauh. pin.* 456; *Boerh. hort. lugd.* 223, p. 2.

*Sambucus vulgaris. Bauh. hist.* 1, fol. 544.

Belgicè : *Gemeene Vlier*; gallicè : *Sureau*.

In sepibus ubiquè communis. Junio floret.

278. *S. LACINIATA.* Caule arboreo, foliis bipinnatis, pinnis ternatis, foliolis lanceolatis, incisis, cymis quinquepartitis. *Linn. syst. veget.* 478, n. 5; *Bauh. hist.* 1, fol. 456.

*Sambucus laciniato folio. Dodon. kruid-b.* 1321; *Lobel, kruid-b.* 193, p. 2; *Dalech. hist.* 1, fol. 225; *Bauh. pin.* 456; *Boerh. hort. lugd.* 223, n. 5.

Belgicè : *Gekerfde Vlier*; gallicè : *Sureau à feuilles découpées*.

Propè *Laken, Elsen, Etterbeek, etc.*, in sepibus. Non ac præcedens communis.



121. **ALSINE**. Calix pentaphyllus, petala quinque æqualia, capsula unilocularis, bivalvis.

279. *A. MEDIA*. Petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Linn. sp. pl.* 272, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 376; *Blakw. herb. tab.* 164; *Bauh. pin.* 250; *Boerh. hort. lugd.* 209; *Moris. hist.* 2, fol. 550.

Alsine foliis petiolatis, ovato-lanceolatis, petalis bipartitis. *Hall. hist.*, n. 880.

Alsine vulgaris sive Morsus gallinæ. *Rauh. hist.* 3, fol. 363.

Hippia minor. *Dodon. kruid-b.* 36.

Alsine minor recentiorum. *Lobel, kruid-b.*, fol. 545.

Belgicè : *Vogel-muer*; gallicè : *Morgueline*.

In hortis inter olera; sub sepibus, etc.

#### TETRAGYNIA.

122. **PARNASSIA**. Calix quinquepartitus, petala quinque, nectaria quinque cordata, ciliata, apicibus globosis; capsula quadrivalvis, unilocularis, semina membranaceo-marginata.

280. *P. PALUSTRIS*. Nectariis simplicibus. *Linn. syst. veget.* 508, n. 2; *Hall. hist.*, n. 832; *Scop. fl. carn. sp.* 378; *Tourn. inst.* 246; *Boerh. hort. lugd.* 243.

Gramen Parnassi. *Dodon. kruid-b.* 897; *Lobel, kruid-boek* 716.

*Pyrola rotundifolia palustris*, flore unico, ampliore. *Moris. hist.* 3, fol. 505, tab. 10, fig. 3.

Belgicè : *Parnas-gras*; gallicè : *Gazon du Parnasse*.

Ad Berchem, vulgò in 't Broek; ad Ganshoren, in pratis ponè castellum comitis; ad Uccle, in prato propè pastorum. Fine augusti floret, perennis.

#### PENTAGYNIA.

123. **LINUM**. Calix pentaphyllus, petala quinque; Capsula quinquevalvis, decemlocularis, semina solitaria.

281. *L. USITATISSIMUM*. Calicibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis, caule sub-

solitario. *Linn. sp. pl.* 277, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 381; *Hall. hist.*, n. 836.

*Linum sativum.* *Dodon. kruyd-b.* 854; *Lobel, kruyd-b.* 498; *Bauh. pin.* 214; *Blakw. herb. tab.* 160; *Boerh. hort. lugd.* 284, n. 1—4; *Dalech. hist.* 1, *fol.* 416; *Matthiol. in Diosc., fol.* 171.

Belgicè : *Vlas*; gallicè : *Lin.*

In arvis seritur et hinc inde spontè reperitur.

282. *L. CATNARTICUM.* Foliis oppositis, ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. *Linn. sp. pl.* 281, n. 17; *Scop. fl. carn. sp.* 389; *Blakw. herb. tab.* 368.

*Linum foliis conjugatis, ovatis, calicibus aristatis, patulis, lanceolatis.* *Hall. hist.*, n. 839.

*Linum pratense, flosculis exiguis.* *Bauh. pin.* 214; *Tourn. inst.* 340.

*Alsine verna, glabra, flosculis albis vel potius linum minimum.* *Bauh. hist.* 3, *fol.* 55.

Belgicè : *Schyt-vlas*; gallicè : *Lin purgatif.*

Ad *Uccle*, vulgò in *de Dreëf*, inter *Schaerbeek* et *Elmet*, ad margines. Non communis.

## POLYGYNIA.

124. *MYOSURUS.* Calix pentaphyllus, basi adnatus, deciduus; nectaria quinque subulata, petaliformia; semina numerosa, corticata, pendula.

283. *M. MINIMUS.* Foliis integerrimis. *Hall. hist.*, n. 1159; *Bauh. hist.* 3, *fol.* 512; *Fl. danic. tab.* 406.

*Cauda muris.* *Dodon. kruyd-b.* 154; *Lobel, kruyd-b.* 526.

*Holosteo affinis, cauda muris.* *Bauh. pin.* 190.

*Ranunculus gramineo folio, flore caudato, seminibus in capitulum spicatum congestis.* *Tourn. inst.* 293; *Boerh. hort. lugd.* 34.

Belgicè : *Muysen-steérthens*; gallicè : *Queue de Souris.*

In arvis *Schaerbeek*, *Molebeek*, etc. Fine aprilis floret, annua.

## CLASSIS SEXTA.

## HEXANDRIA.

## MONOGYNIA.

125. GALANTHUS. Petala tria concava, nectararia ex petalis tribus, parvis, emarginatis; stigma simplex.
184. *G. NIVALIS*. Linn. *syst. veget.* 534; Scop. *fl. carn. sp.* 391; Jacq. *fl. austr. tab.* 313.  
*Galanthus unillorus*, petalis alternis cordatis. Hall. *hist.*, n. 1254.  
*Leucoium bulbosum*, precox, minus. Clus *hist. rar.* 169.  
*Leucoium bulbosum triphyllum*. Dodon. *kruyd-b.* 361; Lobel, *kruyd-b.* 160.  
*Leucoium bulbosum*, trifolium, minus. Bauh. *pin.* 56.  
*Narcisso-leucoium trifolium*, minus. Tourn. *inst.* 387.  
 Belgicè : Witte Tydeloos; gallicè : Perce-neige.  
 Juxta portam Flandriæ utrinquè pone murum mœniorum, Abundè floret initio martis, perennis.
126. NARCISSUS. corolla supera, hexapetala, æqualis; nectario infundibuliformi, monophyllo; stamina intrâ nectarium.
285. *N. PSEUDO-NARCISSUS*. Spathâ uniflorâ, nectario campanulato, erecto, crispo, æquante petala ovata. Linn. *sp. pl.* 289, n. 2; Scop. *fl. carn. sp.* 395; Bulliard, *herb. franc. tab.* 399.  
*Narcissus foliis ensiformibus*, scapo unifloro, scypho undulato, serrato, petalis æquali, Hall. *hist.*, n. 1252.  
*Narcissus sylvestris luteus*. Dodon. *kruyd-b.* 357.  
*Narcissus luteus montanus* Theophrasti. Lobel, *kruyd-boek* 154.  
*Narcissus sylvestris pallidus*, calice luteo. Bauh. *pin.* 52.  
*Bulbocodium vulgatus*. Bauh. *hist.* 2, fol. 593.

Belgicè : *Tydeloos*; gallicè : *Narcisse des prés*.  
Ad *Dilbeek*, in sylvâ S.<sup>te</sup>-Helenæ, etc. *Culturâ*  
*nectarium duplicatur*.

127. *ALLIUM*. Corolla hexapetala, patens; spatha multifora, arida, umbella congesta, capsula supera trilocularis.

286. *A. VINEALE*. Caule teretiusculo, bulbifero, staminibus tricuspidatis. *Linn. sp. pl.* 299, n. 21; *Gouan, hort. monsp.* 168.

*Allium* radice multiplici, foliis fistulosis, capite sphærico, bulbifero, staminibus alternè trifidis. *Hall. hist.*, n. 1221.

*Allium* sylvestre tenuifolium. *Lobel, kruyd-b.* 195; *Dodon. kruyd-b.* 1068.

*Allium* campestre juncifolium, purpurascens, majus et minus. *Bauh. pin.* 74.

*Cæpa* juncifolia minor purpurascens. *Tourn. inst.* 383.

*Cæpa* sylvestris tenuifolia, prolifera et florida. *Boerh. hort. lugd.* 144, p. 2.

Belgicè : *Wilde Look*; gallicè : *Ail sauvage*.

Ad *Laken*, vulgò *op den Stuyven-berg*, etc. *Julio* floret.

287. *A. URSINUM*. Scapo nudo, triquetro, foliis lanceolatis, petiolatis, umbellâ fastigiata. *Linn. sp. pl.* 300, n. 23; *Scop. fl. carn. sp.* 401; *Dodon. kruyd-b.* 1069; *Lobel, kruyd-b.* 198; *Clus. hist. rar.* 190; *Dalech. hist.* 1, fol. 418.

*Allium* ursinum, bifolium, vernum, sylvaticum. *Bauh. hist.* 2, fol. 565.

*Allium* latifolium palustre. *Moris. hist.* 2, fol. 388; *Boerh. hort. lugd.* 145.

*Allium* sylvestre latifolium. *Bauh. pin.* 74.

Belgicè : *Das-look*; gallicè : *Ail d'ours*.

In sylvâ *Diligem*, inque de *Borre-straet*, ad *Berghem*. *Maio* florens.

288. *A. SCHÆNOPRASUM*. Scapo nudo, adæquante folia teretia, subulato-filiformia. *Linn. sp. pl.* 301, n. 28; *Gouan, hort. monsp.* 169.

*Schænoprasum* vel *Porrum juncum*. *Dodon. kruyd-b.* fol. 1078.

*Schænoprasson*. *Lobel, kruyd-b.*, fol. 192,

Porrum sectivum, schænoprasum quibusdam. *Bauh. hist. 2, fol. 553.*

Porrum sectivum juncifolium. *Bauh. pin. 72.*

Cepa sectilis juncifolia perennis. *Moris. hist. 2, fol. 383; Boerh. hort. lugd. 144.*

Cæpa alpina palustris tenuifolia. *Tourn. inst. 382.*

Belgicè : *Bies-look*; gallicè : *Civette.*

In arvis *Laken, Molebeek, etc.* Junio florens.

128. FRITILLARIA. Corolla hexapetala, campanulata, supra ungues cavitate nectariferâ; stamina longitudine corollæ, stigma trifidum, capsula supera trilocularis.

289. *F. MELEAGRIS.* Foliis omnibus alternis, caule unifloro. *Linn. sp. pl. 304, n. 5; Scop. fl. carn. sp. 405; Jacq. fl. austr. tab. 32.*

Fritillaria caule paucifloro, foliis caulinis gramineis, alternis. *Hall. hist. stirp., n. 1235.*

Fritillaria. *Lobel, kruid-b. 170; Clus. hist. rar. 152.*

Fritillaria precox. *Bauh. pin. 64; Boerh. hort. lugd. 139, n. 2—5.*

Meleagris. *Dodon. kruid-b., fol. 368.*

Belgicè : *Kivits-bloem*; gallicè : *Fritillaire.*

Propè *Dilbeek*, in pratis umbrosis. Aprili florens.

129. ORNITHOGALUM. Corolla hexapetala erecta, persistens, supra medium patens; filamenta alterna, basi dilatata; capsula supera trilocularis.

290. *O. UMBELLATUM.* Floribus corymbosis, pedunculis scapo altioribus. *Linn. sp. pl. 307, n. 9; Scop. fl. carn. sp. 408; Jacq. austr. tab. 343.*

Ornithogalum vulgare. *Clus. hist. rar. 188; Lobel, kruid-b. 183.*

Bulbus leucanthemus sive Ornithogalum minus. *Dodon. kruid-b. 344.*

Ornithogalum leucanthemum Dodonci. *Dalech. hist. 2, fol. 45r.*

Ornithogalum umbellatum, medium, angustifolium. *Bauh. pin. 70.*

Belgicè : *Veld-ajuy*n; gallicè : *Jacinthe des champs.*  
In arvis ubique. Fine maii floret.

130. ASPARAGUS. Calix nullus, corolla sexpartita, petalis tribus exterioribus apice reflexis; bacca supera, trilocularis, semina bina.

291. *A. OFFICINALIS*. Caule herbaceo, tereti, erecto, foliis setaceis, stipulis paribus. *Linn. sp. pl.* 313, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 416; *Fl. danic. tab.* 805.

*Asparagus hortensis* aut *sativus*. *Dodon. kruyd-b.* 1101.

*Asparagus maritimus* *Dioscoridis*. *Lobel; kruyd-b.* 961.

*Asparagus*. *Dalech. hist.* 1, fol. 517; *Matthiol. in Diosc. fol.* 184.

Belgicè : *Corael-kruyd*; gallicè : *Asperge*.

In arenosis *Etterbeek*, juxta viam publicam vidi.

131. CONVALLARIA. Corolla sexfida, bacca trilocularis, supera, semina bina.

292. *C. MAJALIS*. Scapo nudo, floribus spicatis, nutantibus. *Linn. sp. pl.* 314, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 418; *Blakw. herb. tab.* 70.

*Polygonatum* scapo diphylo, floribus spicatis, nutantibus, campaniformibus. *Hall. hist.*, n. 1241.

*Lilium convallium*. *Dodon, kruyd-b.* 316; *Lobel, kruyd-b.* 212; *Tourn. inst.* 77; *Matthiol. in Diosc.* 300; *Bauh. hist.* 3, fol. 531.

*Lilium convallium album*. *Bauh. pin.* 304; *Boerh. hort. lugd.* 64, p. 2.

Belgicè : *Mey-bloemkens*; gallicè : *Muguet*.

In sylvis omnibus. Fine aprilis floret; perennis.

293. *C. MULTIFLORA*. Foliis alternis, amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris. *Linn. sp. pl.* 315, n. 4; *Blakw. herb. tab.* 251; *Scop. fl. carn. sp.* 421.

*Polygonatum* caule simplici, cernuo, foliis ovato-lanceolatis, petiolis multifloris. *Hall. hist.*, n. 1243.

*Polygonatum*. *Dodon. kruyd-b.* 558; *Lobel, kruyd-b.* 775.

*Polygonatum latifolium primum*. *Clus. hist. rar.*, fol. 275.

*Polygonatum latifolium vulgare*. *Bauh. pin.* 303; *Boerh. hort. lugd.* 63, p. 2, n. 1-4.

Belgicè : *Salmons-zegel*; gallicè : *Sceau de Salomon*.

In sylvis omnibus. Initio junii floret; perennis.

291. *C. BIFOLIA*. Foliis cordatis, floribus tetrandris. *Linn. sp. pl.* 316, n. 8; *Scop. fl. carn. sp.* 422; *Fl. danic. tab.* 291.

Unifolium. *Dodon. kruid-b.* 316; *Hall. hist.*, n. 1240.

Monophyllum. *Lobel, kruid-b.*, fol. 372.

*Lilium convallium minus. Bauh. pin.* 304; *Moris. hist.* 3, fol. 539.

Unifolium sive *Ophris unifolia. Bauh. hist.* 3, fol. 534.

*Smilax unifolia humillima. Tourn. inst.* 654; *Boerh. hort. lugd.* 64, p. 2, n. 2.

Belgicè : *Een-blad*; gallicè : *Petit Muguet*.

In sylvis *Vorst, etc.* Perennis, maio florens.

132. *HYACINTHUS*. Calix nullus, corolla campanulata, pori tres melliferi germinis.

295. *H. NON-SCRIPTUS*. Corollis campanulatis, sexpartitis, apice revolutis. *Linn. sp. pl.* 317, n. 1; *Blakw. herb. tab.* 61; *Dodon. kruid-b.* 335; *Bulliard, herb. franc. tab.* 353.

*Hyacinthus floribus tubulosis, basi globosis, apice sexpartito, revolutis. Hall. hist.*, n. 1248.

*Hyacinthus anglicus et belgicus. Lobel, kruid-b.* 140; *Bauh. hist.* 2, fol. 585.

*Hyacinthus hispanicus. Clus. hist. rar.* 177.

*Hyacinthus Dioscoridis Dalech. hist.* 2, fol. 382.

*Hyacinthus oblongo flore, cæruleus, major. Bauh. pin.* 43; *Boerh. hort. lugd.* 111, p. 2.

Belgicè : *Bosch-Jacynth*; gallicè : *Jacinthe des bois*.

In sylvâ *Lint-hout* abunde. Aprilis fine floret.

296. *H. RACEMOSUS*. Corollis ovatis, summis sessilibus, foliis laxis. *Linn. sp. plant.* 318, n. 10; *Jacq. fl. austr. tab.* 187; *Dodon. kruid-b.*, fol. 338.

*Hyacinthus foliis carinatis, spicâ ovatâ, floribus globosis. Hall. hist.*, n. 1245.

*Hyacinthus botryoïdes vulgaris. Lobel, kruid-b.* 144.

*Hyacinthus botryoïdes primus. Clus. hist. rar.*, fol. 181.

*Hyacinthus racemosus, cæruleus, minor, juncifolius. Bauh. pin.* 43.

*Muscari arvense juncifolium, minus, cæruleum. Tourn. inst.* 348.

Belgicè : *Druyfhens*; gallicè : *Jacinthe des champs*.

In agris inter *Koekelberg* et *Laken*. Fine martis floret.

133. ACORUS. Spadix cylindricus tectus flosculis, corollæ hexapetalæ, nudæ; stylus nullus, capsula trilocularis.

297. *A. CALAMUS*. Scapi mucrone longissimo, foliaceo. *Blakw. herb. tab.* 466; *Hall. hist.*, n. 1307; *Scop. fl. carn. sp.* 426. *Linn. syst. veget.* 568, n. 1.

*Acorus verus* sive *Calamus aromaticus officinarum*. *Bauh. pin.* 34.

*Calamus vulgaris*, multis *Acorum*. *Bauh. hist.* 2, fol. 525.

*Calamus aromaticus*. *Mich. gen. et sp.* 43, tab. 31.

*Typha aromatica*, clavâ rugosâ. *Moris. hist.* 3, fol. 246, tab. 13, fig. 4.

Belgicè : *Calmus-wortel*; gallicè : *Roseau aromatique*. In aquis canalis, propè *de Dry-Gaten*.

134. JUNCUS. Gluma floralis diphylla, calix hexaphyllus, persistens; corolla nulla, capsula supera, uni-aut-trilocularis, trivalvis, mono-aut-polysperma.

298. *J. EFFUSUS*. Culmo nudo stricto, paniculâ laterali laxâ, floribus triandris, ovalis, obtusis. *Linn. sp. pl.* 327, n. 3; *Leers, fl. herb. tab.* 13, fig. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 428.

*Juncus caule nudo*, foliis teretibus, strictis, paniculâ laterali sparsâ *Hall. hist.*, n. 1311.

*Juncus lævis*. *Dodon. kruid-b.*, fol. 956.

*Juncus lævis vulgaris*, paniculâ sparsâ. *Lobel, kruid-boek* 119.

*Juncus lævis paniculâ sparsâ major*. *Scheuchz. agrost.* 341; *Bauh. pin.* 12; *Boerh. hort. lugd.* 163, p. 2, n. 3; *Moris. hist.* 3, fol. 231.

Belgicè : *Zagte Biesen*; gallicè : *Jonc lisse*.

In pratis propè *Laken*, etc. Junio floret.

299. *J. CONGLOMERATUS*. Culmo nudo, stricto, capitulo laterali, floribus triandris, ovatis, obtusis. *Linn. sp. pl.* 326, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 427; *Leers, fl. herb. tab.* 13, fig. 1.

*Juncus caule nudo*, foliis teretibus, mollibus, paniculâ conglomeratâ. *Hall. hist.*, n. 1312.



*Juncus lævis glomerato flore. Lobel, kruid-b. 119.*  
*Juncus lævis. Dalech. hist. 1. fol. 859.*  
*Juncus lævis paniculâ conglomeratâ. Scheuchz. agrost. 343.*

*Juncus lævis paniculâ non sparsâ. Bauh. pin. 12; Boerh. hort. lugd. 163, p. 2.*

Belgicè : *Gemeyne Biesen*; gallicè : *Jonc commun.*  
 In pratis paludosis, juxta aquas, etc. Junio floret.

300. *J. INFLEXUS.* Culmo nudo, stricto, apice incurvo, submembranaceo, paniculâ laterali sparsâ, floribus ovato-acuminatis. *Linn. sp. pl. 326, n. 4; Leers, fl. herborn. tab. 13, fig. 3; Scop. fl. carn. sp. 429.*

*Juncus acutus. Dodon. kruid-b., fol. 956.*

*Juncus acutus Dodonei. Dalech. hist. 1, fol. 859.*

*Juncus acutus vulgaris. Lobel, kruid-b., fol. 119.*

*Juncus acumine reflexo alter. Scheuchz. agrost. 345, n. 5—6.*

*Juncus acumine reflexo major. Bauh. pin. 12; Moris. hist. 3, fol. 233, tab. 10, fig. 25; Bauh. hist. 2, fol. 508.*

Belgicè : *Sherpe Biesen*; gallice : *Jonc aigu.*  
 In pratis humidis.

301. *J. SQUARNOSUS.* Culmo subnudo, rigido, foliis setaceis, capitulis glomeratis, aphyllis. *Linn. sp. pl. 327, n. 7; Fl. dan. tab. 430.*

*Juncus rigidus, paniculâ spicatâ, floribus cartilagineis. Hall. hist., n. 1317.*

*Gramen junceum maritimum. Lobel, kruid-b. 19.*

*Gramen junceum, foliis et spicâ junci. Bauh. pin. 5; Moris. hist. 3, fol. 226, tab. 9, fig. 13; Boerh. hort. lugd. 164, p. 2.*

*Junco affinis paniculâ laxâ seu longioribus pedicellis insidente. Scheuchz. agrost., fol. 350.*

Belgicè : *Zee-bies-gras*; gallicè : *Jonc marin.*

Ad *Vorst*, in piscinâ desiccâtâ propè villam *Kleymans*.

302. *J. AQUATICUS.* Culmo decumbente, foliis articulato-nodosis, subcompressis, linearibus, paniculâ terminali compositâ. *Leers, fl. herborn. tab. 13, fig. 6; Linn. syst. veget. 571, n. 11.*

*Gramen junceum, folio articulato, aquaticum. Bauh. pin. 5; Scheuchz. agrost. 331; Boerh. hort. lugd. 164, p. 2.*

*Gramen aquaticum alterum. Lobel, kruid-b., fol. 13.*

*Juncus* foliis articulosis, floribus umbellatis. *Tourn. inst.* 247.

*Juncus* foliis articulatis, compressis, paniculâ semel ramosâ. *Hall. hist.*, n. 1322.

*Juncus* foliaceus, capsulis triangulis. *Bauh. hist.* 2, fol. 521.

Belgicè : *Water-bies-gras*.

Ad ripam piscinæ D. *Van Uffel*, propè de *Liesde*, ad *Over-Heembeek*.

303. *SYLVATICUS*. Culmo erecto, foliis teretibus, articulato-nodosus, paniculâ terminali supradecompositâ, diffusâ. *Linn. syst. veget.* 571, n. 12.

*Juncus* foliis articulatis, teretibus, paniculâ repetito-ramosâ. *Hall. hist.*, n. 1323.

Gramen junceum folio articulato, sylvaticum. *Scheuchz. agrost.*, fol. 334, n. 4; *Bauh. pin.* 5.

Gramen junceum folio articulato cum utriculis. *Bauh. prod.* 12; *Scheuchz. agrost.* 333, n. 2—3.

Gramen junceum, articulatum, palustre, erectum et elatius. *Moris. hist.* 3, fol. 227, tab. 9, fig. 1.

Belgicè : *Bosch-bies*.

In nemorosis humidis propè *Jette*, *Berghem*, etc.

304. *J. BULBOSUS*. Culmo indiviso, subcompresso, foliis linearibus, canaliculatis, paniculâ terminali, bracteâ breviori, calicibus capsulisque obtusis. *Linn. syst. veget.* 571, n. 15. *Leers, fl. herb. tab.* 13, fig. 7.

*Juncus* foliis carinatis, paniculâ sparsâ, fructu globoso. *Hall. hist.*, n. 1318.

Gramen junceum, foliis et spicâ junci. *Bauh. pin.* 5; *Scheuchz. agrost.*, fol. 322; *Boerh. hort. lugd.* 164.

Gramen junceum, junci sparsâ paniculâ. *Moris. hist.* 3, fol. 227, tab. 9, fig. 11.

*Juncus* parvus, cum pericarpis rotundis. *Bauh. hist.* 2, fol. 512.

Belgicè : *Knobbel-biesen*.

Ad *St.-Gillis*, in pratis vulgò de *Gemeente*, propè den *Aerde-molen*, etc.

305. *J. BUFONIUS*. Culmo dichotomo, floribus sessilibus solitariis, calicis foliolis lanceolatis, mucronatis, margine scariosis, capsulâ ovatâ longioribus. *Linn. syst. veget.* 572, n. 16; *Leers fl. herb. tab.* 13, fig. 8; *Scop. fl. carn. sp.* 433.

Gramen nemorosum, caliculis paleaceis erectum.

- Scheuchz. agrost.* 327. *EjUSD. sp.* altera procerior.  
 328. *EjUSD.* gramen nemorosum, etc., etc. 329, n. 4.  
*Juncus palustris humilior, erectus. Tourn. inst.* 546,  
*et repens ejUSD. inst.* 547.  
*Holostium Matthioli. Lobel, kruid-b., fol.* 18.  
*Holostium Matthioli junceum. Bauh. hist.* 2, *fol.* 510.  
 Belgicè : *Padde-gras.*  
 In locis humidis ubiquè; *per totam æstatem floret.*
306. *J. Pilosus.* Foliis planis, pilosis, corymbo ramoso.  
*Linn. sp. pl.* 329, n. 14; *Scop. fl. carn. sp.* 435;  
*Leers, fl. herborn.* 268, *tab.* 13, *fig.* 10.  
*Gramen hirsutum nemorosum. Lobel, kruid-b., fol.* 17.  
*Gramen hirsutum, latifolium minus. Bauh. pin.* 7;  
*Moris. hist.* 3, *fol.* 225, *tab.* 9, *fig.* 1; *Scheuchz.*  
*agrost., fol.* 315.  
*Gramen hirsutum nemorosum, angustifolium alpi-*  
*num, paniculis obscure rufescentibus. Scheuchz.*  
*agrost.* 312, *prodrom.* 25, *tab.* 6, *fig.* 3.  
*Juncus foliis planis hirsutis, floribus umbellatis, soli-*  
*tariis, petiolatis, aristatis. Hall. hist., n.* 1325.  
 Belgicè : *Bosch-bies-gras.*  
 In sylvis propè *Vorst, etc.* Fine maii floret.
307. *J. Maximus.* Foliis planis, pilosis, paniculâ termi-  
 nali ramosissimâ, floribus fasciculatis. *Linn. syst.*  
*veget.* 572, n. 25.  
*Juncus foliis planis, hirsutis, floribus paniculatis, fas-*  
*ciculatis. Hall. hist,* 1324.  
*Gramen hirsutum, latifolium, maximum, paniculâ*  
*junceâ. Moris. hist.* 3, *fol.* 225, *tab.* 9, *fig.* 2—3.  
*Gramen luzulæ maximum (et medium). Bauh. hist.* 2,  
*fol.* 493.  
*Gramen hirsutum, nemorosum, latifolium, majus.*  
*Bauh. pin.* 7, *Scheuchz. agrost.* 317.  
*Juncus villosus latifolius maximus. Vaill. bot. par.* 110.  
 Belgicè : *Groot Bies-gras.*  
 In sylvis *Heder, Ter-Kameren, etc.* junio floret.
308. *J. CAMPESTRIS.* Foliis planis, subpilosis, spicis sessi-  
 libus pedunculatisque. *Linn. sp. pl.* 329, n. 14;  
*Scop. fl. carn. sp.* 434; *Leers, fl. herborn.* 270,  
*tab.* 13, *fig.* 5.  
*Juncus foliis gramineis, hirsutis, spicis petiolatis,*  
*nutantibus, petalis aristatis. Hall. hist., n.* 1330.  
*Gramen exile hirsutum cypéroïdes. Lobel, kruid-b.* 16.  
*Juncus pilosus capitulis Psylli. Tourn. inst.* 246.

- Gramen hirsutum capitulis Psylli (et capitulo globoso). Bauh. pin. 7.*  
*Juncoïdes villosus capitulis Psylli (et capitulo glomerato). Scheuchz. agrost. 310. 312.*  
*Belgicè : Veld-biesen.*  
*In pascuis siccis ubiquè. Medio maii floret.*
- 

TRIGYNIA.

335. **RUMEX.** Calix triphyllus, petala tria conniventia, semen unum triquetrum in corollâ connivente.
309. **R. Acutus.** Floribus hermaphroditis, valvis dentatis, graniferis, foliis cordato-oblongis, acuminatis. *Linn. sp. pl. 335, n. 10; Blakw. herb. tab. 491.*  
*Lapathum acutum. Scop. fl. carn. sp. 443; Dodon. kruyd-b., fol. 1012; Lobel, kruyd-b. 349; Raij, hist. 175; Bauh. hist. 2, fol. 983.*  
*Oxilapathum. Dalech. hist. 1, fol. 510. Fusch. hist., 491.*  
*Belgicè : Peêrdik; gallicè : Patience sauvage.*  
*In pratis Laken, Schaerbeek, etc. Perennis, augusto florens.*
310. **R. Aquaticus.** Floribus hermaphroditis, valvis integerrimis, nudis, foliis cordatis, acutis. *Linn. sp. pl. 336, n. 14; Blakw. herb. tab. 490.*  
*Lapathum aquaticum. Scop. fl. carn. sp. 444; Bauh. pin. 116.*  
*Rumex vel Lapathum sativum. Dodon. kruyd-b. 1012.*  
*Hydrolapathum magnum. Lobel, kruyd-b. 351.*  
*Hyppolapathum. Dalech. hist. 1, fol. 512.*  
*Lapathum foliis longè lanceolatis, paniculis densissimis. Hall. hist., n. 1588.*  
*Belgicè : Water-patik; gallicè : Parelle.*  
*Ad ripas aquarum communis. Fine julii floret.*
311. **R. Acetosa.** Floribus dioïcis, foliis oblongis, sagittatis. *Linn. sp. pl. 337, n. 21; Blakw. herb, tab. 230.*  
*Lapathum sexubus separatis, foliis sagittatis, hamis retrorsum porrectis. Hall. hist., n. 1597.*  
*Lapathum Acetosa. Scop. fl. carn. sp. 438.*

- Acetosa vel Rumex acidus, *Dodon. kruid-b.* 1013.  
 Oxalis. *Lobel, kruid-b.*, fol. 358.  
 Acetosa pratensis. *Bauh. pin.* 114; *Boerh. hort. lugd.* 85; *Moris. hist.* 2, fol. 582.  
 Oxalis vulgaris longo folio. *Bauh. hist.* 2, fol. 989.  
 Belgicè : *Zurkel, Zuering*; gallicè : *Surelle*.  
 In pratis propè *Randsvoort*, etc. Junio floret.
312. *R. ACETOSELLA*. Floribus dioïcis, foliis lanceolato-hastatis. *Linn. sp. pl.* 338, n. 22; *Blakw herb. tab.* 307.  
 Lapathum sexubus separatis, foliis sagittatis, hamis acutis, recurvis. *Hall. hist.*, n. 1596.  
 Lapathum Acetosella. *Scop. fl. carn. sp.* 439.  
 Acetosella. *Dodon. kruid-b.*, fol. 1013.  
 Oxalis tenuifolia. *Lobel, kruid-b.* fol. 359.  
 Acetosa minor Matthioli. *Dalech. hist.* 1, fol. 513.  
 Acetosa arvensis lanceolata. *Bauh. pin.* 114.  
 Belgicè : *Schaeps-Zurkel*; gallicè : *Oseille*.  
 In arvis pratisque. Julio floret.
136. COLCHICUM. *Spatha*. Corolla sexpartita, tubo radicato longissimo; capsulæ tres inflatæ, coadunatæ in unam, trilobam, superam.
313. *C. AUTUMNALE*. Foliis planis, lanceolatis, erectis. *Linn. sp. pl.* 341, n. 1, *Scop. fl. carn. sp.* 448.  
 Colchicum flore folium longè præcedente, petalis ovatis. *Hall. hist.*, n. 1255.  
 Colchicum. *Dodon. kruid-b.* 754; *Fusch. hist.* 356—357; *Bauh. hist.* 2, fol. 649.  
 Colchicum commune. *Bauh. pin.* 67; *Boerh. hort. lugd.* 117, p. 2; *Moris. hist.* 2, fol. 340.  
 Belgicè : *Wilde Saffraen*; gallicè : *Tue-chien*.  
 Propè *Vilvordiam*, vulgò in 't *Broek*; in pratis *Anderslegt*, juxta *Sennam*, etc. Initio septembris floret.

## POLYGYNIA.

137. ALISMA. Calix triphyllus, petala tria, semina plura.
314. *A. PLANTAGO*. Foliis ovatis, acutis, fructubus obtusè trigonis. *Linn. sp. pl.* 342, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 449.

*Damasonium* foliis ellipticis, lanceolatis, capitulo rotundè triquetro. *Hall. hist. n.* 1184.

*Plantago* aquatica. *Dodon. kruyd-b.* 957; *Lobel, kruyd-b.* 369; *Matthiol. in Diosc.* 186; *Bauh. hist.* 3, fol. 787.

*Ranunculus* palustris *Plantaginis* folio ampliore. *Tourn. inst.* 292.

*Plantago* aquatica latifolia. *Bauh. pin.* 190.

Belgicè : *Water-weg-bree*; gallicè : *Plantain d'eau*.

In aquis mœniorum, etc. Julio floret.



---

## CLASSIS SEPTIMA.

---

### HEPTANDRIA.

---

#### MONOGYNIA.

138. *ÆSCULUS*. Calix monophyllus, quinquedentatus, ventricosus; corolla pentapetala, inaequaliter colorata, calici inserta; capsula bilocularis, semina bina, subglobosa.
315. *Æ. HIPPOCASTANUM*. Floribus heptandris. *Linn. syst. veget.* 595, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 450; *Gouan, hort. monsp.* 191.  
*Hippocastanum vulgare. Boerh. hort. lugd., fol.* 230, p. 2, n. 1—3; *Hall. hist., n.* 1029; *Tourn. inst.* 612.  
*Castanea equina. Dodon. kroyd-b.* 1276, *Clus. hist. rar.* 8; *Lobel, kroyd-b.* 191, p. 2; *Raij, hist., n.* 683; *Tabern. icon. pl.* 680, p. 3.  
*Castanea equina folio multifido. Bauh. pin.* 419; *Bauh. hist.* 1, fol. 128.  
 Belgicè : *Wilden Kastanien-boom*; gallicè : *Maronnier d'Inde*.  
 In ambulacris ubiquè. Initio maii floret.



---

## CLASSIS OCTAVA.

---

### OCTANDRIA.

---

#### MONOGYNIA.

139. *ÆNOTHERA*. Calix quadrifidus; petala quatuor; capsula infera columnaris; quadrilocularis; semina nuda, angulata, fungosa.
316. *Æ. BIENNIS*. Foliis ovato-lanceolatis, planis, caule muricato, villosa. *Linn. sp. pl.* 346, n. 1; *Hall. hist.* n. 994; *Fl. danic. tab.* 446; *Gouan, hort. monsp.* 192.  
*Onagra biennis. Scop. fl. carn. sp.* 451.  
*Onagra latifolia, Tourn. inst.* 302.  
*Lysimachia lutea corniculata. Bauh. pin.* 245; *Moris. hist.* 2, fol. 271; tab. 11, fig. 7.  
 Belgicè : *Ezels-kruyd*; gallicè : *Herbe aux ânes*.  
 In fossis mœniorum; ad *Schaerbeek, etc.* Julio floret.
140. *EPILOBIUM*. Calix tetraphyllus, deciduus; petala quatuor; capsula infera, longissima, quadrilocularis; semina plurima, apice crinita.
317. *E. ANGUSTIFOLIUM*. Foliis sparsis, lineari-lanceolatis, floribus inæqualibus. *Linn. sp. pl.* 347, n. 1; *Fl. danic. tab.* 289; *Gouan, hort., monsp.* 193.  
*Chamænerion angustifolium. Scop. fl. carn. sp.* 455.  
*Epilobium flore difformi, foliis lanceolatis, transversim rugosis. Hall. hist., n.* 1000.  
*Lysimachia chamænerion dicta, angustifolia, Bauh. pin.* 245.  
*Lysimachia speciosa. Bauh. hist.* 2, fol. 906.  
 Belgicè : *Wilden Oleander*; gallicè : *Laurier de St.-Antoine*.  
 In Sylvis *Linthout, Ter-Kameren, etc.* Junio floret.
318. *E. HIRSUTUM*. Foliis ovato-lanceolatis, hirsutis, se-



mi-amplexicaulibus, caule ramosissimo, villosus.  
*Linn. sp. pl.* 347, n. 8; *Fl. danic. tab.* 226.

*Epilobium* foliis semi-amplexicaulibus, lanceolatis, hirsutis. *Hall. hist.*, n. 995.

*Chamænerion* hirsutum. *Scop. fl. carn. sp.* 452.

*Lysimachia* purpurea. *Fusch. hist.*, 491.

*Lysimachia* siliquosa, hirsuta, magno flore. *Bauh. pin.* 245; *Moris. hist.* 2, fol. 270, tab. 11, fig. 3.

Belgicè : *St.-Anthony's-kruyd*; gallicè : *Petit Laurier rose*.

In pratis juxta fossas.

319. *E. PARVIFLORUM*. Foliis lanceolatis, subpetiolatis, pubescentibus, caule villosus, simplicissimo. *Linn. syst. veget.* 608, n. 5; *Fl. danic. tab.* 347.

*Chamænerion* parviflorum, foliis oppositis, lanceolatis, serratis, sessilibus, cauleque villosis. *Schreb. spicil. fl. lips.*, fol. 146.

*Lysimachia* hirsuta, siliquosa, parvo flore. *Bauh. pin.* 245, prod. 116; *Moris. hist.* 2, fol. 270, tab. 11, fig. 4.

Belgicè : *Kleyn St.-Anthony's-kruyd*.

In locis opacis humidiusculis. Junio florens; perennis.

320. *E. MONTANUM*. Foliis oppositis, ovatis, dentatis. *Linn. sp. pl.* 348, n. 4.

*Epilobium* foliis ovato-lanceolatis, glabris, dentatis. *Hall. hist.*, n. 996.

*Chamænerion* montanum. *Scop. fl. carn. sp.* 453.

*Pseudo-lysimachum* purpureum. *Dodon. kruyd-b.*, fol. 116.

*Lysimachia* siliquosa. *Lobel, kruyd-b.*, fol. 417.

*Lysimachia* siliquosa, major. *Clus. hist. rar.*, fol. 51.

*Lysimachia* siliquosa glabra, major. *Bauh. pin.* 204.

*Salicaria* vulgaris purpurea, foliis oblongis. *Boerh. hort., lugd.* 221.

*Lysimachia* siliquosa altera Lobelii. *Dalech. hist.* 1, fol. 926.

Belgicè : *Rooden Widerik*; gallicè : *Corneille rouge*.

In sylvis *Heder*, *Linthout*, etc. Fine julii floret.

321. *E. TETRAGONUM*. Foliis lanceolatis, denticulatis, imis oppositis, caule tetrageno. *Linn. sp. pl.* 348, n. 5; *Gouan, hort. monsp.* 194.

*Epilobium* foliis lanceolatis glabris dentatis. *Hall. hist.*, n. 997.

*Chamænerion tetragonum*. Scop. *fl. carn. sp.* 454.  
*Lysimachia siliquosa glabra minor*. Bauh. *pin.* 303.  
*Chamænerion minus glabrum*. Tourn. *inst.* 303.  
 Belgicè : *Kleynen Widerik* ; gallicè : *Petite Corneille*.

Juxta muros, sub sepibus, in locis humidis.

322. *E. PALUSTRE*. Foliis oppositis, lanceolatis, integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto. Linn. *sp. pl.* 348, n. 6.

*Epilobium foliis glabris, ellipticis, integerrimis*. Hall. *hist.*, n. 998.

*Chamænerion palustre*. Scop. *fl. carn. sp.* 456.

*Lysimachia siliquosa, glabra, angustifolia*. Bauh. *pin.* 245.

Belgicè : *Water-widerik* ; gallicè : *Corneille aquatique*.

Juxta rivos, fossas, etc. Perennis ; augusto florens.

141. *ACER*. Flores masculi reliquis interjecti, calix quinquesidus ; corolla pentapetala, capsulæ binæ vel tres monospermæ, alâ terminatæ.

323. *A. PSEUDO-PLATANUS*. Foliis quinquelobis, inæqualiter serratis, racemis compositis, pendulis. Linn. *sp. pl.* 1053, n. 1.

*Acer major*. Dodon. *kruyd-b.* 1314 ; Lobel, *kruyd-b.* 233, p. 2.

*Acer foliis quinquelobis, acutè serratis, racemis pendulis*. Hall. *hist.*, n. 1029.

*Acer montanum candidum*. Bauh. *pin.* 430 ; Boerh. *hort. lugd.* 234.

*Acer*. Dalech. *hist.* 1, fol. 79.

*Acer major multis falsò platanus*. Bauh. *hist.* 1, fol. 168.

Belgicè : *Anhorn, Maashorn-boom* ; gallicè : *Erable*.  
 In sylvis sepibusque. Aprilis fine floret.

324. *A. CAMPESTRE*. Foliis quinquelobis, integerrimis, lobis inferioribus emarginatis, corymbo tripartito-erecto. Linn. *sp. pl.* 1055, n. 7 ; Scop. *fl. carn. sp.* 1247.

*Acer foliis semitrilobis, obtusis, lobis lateralibus emarginatis*. Hall. *hist.*, n. 1029.

*Acer minor*. Dodon. *kruyd-b.*, fol. 1315.

*Acer campestre* et minus. *Bauh. pin.* 431; *Boerh. hort. lugd.* 234.

*Acer vulgare* minore folio. *Bauh. hist.* 1, fol. 163.

Belgicè : *Boog-hout* ; gallicè : *Petit Erable*.

In sylvis, sepibus, etc. Cum precedente floret.

142. VACCINIUM. Calix superus; corolla monopetala; filamenta receptaculo inserta; bacca quadrilocularis, polysperma, infera; unibilicata.

325. *V. MYRTILLUS*. Pedunculis unifloris, foliis serratis, ovatis, caule angulato. *Linn. sp. pl.* 349, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 458; *Blakw. herb. tab.* 493.

*Vaccinium*, foliis venosis, ovato-lanceolatis, serratis, caule anguloso. *Hall. hist.*, n. 1020.

*Vaccinia nigra*. *Dodon. kruid-b.*, fol. 1204.

*Vitis idæa* secunda. *Clus. hist. rar.*, fol. 61.

*Vitis idæa* foliis oblongis, crenatis, fructu nigricante. *Boerh. hort. lugd.* 71.

*Myrtillus germanica*. *Dalech. hist.* 1, fol. 161.

Belgicè : *Krack-beziën* ; gallicè : *Myrtille*.

In sylvis propè *Vorst*, etc. communis. Maio floret.

143. ERICA. Calix quadrifidus, superus; corolla quadrifida; filamenta receptaculo inserta, antheræ apice bifidæ, pertusæ; capsula quadrilocularis, quadrivalvis, polysperma.

326. *E. VULGARIS*. Antheris aristatis, corollis campanulatis, subæqualibus, calicibus duplicatis, foliis oppositis, sagittatis. *Linn. sp. pl.* 352, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 460; *Fl. dan. tab.* 677.

*Erica* foliis imis simplicibus, adpressis, floralibus calcaratis. *Hall. hist.*, n. 1012.

*Erica* prior. *Dodon. kruid-b.*, fol. 1203; *Matthiol. in Diosc.* 73; *Dalech. hist.* 1, fol. 155.

*Erica vulgaris* glabra. *Bauh. pin.* 485; *Boerh. hort. lugd.* 221, p. 2, n. 1—3.

*Erica vulgaris*, humilis, sempervirens. *Bauh. hist.* 1, fol. 354.

Belgicè : *Heyde* ; gallicè : *Bruidère*.

In sylvis omnibus; per totam æstatem floret.

144. **POPULUS.** Flores *dioici* amentacei, calix lamina lacera; corolla turbinata, obliqua, integra. *Fem.* Stigma quadrifidum; capsula bicularis, semina multa, papposa.
327. *P. ALBA.* Foliis subrotundis, dentato-angulatis, subtilis tomentosis. *Linn. sp. pl.* 1034, n. 1; *Blakw. herb. tab.* 548; *Scop. fl. carn. sp.* 1222; *Dodon. kruid-b.* 1308; *Dalech. hist.* 1, fol. 72.  
*Populus foliis angulosis, subtilis tomentosis, subrotundis, dentato-angulatis. Hall. hist. n.* 1634.  
*Populus alba latifolia. Lobel, kruid-b.* 224, p. 2.  
*Populus alba, majoribus foliis. Bauh. pin.* 429.  
 Belgicè : *Abbeel-boom*; gallicè : *Peuplier blanc*.  
 Circum prata ubique.
328. *P. TREMULA.* Foliis subrotundis, dentato-angulatis, utrinquè glabris. *Linn. sp. pl.* 1034, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 1224; *Blakw. herb. tab.* 248; *Bauh. pin.* 429; *Boerh. hort. lugd.* 211, p. 2.  
*Populus lybica. Dodon. kruid-b.* 1308; *Lobel, kruid-boek* 225, p. 2; *Dalech. hist.* 1, fol. 73; *Bauh. hist.* 1, fol. 163.  
 Belgicè : *Ratelaer*; gallicè : *Tremble*.  
 Juxta rivos, prata, etc., etc.
329. *P. NIGRA.* Foliis utrinquè glabris, acuminatis, serratis, deltoïdibus, diametro longitudinali longiore. *Linn. syst. veget.* 630, n. 3; *Scop. fl. carn. sp.* 1223; *Blakw. herb. tab.* 248, fig. 1; *Dodon. kruid-b.* 1308; *Lobel, kruid-b.* 225, p. 2; *Bauh. pin.* 429; *Dalech. hist.* 1, fol. 72; *Boerh. hort. lugd.* 211, p. 2, n. 3; *Bauh. hist.* 1, fol. 155, *Matthiol. in Diosc.* 67.  
*Populus foliis glabris, cordato-rhomboïdeis, serratis. Hall. hist., n.* 1631.  
 Belgicè : *Popelier*; gallicè : *Peuplier noir*.  
 In pratis et sylvis communis.
330. *P. DILATATA.* Foliis utrinquè glabris, acuminatis, serratis, deltoïdibus, diametro transversali longiore. *Linn. syst. veget.* 630, n. 4.  
*Populus nigra italica, foliis serratis, acuminatis, ramis erectis. De Poederlè. Forest belg.* 2, fol. 199.  
 Belgicè : *Lombardsche Popelier*; gallicè : *Peuplier d'Italie*.  
 In ambulacris, juxta prata, etc.

## DIGYNIA.

145. *CORYLUS*. Flores *monoïci*, absque corollâ. *Masc.* Calix monophyllus, trifidus, squamiformis, uniflorus. *Fem.* Calix diphyllus, lacerus, nux ovata.

331. *C. AVELLANA*. Stipulis lanceolatis, ramulis pilosis. *Linn. sp. pl.* 998, n. 1; *Blakw. herb. tab.* 293; *Scop. fl. carn. sp.* 1192.

*Corylus sylvestris*. *Hall. hist.*, n. 1625; *Lobel, kruyd-b.* 223, p. 2; *Bauh. pin.* 418; *Bauh. hist.* 1, fol. 266.

*Corylus*. *Dodon. kruyd-b.* 1280; *Boerh. hort. lugd.* 176; n. 1—5; *Clus. hist. rar.* 10.

Belgicè : *Hazelaer*; gallicè : *Noisettier*, *Coudrier*.  
In sylvis omnibus.

## TRIGYNIA.

146. *POLYGONUM*. Calix nullus, corolla quinquepartita, calicina; semen unum angulatum, in plurimis nudum.

332. *P. AMPHIBIUM*. Floribus pentandris, semi-digynis, spicâ ovatâ. *Linn. sp. pl.* 360, n. 9; *Fl. danic. tab.* 282; *Leers, fl. herborn.*, n. 296.

*Polygonum foliis ovato-lanceolatis, ciliatis, spicis ovatis*. *Hall. hist.*, n. 1565.

*Persicaria salicis folio*. *Bauh. pin.* 193; *Boerh. hort. lugd.* 87, p. 2.

*Potamogeton prima*. *Dodon. kruyd-b.* 923.

*Potamogeton secunda*. *Dalech. hist.* 1, fol. 879.

Belgicè : *Vorschen-kruyd*; gallicè : *Epi d'eau*.

In aquis stagnantibus. Mense septembri floret.

333. *HYDROPIPER*. Floribus hexandris, semi-digynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis. *Linn. sp. pl.* 361, n. 10; *Scop. fl. carn. sp.* 467; *Blakw. herb. tab.* 119.

*Persicaria foliis ovato-lanceolatis, spicis florigeris vaginis calvis, truncatis*. *Hall. hist.*, n. 1554

Hydropiper: *Dodon. kruid-b.* 958; *Dalech. hist.* 1, fol. 907; *Matthiol. in Diosc.* 207; *Fusch. hist.* 842.

Persicaria Hydropiper. *Lobel, kruid-b.*, fol. 389.

Persicaria urens seu Hydropiper. *Bauh. pin.* 101; *Boerh. hort. lugd.* 87.

Belgicè: *Water-peper*; gallicè: *Curage*, *Poivre d'eau*. Juxta aquas mœniorum, etc. Augusto floret.

334. *P. PERSICARIA*. Floribus hexandris, digynis, spiciis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis. *Linn. sp. pl.* 361, n. 11; *Scop. fl. carn. sp.* 468; *Blakw. herb. tab.* 118.

Persicaria foliis ovato-lanceolatis, subhirsutis, spiciis ovatis, vaginis ciliatis. *Hall. hist.*, n. 1557. (Polygonum tomentosum, *ejusd.*, n. 1556).

Persicaria mitis maculosa (et non maculosa). *Lobel, kruid-b.* 389; *Bauh. pin.* 101; *Boerh. hort. lugd.* 87, n. 1—5; *Tourn. inst.* 509; *Bauh. hist.* 3, fol. 779.

Persicaria. *Dodon. kruid-b.* 959; *Matthiol. in Diosc.* 107; *Dalech. hist.* 1, fol. 909.

Belgicè: *Persik-kruid*; gallicè: *Persicaire*.

Juxta fossas, vias, prata, etc. Augusto floret. *Foliis angustioribus, maculatis et non maculatis, variat.*

335. *P. BISTORTA*. Caule simplicissimo, monostachio, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Linn. sp. pl.* 359, n. 6; *Blakw. herb. tab.* 854.

Polygonum radice lignosâ, intortâ, spicâ ovatâ, foliorum petiolis alatis. *Hall. hist.*, n. 1562.

Bistorta. *Dodon. kruid-b.* 535; *Lobel, kruid-b.* 360; *Matthiol. in Diosc.* 319; *Dalech. hist.* 2, fol. 177.

Bistorta major. *Bauh. pin.* 192; *Clus. hist. rar.* 69, p. 2; *Boerh. hort. lugd.* 86, n. 1, 2; *Moris. hist.* 2, fol. 585.

Belgicè: *Herts-tonge*; gallicè: *Bistorte*.

Propè *Calevoet*, vulgò *in de Suerweyde*, juxta viam ad *Linkenbeek* ducentem.

336. *P. AVICULARE*. Floribus octandris, trigynis, axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente, herbaceo. *Linn. sp. pl.* 362, n. 15; *Scop. fl. carn. sp.* 471; *Blakw. herb. tab.* 315.

Polygonum procumbens, foliis linearibus, acutis, floribus solitariis. *Hall. hist.*, n. 1560.

Polygonum mas. *Dodon. kruid-b.* 156; *Lobel, kruid-boek* 504; *Dalech. hist.* 2, fol. 25.

*Polygonum* sive *Centinodia*. *Bauh. hist.* 3, fol. 374;  
(*Angustifolium*, *ejusd.* 376).

*Polygonum latifolium* (et brevi angustoque folio).  
*Bauh. pin.* 281; *Boerh. hort. lugd.*, fol. 88, p. 2;  
*Moris. hist.* 2, fol. 591.

Belgicè : *Verkens-gras*; gallicè : *Renouée*.

Juxta vias ubiquè.

337. *P. FAGOPYRUM*. Foliis cordato-sagittatis, caule erectiusculo, inermi, seminum angulis æqualibus. *Linn. sp. pl.* 363, n. 18.

*Polygonum* caule erecto, foliis sagittatis, valvulis integerrimis. *Hall. hist.*, n. 1563.

*Fagopyrum* vulgare erectum. *Tourn. inst.* 511; *Boerh. hort. lugd.* 88, p. 2.

*Fagopyrum* Dodonei. *Lobel, kruyd-b.*, fol. 73, p. 2.

*Fagotriticum*. *Dodon. kruyd-b.*, fol. 824; *Bauh. hist.* 2, fol. 393.

*Erysimum* Theophrasti folio hederaceo. *Bauh. pin.* 27.

Belgicè : *Boekweyd*; gallicè : *Bled sarrasin*.

In arvis seritur.

338. *P. CONVOLVULUS*. Foliis cordatis, caule volubili, angulato, floribus obtusatis. *Linn. sp. pl.* 364, n. 24;  
*Scop. fl. carn. sp.* 469; *Fl. dan. tab.* 744.

*Polygonum* caule volubili, foliis sagittatis. *Hall. hist.*, n. 1561.

*Convolvulum* nigrum. *Dodon. kruyd-b.*, fol. 648.

*Convolvulus* minor semine triangulo. *Bauh. pin.* 295.

*Helxine* semine triangulo. *Bauh. hist.* 2, fol. 157.

*Helxine cissampelos* altera, *Atriplicis* effigie. *Lobel, kruyd-b.* 744.

*Fagopyrum* vulgare scandens. *Tourn. inst.* 511. *Boerh. hort. lugd.* 88.

Belgicè : *Swarte Winde*; gallicè : *Liseron noir*.

In agris inter segetes. Augusto floret.

339. *P. DUMETORUM*. Foliis cordatis, caule volubili, lævi, floribus carinato-alatis. *Linn. syst. veget.* 639, n. 31; *Fl. danic. tab.* 756.

*Polygonum* caule volubili, foliis sagittatis, valvulis seminalibus alatis. *Hall. hist.*, n. 1562.

*Fagopyrum* majus scandens. *Vaill. bot. paris.* 52.

Belgicè : *Bosch-winde*; gallicè : *Liseron des bois*.

In sepibus *Etterbeek*, *Vorst*, etc. Julio floret. *Antheræ albæ*.

## TETRAGYNIA.

147. PARIS. Calix quadriphyllus, petala quatuor angustiora; bacca quadrilocularis.
340. *P. QUADRIFOLIA*. Foliis quaternis. *Hall. hist.*, n. 1006; *Scop. fl. carn. sp.* 472; *Blakw. herb. tab.* 286. Herba Paris. *Dodon. kruid-b.* 728; *Lobel, kruid-b.* 325; *Matthiol. in Diosc.* 355; *Boerh. hort. lugd.* 72; *Bauh. hist.* 3, fol. 613; *Tourn. inst.* 233; *Dalech. hist.* 2, fol. 202.  
*Solanum quadrifolium bacciferum. Bauh. pin.* 167.  
 Belgicè : *Wolfs-beziën*; gallicè : *Raisin de renard*.  
 In sylvis omnibus; fine aprilis floret.
148. ADOXA. Calix trifidus, inferus, persistens; corolla monopetala, quadri-aut-quinquesida, supera; bacca quadri-aut-quinquelocularis, cum calice coalita.
341. *A. MOSCHATELLINA*. *Linn. syst. veget.* 643; *Gouan, hort. monsp.* 200; *Fl. dan. tab.* 94.  
*Moschatella adoxa. Scop. fl. carn. sp.* 473.  
*Moschatellina. Hall. hist.*, n. 1005; *Tourn. inst.* 156.  
*Moschatellina foliis Fumariæ bulbosæ. Boerh. hort. lugd.* 72; *Bauh. hist.* 3, fol. 206.  
*Ranunculus minimus septentrionalium*, herbido muscoso flore. *Lobel, kruid-b.*, fol. 820.  
*Ranunculus nemorosus maschatellina dictus. Bauh. pin.* 178.  
 Belgicè : *Muscus-kruid*; gallicè : *Muscatelle*.  
 In sepibus et dumetis *Etterbeek, etc.*, fine aprilis floret. *Stamina* 8, *styli* 4, *in flore terminali*; *laterales*  $\frac{1}{2}$  *numeri addunt*.
149. QUERCUS. Flores *monoici*, corolla nulla. *Masc.* Calix quinque-aut-septemfidus, stamina quinque ad decem. *Fem.* Calix monophyllus, integerrimus, scaber, styli duo aut quinque; nux ovata, coreacea, monosperma, unilocularis.
342. *Q. ROBUR*. Foliis petiolatis, oblongis, supernè latioribus, sinubus acutioribus, angulis obtusis, fruc-



tubus subsessilibus. *Linn. sp. pl.* 996, n. 12; *Scop. fl. carn. sp.* 1184.

*Quercus vulgaris*. *Lobel, kruyd-b.*, fol. 185, 186, p. 2.

*Quercus saliva*. *Dodon. kruyd-b.* fol. 1290.

*Quercus latifolia*, (mas et femina). *Bauh. pin.* 419; *Boerh. hort. lugd.* 177, n. 1—3; *Dalech. hist.* 1, fol. 2.

Belgicè : *Eyken-boom*; gallicè : *Chêne*.

Juxta vias, etc.

150. *MYRIOPHYLLUM*. Flores *monoïci*, calix monophyllus, quadridentatus; petala quatuor unguiculata, caduca, stylus nullus, semina quatuor corticata.

343. *M. SPICATUM*. Caule ramoso, spicis terminalibus nudis, interruptis, floribus bracteatis, foliis pinnatis, capillaribus. *Linn. sp. pl.* 992, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 1180.

*Pentapteris spicâ nudâ*. *Hall. hist.*, n. 993.

*Millefolium aquaticum pennatum, spicatum*. *Bauh. prodr.* 73; *Moris. hist.* 3, fol. 622.

*Millefolium pennatum aquaticum*. *Bauh. hist.* 3, fol. 783.

*Potamogeton foliis pennatis*. *Tourn. inst.* 233; *Boerh. hort. lugd.* 197, n. 10.

Belgicè : *Water-duyzend-blad*; gallicè : *Mille-feuille aquatique*.

In aquis mœniorum, in stagnis, etc. Julio floret.

344. *M. VERTICILLATUM*. Caule simplici, floribus verticillatis, hermaphroditis, foliis pinnatis, pinnis linearibus. *Linn. sp. pl.* 992, n. 2.

*Pentapteris, floribus alaribus*. *Hall. hist.*, n. 992.

*Myriophyllum aquaticum minus*. *Clus. hist. rar.*, fol. 252.

*Millefolium aquaticum, flosculis ad foliorum nodos*. *Bauh. pin.* 141.

*Potamogeton flosculis ad foliorum nodos*. *Tourn. inst.* 233; *Boerh. hort. lugd.* 197.

Belgicè : *Kleyn Water-duyzend-blad*.

In fossâ juxta ambulacrum *Laken*. Junio floret.



## CLASSIS NONA.

### ENNEANDRIA.

#### DIGYNIA.

151. **MERCURIALIS.** Flores *dioici* absque corollâ; calix tripartitus. *Masc.* Stamina novem ad duodecim, antheræ globosæ, didymæ. *Fem.* Capsula bicocca, bilocularis, monosperma.
345. **M. PERENNIS.** Caule simplicissimo, foliis scabris. *Linn. sp. pl.* 1035, n. 1; *Gouan, hort. monsp.* 507. Mercurialis caule perenni, simplici; foliis ovato-lanceolatis, hirsutis. *Hall. hist.*, n. 1601. Mercurialis Cynocrambe. *Scop. fl. carn. sp.* 1225. Mercurialis sylvestris. *Dodon. kruid-b.* 1029; *Lobel, kruid-b.* 315; *Dalech. hist.* 2, fol. 494. Mercurialis montana spicata. *Bauh. pin.* 122; *Boerh. hort. lugd.* 106, p. 2. Cynocrambe. *Matthiol. in Diosc.* 412. *Bauh. hist.* 2, fol. 977, 979. Belgicè: *Wild Bingel-kruid*; gallicè: *Chou de chien*. In sylvâ Soniæ, vulgò in *den Reygers-bosch*, etc. Junio floret.
346. **M. ANNUA.** Caule brachiato, foliis glabris, floribus spicatis. *Linn. sp. pl.* 1035, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 1226; *Blakw. herb. tab.* 162. Mercurialis caule annuo, brachiato, foliis glabris, conjugatis, ovato-lanceolatis. *Hall. hist.*, n. 1600. Mercurialis mas et femina. *Dodon. kruid-b.* 1027; *Lobel, kruid-b.* 313; *Dalech. hist.* 2, fol. 493; *Bauh. hist.* 2, fol. 977. Mercurialis testiculata et spicata. *Bauh. pin.* 121. *Boerh. hort. lugd. fol.* 160, p. 2, n. 1, 2. Belgicè: *Bingel-kruid*, rusticis *Schyt-kruid*; gallicè: *Mercuriale*. Ad margines, sub sepibus ubiquè.

## HEXAGYNIA.

152. BUTOMUS. Involucrum simplex, triphyllum; petala sex; capsulæ sex polyspermæ; semina utrinquè obtusa.

347. *B. UMBELLATUS*. *Linn. syst. veget.* 654; *Hall. hist.*, n. 1186; *Scop. fl. carn. sp.* 475.  
*Gladiolus aquatilis*. *Dodon. kruid-b.* 950.  
*Juncus cyperoïdes floridus, paludosus*. *Lobel, kruid-boek, fol.* 120.  
*Juncus floridus major*. *Bauh. pin.* 12.  
*Juncus floridus*. *Bauh. hist.* 2, *fol.* 524; *Dalech. hist.* 1, *fol.* 862.  
*Butomus flore roseo, albo et purpureo*. *Tourn. inst.* 271; *Boerh. hort. lugd.* 199, n. 1—3.  
 Belgicè : *Bloembiezen*; gallicè : *Jonc fleuri*.  
 In aquis canalis, mæniorum, etc. Junio floret; perennis.

153. HYDROCHARIS. Flores dioïci, calix trifidus; corolla tripetala. *Masc.* Spatha diphylla, filamenta tria interiora stylifera. *Fem.* Capsula sex-locularis, polysperma, infera.

348. *H. MORSUS - RANÆ*. *Linn. syst. veget.* 654; *Hall. hist.*, n. 1068; *Fl. danic. tab.* 878.  
*Morsus ranæ*. *Dodon. kruid-b.* 924; *Lobel. kruid-b.* 705.  
*Nymphæa minor, sive Morsus ranæ*. *Bauh. hist.* 3, *fol.* 773.  
*Nymphæa flore minimo tripetalo albo*. *Moris. hist.* 3, *fol.* 513.  
*Microleuconymphæa quæ Nymphæa alba minima*. *Boerh. hort. lugd. fol.* 282.  
 Belgicè : *Vorschen-beet*; gallicè : *Petit Nénuphar*.  
 In aquis limosis ubique. Augusto floret.

---

## CLASSIS DECIMA.

---

### DECANDRIA.

---

#### MONOGYNIA.

154. **PYROLA.** Calix quinquepartitus; petala quinque; capsula quinquelocularis, angulis dehiscentis; semina arillata.
349. *P. ROTUNDIFOLIA.* Stamina adscendentibus, pistillo declinato. *Linn. sp. pl.* 396, n. 1; *Blakw. herb. tab.* 594.  
*Pyrola foliis subrotundis, tubis recurvis. Hall. hist. n.* 1010.  
*Pyrola rotundifolia major. Bauh. pin.* 191; *Boerh. hort. lugd.* 278; *Tourn. inst.* 256.  
*Pyrola vulgarior. Clus. hist. rar., fol.* 116.  
*Pyrola. Dodon. kruid-b.* 200; *Lobel, kruid-b.* 363; *Bauh. hist.* 3, fol. 535; *Dalech. hist.* 1, fol. 728.  
 Belgicè : *Wintergroen*; gallicè : *Pyrole*.  
 In sylvis propè *Vorst, Terkameren, etc.* Julio floret.

---

#### DIGYNIA.

155. **CHRYSOSPLENIUM.** Calix coloratus, quadrifidus; corolla nulla; capsula birostris, unilocularis, polysperma, seminifera; semibivalvis.
350. *C. ALTERNIFOLIUM.* Foliis alternis. *Linn. sp. pl.* 398, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 487; *Hall. hist., n.* 1548.  
*Chrysosplenium foliis minoribus, subrotundis. Tourn. inst.* 146. *Boerh. hort. lugd.* 95, p. 2.  
*Saxitraga aurea, foliis pediculis oblongis insidentibus. Raij, hist.* 206.  
*Sedum palustre luteum majus, foliis pediculis longis insidentibus. Moris, hist.* 3, fol. 477, tab. 8, fig. 8.

Belgicè : *Kleyne-gulde Steenbreëk*; gallicè : *Petite Saxifrage dorée*.

In nemoribus. *Vorst* ponè *het Vossegat*, etc. sequenti frequentior.

351. *C. OPPOSITIFOLIUM*. Foliis oppositis. *Linn. sp. pl.* 398, n. 2; *Hall. hist.*, n. 1549.

*Chrysosplenium*, foliis amplioribus auriculatis. *Tourn. inst.* 146.

*Saxifraga aurea*. *Dodon. kruyd-b. fol.* 508.

*Saxifraga aurea*, Lichenis facie. *Lobel. kruyd-b.* 728.

*Saxifraga Romanorum*. *Dalech. hist.* 2, fol. 17.

*Saxifraga rotundifolia aurea*. *Bauh. pin.* 309.

*Sedum palustre luteum*, foliis subrotundis, sessilibus. *Moris. hist.* 3, fol. 477, tab. 8, fig. 7.

Belgicè : *Gulde Steenbreëk*; gallicè : *Saxifrage dorée*.  
In locis precedentis cujus nimium affinis.

*Stamina* 8 et 10 vidi.

156. *SAXIFRAGA*. Calix quinquedentatus; corolla pentapetala; capsula infera, birostris, bilocularis, polysperma, inter stylos foramine dehiscens.

352. *S. GRANULATA*. Foliis caulinis reniformibus, lobatis, caule ramoso, radice granulata. *Linn. syst. veget.* 706, n. 28; *Blakw. herb. tab.* 56; *Fl. dan. tab.* 514.

*Saxifraga* foliis radicalibus reniformibus, obtuse dentatis, caulinis palmatis. *Hall. hist.*, n. 976.

*Saxifraga alba*. *Dodon. kruyd-b.* 507. *Lobel, kruyd-b.* 717.

*Saxifraga alba Fuschii*. *Dalech. hist.* 2, fol. 16.

*Saxifraga rotundifolia alba*. *Bauh. pin.* 339; *Boerh. hort. lugd.* 222. *Tourn. inst.* 252.

*Saxifraga alba*, granulosa radice. *Bauh. hist.* 3, fol. 706.

Belgicè : *Witte Steenbreëk*; gallicè : *Saxifrage blanche*.  
In pratis *St. Gillis* juxtâ plateam ad *Vorst* ducentem. *Maior* floret.

353. *S. TRIDACTYLIDES*. Foliis caulinis cuneiformibus, trifidis, alternis, caule erecto, ramoso. *Linn. sp. pl.* 404, n. 25; *Scop. fl. carn. sp.* 500.

*Saxifraga* foliis petiolatis, trilobatis, caule erecto ramoso et folioso. *Hall. hist.*, n. 986.

*Saxifraga verna*, annua, humilior. *Tourn. inst.* 252.

*Paronichia altera*. *Dodon. kruid-b.* 155.

*Paronichia rutaceo folio*. *Lobel, kruid-b.* 554; *Blakw. herb. tab.* 212.

*Sedum tridactylides tectorum*. *Bauh. pin.* 285.

*Tridactylides tectorum flore albo*. *Bauh. hist.* 3, *fol.* 762.

Belgicè : *Muer-Steenbreëk*; gallicè : *Petite Saxifrage*.  
Ad muros vetustos, in campis arenosis, etc. Primo  
vere floret.

157. **SCLERANTHUS.** Calix monophyllus, semi-  
quinquesfidus, persistens; corolla nulla; semen  
unum calici inclusum.

354. *S. ANNUUS.* Calicibus fructûs patulis inermibus. *Linn.*  
*sp. pl.* 406, n. 1.

*Scleranthus floribus patulis*. *Hall. hist.*, n. 1551.

*Knawel annuum*. *Scop. fl. carn. sp.* 501.

*Polygonum minus alterum*. *Tabern. icon. pl.* 505, p. 2.

*Alchemilla supina*, gramineo folio, flore minore.  
*Tourn. inst.* 508.

Belgicè : *Knawel*; gallicè : *Gnavelle*.

In arvis ubiquè. Julio et augusto floret.

355. *S. PERENNIS.* Calicibus fructûs clausis. *Linn. sp.*  
*pl.* 406, n. 2.

*Scleranthus floris segmentis erectis*. *Hall. hist.*, n. 1550.

*Knawel incanum*, flore majore, pereunc. *Raij. hist.* 3.  
*fol.* 160.

*Knawel*. *Dodon. kruid-b.* 158; *Boerh. hort. lugd.* 93,  
n. 2.

*Alchemilla gramineo folio*, flore majore. *Tourn. inst.*  
508.

Belgicè : *Kreupel-gras*, gallicè : *Gnavelle vivace*.

Propè Berghem, Calevoort, Dachelberg, in apricis  
arenosis. *Præcedenti*, rarior.

158. **SAPONARIA.** Calix monophyllus, nudus, per-  
sistens; petala quinque unguiculata; capsula ob-  
longa, unilocularis.

356. *S. OFFICINALIS.* Calicibus cylindricis; foliis ovato-  
lanceolatis. *Linn. sp. pl.* 408, n. 1.

*Saponaria foliis ovato-lanceolatis, trinerviis, floribus tubulosis, umbellatis. Hall. hist., n. 908.*

*Lychnis officinalis. Scop. fl. carn. sp. 510.*

*Saponaria. Dodon. kruyd-b. 270; Lobel, kruyd-b. 388.*

*Saponaria major lævis. Bauh. pin. 206; Dalech. hist., fol. 711.*

*Saponaria vulgaris. Blakw. herb. tab. 113; Bauh. hist. 3, fol. 357.*

Belgicè : *Seep-kruyd*; gallicè : *Saponaire*.

Ad margines *Ever, Schaerbeek, etc.* Julio florens; perennis.

159. **DIANTHUS.** Calix cylindricus, monophyllus, basi squamis quatuor; petala quinque unguiculata; capsula cylindrica, unilocularis.

357. *D. ARMERIA.* Floribus aggregatis, fasciculatis, squamis calicinis lanceolatis, villosis, tubum æquantibus.

*Linn. sp. pl. 409, n. 3; Gouan, hort. monsp. 213.*

Tunica floribus umbellatis, squamis calicinis hirsutis, mucronatis, tubum æquantibus. *Hall. hist., n. 900.*

*Caryophyllus barbatus sylvestris. Bauh. pin. 209.*

*Viola barbata angustifolia. Bauh. hist. 3, fol. 335.*

*Armeria sylvestris altera. Lobel, kruyd-b. 534.*

Belgicè : *Wilde Keykens*; gallicè : *OEillet sauvage*.

Ad margines *Laken, Ganshoren, Curegem, etc.* Julio florens; perennis.

358. *D. PROLIFER.* Floribus aggregatis, capitatis, squamis calicinis ovatis, obtusis, muticis, tubum æquantibus. *Linn. sp. pl. 410, n. 4; Gouan, hort. monsp. 213.*

Tunica capitulo compacto, ovali, calice universali quadrifolio. *Hall. hist., n. 901.*

Tunica prolifera. *Scop. fl. carn. sp. 503.*

*Armeria prolifera. Lobel, kruyd-b., fol. 534.*

*Caryophyllus sylvestris prolifer. Bauh. pin. 209.*

*Betonica coronaria, squamosa, sylvestris. Bauh. hist., 3, fol. 335.*

Belgicè : *Kinderkens*.

Inter *Schaerbeek* et *Ever*, vulgò in *d'Esch-stræet, etc.* Julio florens.

359. *D. DELTOIDES.* Floribus solitariis, squamis calicinis lanceolatis binis, corollis crenatis. *Linn. sp. pl. 411, n. 7.*

*Caryophyllus minor*, repens, nostras. *Raij. hist.* 938.  
*Caryophyllus simplex*, supinus, latifolius. *Bauh. pin.* 209.

Belgicè : *Kraey-bloemkens*.

Propè *St.-Lambregts-Woluwe*, in loco dicto *ten Bommel* inveni; florebat fine julii. *Rara*.

160. **CUCUBALUS**. Calix inflatus, petala quinque unguiculata, absque coronâ ad faucem; capsula bilocularis.

360. *C. BEHEN*. Calicibus subglobosis, glabris, reticulato-venosis, corollis subnudis. *Linn. sp. pl.* 414, n. 2; *Fl. dan. tab.* 857.

Viscago caule brachiato, nodoso, calicibus inflatis, venosis. *Hall. hist.*, n. 913.

*Lychnis behen*. *Scop. fl. carn. sp.* 514.

*Papaver spumeum*. *Lobel. kruid-b.*, fol. 414.

*Behen album*. *Dodon. kruid-b.*, fol. 258.

*Melandrium Plinii* quorundam. *Clus. hist. rar.*, fol. 293.

*Behen album officinarum*. *Bauh. hist.* 3, fol. 356.

*Lychnis sylvestris*, quæ *Behen album* vulgò. *Bauh. pin.* 205; *Moris. hist.* 2, fol. 535; *Boerh. hort. lugd.* 211.

Belgicè : *Wit-behen*; gallicè : *Carnillet blanc*.

In arenosis propè *Uccle*, *Bootendael*, etc. Julio et augusto floret; perennis.

161. **STELLARIA**. Calix pentaphyllus, patens; petala quinque, bipartita; capsula unilocularis, polysperma.

361. *S. HOLOSTEA*. Foliis lanceolatis, serrulatis, scabris; petalis semi-bifidis. *Linn. sp. pl.* 422, n. 4; *Scop. fl. carn. sp.* 534; *Fl. dan. tab.* 698.

*Alsine* foliis gramineis, ciliatis. *Hall. hist.*, n. 884.

*Holostium Ruellii*. *Lobel. kruid-b.* fol. 58.

*Gramen Leucanthemum*. *Dodon. kruid-b.* 895; *Dalech. hist.* 1, fol. 353.

*Lychnis arvensis* glabra, flore majore. *Boerh. hort. lugd.* 214.

*Alsine pratensis*, gramineo folio, ampliore. *Tourn. inst.* 243.



Gramen Fuschii, sive Leucanthemum. *Bauh. hist.* 3, fol. 561.

Belgicè : *Oogentroost-gras* ; gallicè : *Stellaire commune*.

Ad margines inter fruteta. Perennis, sine maio florens.

361. *S. ULIGINOSA*. Foliis lanceolatis, basi ciliatis, caule angulato, diffuso, procumbente, ramosissimo, pedunculis ternis, intermedio unifloro, lateralibus dichotomis paucifloris. *Linn. syst. veget.* 718, n. 8.

*Stellaria aquatica*. *De la March, fl. franc.* 3, fol. 49.

*Alsine folio gramineo, angustiore, palustris*. *Dillen. app.* 69.

In uliginosis sylvæ *Vorst*, propè *het Vosse-gat*. *Julio florens*.

363. *S. GRAMINEA*. Foliis linearibus, integerrimis, floribus paniculatis. *Linn. sp. pl.* 422, n. 5 ; *Scop. fl. carn. sp.* 535 ; *Fl. dan. tab.* 414, 415.

*Lychnis arvensis glabra, flore minore*. *Moris. hist.* 2, fol. 546 ; *Boerh. hort. lugd.* 214.

*Gramen floridum minus*. *Tabern. icon. pl.* 667, p. 2.  
*Caryophyllus arvensis glaber, flore minore*. *Bauh. pin.* 210.

*Alsine foliis lanceolatis, lineatis, petiolis ramosis*. *Hall. hist. n.* 882.

Belgicè : *Kleyn Christus-oog*.

In locis siccis *Schaerbeek*, etc. *Junio florens ; perennis*.

162. *ARENARIA*. Calix pentaphyllus, patens ; petala quinque integra ; capsula unilocularis, polysperma.

364. *A. TRINERVIA*. Foliis ovatis, acutis, nervosis, petiolatis. *Linn. syst. veget.* 719, n. 3 ; *Fl. dan. tab.* 329.

*Alsine foliis ovato-lanceolatis, trinerviis*. *Hall. hist., n.* 878.

*Alsine plantaginis folio*. *Bauh. hist.* 3, fol. 364 ; *Tourn. inst.* 242.

*Alsine media, sive tertia*. *Tabern. icon. pl.* 382, p. 2.

In sylvâ *Vorst*, etc. *Maio floret ; annua*.

365. *A. SERPILLIFOLIA*. Foliis subovatis, acutis, sessi-

- libus, corollis calice brevioribus. *Linn. syst. veget.* 719, n. 9; *Gouan. hort. monsp.* 218.  
 Alsine foliis ovato-lanceolatis, subhirsutis, petalis calice brevioribus. *Hall. hist.*, n. 875.  
*Stellaria serpillifolia. Scop. fl. carn. sp.* 544.  
*Alsine minima. Dodon. kruid-b.* 37; *Lobel, kruid-b.* 546.  
*Alsine minor multicaulis. Bauh. pin.* 251; *Boerh. hort. lugd.* 209, n. 4.  
 Belgicè : *Kleyn Vogelkruid.*  
 In hortis inter olera. Junio florens; biennis.
366. *A. RUBRA.* Foliis filiformibus, oppositis, stipulis membranaceis, vaginantibus, caulibus prostratis, calicibus capsulis æqualibus. *Linn. syst. veget.* 721, n. 34.  
*Alsine foliis linearibus, stipulis ovato-lanceolatis, argenteis. Hall. hist.*, n. 872.  
*Spergula purpurea. Bauh. hist.* 3, fol. 722.  
*Spergula marina nostras. Raij. hist.* 1034.  
*Spergula minor, flosculo subcærulæo. Bauh. pin.* 251, *prodrom.* 119; *Boerh. hort. lugd.* 209, n. 7.  
 Belgicè : *Rode Weed*; gallicè : *Sabline rouge.*  
 Ad margines arborum, propè *Randsvoort.* Julio florens; annua.
367. *A. TENUIFOLIA.* Foliis subulatis, caule paniculato, capsulis erectis, petalis lanceolatis calice brevioribus. *Linn. sp. pl.* 424, n. 8; *Fl. dan. tab.* 389; *Gouan. hort. monsp.* 219.  
*Alsine tenuifolia. Bauh. hist.* 3, fol. 364; *Tourn. inst.* 243; *Vaill. bot. par. tab.* 5, fig. 1.  
 Inter *Schaerbeek* et *Elmet*, vulgò in *d'Hamstraet*, in sylvâ *Vorst*, etc. Rara.

## PENTAGYNIA.

163. *SEDUM.* Calix quinquefidus, corollâ pentapetala; squamæ nectariferæ quinque ad basin germinis; capsulæ quinque discretæ, leguminosæ.
368. *S. TELEPHIUM.* Foliis planiusculis, serratis, corymbo folioso, caule erecto. *Linn. sp. pl.* 430, n. 2; *Blakw. herb. tab.* 191; *Scop. fl. carn. sp.* 553.

*Telephium vulgare.* *Bauh. pin.* 287; *Moris. hist.* 3, fol. 467.

*Telephium secundum (et quintum).* *Clus. hist. rar.* 66, 67, p. 2.

*Crassula.* *Dodon. kruid-b.* 287; *Lobel, kruid-b.* 473.

*Telephium floribus purpureis.* *Lobel, loc. cit.*

*Anacampseros purpurea.* *Bauh. hist.* 3, fol. 682.

Belgicè : *Wonden-kruid*; gallicè : *Reprise*.

Ad margines sylvarum *Linthout, Lorbeek, etc.* Augusto florens; perennis.

369. *S. REFLEXUM.* Foliis subulatis, sparsis, basi solutis, inferioribus recurvatis. *Linn. sp. pl.* 431, n. 8; *Fl. dan. tab.* 113.

*Sedum* foliis semiteretibus, acutis, aristatis, caule supremo multifido, umbellato. *Hall. hist.*, n. 967.

*Sedum minus luteum*, folio acuto. *Bauh. pin.* 283; *Boerh. hort. lugd.* 286.

*Sedum minus quintum.* *Clus. hist. rar.*, fol. 60.

*Sedum minus.* *Dodon. kruid-b.*, fol. 183.

*Aizoon hematoïdes.* *Lobel, kruid-b.* 461.

Belgicè : *Kleyn Donder-blad*; gallicè : *Orpin*.

In fossis mœniorum, propè portam Namurci. Perennis; julio florens.

370. *S. ALBUM.* Foliis oblongis, obtusis, teretiusculis, sessilibus, patentibus, cymâ ramosâ. *Linn. sp. pl.* 432, n. 10; *Scop. fl. carn. sp.* 556; *Blakw. herb. tab.* 428.

*Sedum* caule glabro, foliis teretibus, umbellis ramosis, floribus petiolatis. *Hall. hist.*, n. 959.

*Sedum minus primum.* *Clus. hist. rar.* 59, p. 2.

*Sedum minus*, teretifolium, album. *Bauh. pin.* 283.

*Vermicularis.* *Dodon. kruid-b.* 184; *Lobel, kruid-b.* 460.

Belgicè : *Bladeloos*, gallicè : *Trique-madame*.

In siccis *Schaerbeek, Elmet, etc.* Perennis; julio florens.

371. *S. ACRE.* Foliis subovatis, adnato-sessilibus, gibbis, erectiusculis, alternis, cymâ trifidâ. *Linn. sp. pl.* 432, n. 11.

*Sedum* foliis conicis, confertis, caulibus ramosis, supremis trifidis. *Hall. hist.*, n. 966.

*Sedum minus causticum octavum.* *Clus. hist. rar.* 61, p. 2.

*Sedum parvum acre*, flore luteo. *Bauh. hist.* 3, fol. 694.

*Sempervivum tertium. Dodon. kruyd-b., fol. 185.*  
*Sempervivum minimum. Lobel, kruyd-b. 462.*  
 Belgicè : *Muer-peper* ; gallicè : *Orpin brûlant.*  
 Ad muros mœniorum marginesque sicciscimos. Perrennis ; junio florens.

164. *OXALIS.* Calix pentaphyllus ; petala unguibus connexa ; capsula angulis dehiscens , pentagona.

372. *O. ACETOSELLA.* Scapo unifloro, foliis ternatis, foliolis obcordatis, pilosis. *Linn. sp. pl. 433, n. 1.*  
*Oxys scapo unifloro, foliis ternatis, radice squamoso-articulatâ. Hall. hist., n. 928 ; Scop. fl. carn. sp. 561.*  
*Trifolium acetosum. Dodon. kruyd-b. 918 ; Bauh. pin. 330.*  
*Oxys pliniana. Lobel, kruy-b., fol. 38, p. 2.*  
*Oxys flore albo. Tourn. inst. 88.*  
 Belgicè : *Koekkoekx-brood* ; gallicè : *Pain de Coucou.*  
 Propè sylvam *Linthout*, juxta viam ad *Roodebeek* ducentem. Maio floret.

373. *O. CORNICULATA.* Caule herbaceo, decumbente, pedunculis umbelliferis, foliis ternatis, foliolis obcordatis. *Linn. sp. pl. 435, n. 11.*  
*Oxys caule ramoso, diffuso, petiolis alaribus, paucifloris, umbellatis. Hall. hist., n. 929.*  
*Oxys corniculata. Scop. fl. carn. sp. 562.*  
*Oxys lutea corniculata. Lobel, kruyd-b. 38, p. 2.*  
*Oxys flavo flore. Clus. hist. rar., fol. 249, p. 2.*  
*Trifolium acetosum flore luteo. Dodon. kruyd-b., 919.*  
*Trifolium acetosum corniculatum. Bauh. pin. 330.*  
 Belgicè : *Geële Koekkoekx-bloem* ; gallicè : *Alleluia.*  
 In hortis inter olera ubiquè. Junio floret ; annua.

165. *AGROSTEMMA.* Calix monophyllus, coriaceus ; petala quinque unguiculata limbo obtuso indiviso ; capsula unilocularis.

374. *A. GITHAGO.* Hirsuta, calicibus corollam æquantibus, petalis integris nudis. *Linn. sp. pl. 435, n. 9 ; Fl. dan. tab. 576.*  
*Lychnis calicibus longissimè caudatis. Hall. hist., n. 926.*  
*Lychnis Githago. Scop. fl. carn. sp. 527.*

*Lychnis Segetum major.* *Bauh. pin.* 204; *Boerh. hort. lugd.* 210.

*Nigellastrum.* *Dodon. kruid-b.* 260; *Lobel, kruid-b.* 48; *Dalech. hist.* 1, *fol.* 368.

Belgicè : *Koren-roos*, *Negel-bloem*; gallicè : *Nielle de bled*.

In arvis inter triticum et secale. Junio floret; annua.

166. **LYCHNIS.** Calix monophyllus, oblongus, lævis; petala quinque unguiculata limbo sub bifido; capsula quinquelocularis.

375. *L. Dioica.* Floribus dioicis. *Linn. sp. pl.* 437, n. 6; *Scop. fl. carn. sp.* 530; *Hall. hist.*, n. 922.

*Lychnis sylvestris.* *Lobel, kruid-b.* 410; *Dodon. kruid-b.* 255, 256.

*Melandrium Plinii genuinum.* *Clus. hist. rar.* 294.

*Ocymoides album et purpureum.* *Bauh. hist.* 3, *fol.* 343.

*Lychnis sylvestris alba et purpurea.* *Bauh. pin.* 204.

Belgicè : *Wilde Christus-oog*; gallicè : *Passefleur sauvage*.

Ad margines ubique. Flore albo et rubro variat. *Capsula unilocularis.*

376. *L. Flos-cuculi.* Petalis quadrifidis, fructu subrotundo. *Linn. sp. pl.* 436, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 528; *Hall. hist.*, n. 921.

*Lychnis pratensis.* *Boerh. hort. lugd.* 213, n. 46—49.

*Odontites Plinii, simplici (et pleno) flore.* *Clus. hist. rar.* 292, 293.

*Armerius sylvestris.* *Dodon. kruid-b. fol.* 267.

*Armoraria pratensis.* *Lobel, kruid-b. fol.* 536.

*Flos-cuculi, Odontitis quibusdam.* *Bauh. hist.* 3, *fol.* 347.

Belgicè : *Wilde Tuylkens*; gallicè : *Lampette*.

In pratis humidis. Junio floret; perennis.

167. **CERASTIUM.** Calix pentaphyllus, petala bifida; capsula unilocularis, apice dehiscens.

377. *C. Vulgatum.* Caulibus diffusis, foliis ovatis, petalis calice æqualibus, capsulis oblongis. *Linn. syst. veget.* 737, n. 3.

*Myosotis foliis ovato-lanceolatis, petalis calicis longitudine. Hall. hist., n. 893.*

*Alsine hirsuta, magno flore. Bauh. pin. 251.*

*Alsine spuria tertia. Dodon. kruid-b. fol. 38.*

*Myosotis arvensis hirsuta, parvo albo flore. Vaill. bot. par. 142; tab. 30, fig. 1.*

*Auricula muris quorundam, flore parvo, vasculo tenui, longo. Bauh. hist. 3, fol. 359.*

Belgicè : *Valsche Muysen-oor.*

In arvis pratisque. Junio floret; annua.

378. *C. Viscosum.* Caule erecto, villos-viscosum, capsulis oblongis. *Linn. sp. pl. 438, n. 4.*

*Holostium caryophyllæum arvense. Tabern. icon. pl. 668, p. 1.*

*Myosotis hirsuta et viscosa. Hall. hist., n. 895.*

*Myosotis hirsuta altera, viscosa. Tourn. inst. 245; Vaill. bot. par. 142, tab. 30, fig. 3.*

*Alsine spuria quarta. Dodon. kruid-b. fol. 38.*

*Alsine altera, viscosa, hirsuta. Bauh. pin. 251.*

*Alsine altera, hirsuta, viscosa, foliis longis, saturatius virentibus. Moris. hist. 2, fol. 551.*

Belgicè : *Lym.*

Ad margines *Schaerbeek, etc.* Annua; maio florens.

379. *C. ARVENSE.* Foliis lineari-lanceolatis, obtusis, glabris, corollis calice majoribus. *Linn. sp. pl. 438, n. 5.*

*Myosotis foliis lineari-lanceolatis, petalis calice duplo longioribus. Hall. hist., n. 889.*

*Centunculus arvensis. Scop. fl. carn. sp. 548.*

*Caryophyllus holostius. Lobel, kruid-b., fol. 532.*

*Caryophyllus arvensis hirsutus flore majore. Bauh. pin. 210.*

*Myosotis arvensis hirsuta flore majore. Vaill. paris. 141, tab. 3, fig. 4.*

Belgicè : *Witte wilde Genoffelkens.*

Ad margines *St.-Gillis, Anderlegt, etc.* Perennis; maio florens.

380. *C. AQUATICUM.* Foliis cordatis, sessilibus, floribus solitariis, capsulis subrotundis, pendulis. *Linn. sp. pl. 439, n. 12.*

*Alsine foliis ovato-cordatis, imis petiolatis, tubis quinatis. Hall. hist., n. 885.*

*Stellaria aquatica. Scop. fl. carn. sp. 546.*

*Alsine major. Bauh. pin. 20.*

*Alsine maxima.* *Lobel, kruid-b., fol. 544.*

*Hippia major.* *Dodon. kruid-b., fol. 36.*

Belgicè : *Groote Muer.*

*Juxta aquas in locis umbrosis. Perennis; aprili florens.*

168. SPERGULA. Calix pentaphyllus; petala quinque integra; capsula ovata, quinquelocularis, quinquevalvis.

381. *S. ARVENSIS.* Foliis verticillatis, floribus decandris.

*Linn. sp. pl. 440, n. 1.*

*Alsine foliis verticillatis, seminibus rotundis. Hall. hist., n. 873.*

*Stellaria arvensis. Scop. fl. carn. sp. 542.*

*Alsine Spergula dicta major. Bauh. pin. 251; Boerh. hort. lugd. 209; Moris. hist. 2, fol. 551.*

*Spergula. Dodon. kruid-b. 859; Bauh. hist. 3, 722.*

*Spergula sagina. Lobel, kruid-b., fol. 978.*

Belgicè : *Spuerie*; gallicè : *Spargoute.*

*In arvis post messem ubique. Septembri floret; annua. Stamina 5—10.*

382. *S. NODOSA.* Foliis oppositis, subulatis, lævibus, caulibus simplicibus. *Linn. syst. pl. 738, n. 4; Gouan, hort. monsp. 225.*

*Alsine foliis superioribus fasciculatis, imis conjugatis. Hall. hist., n. 871.*

*Stellaria nodosa. Scop. fl. carn. sp. 545.*

*Alsine nodosa germanica. Bauh. pin. 251.*

*Arenaria. Bauh. hist. 3, fol. 720; Raij. hist. 1033.*

Belgicè : *Weed*; gallicè : *Spargoute nouveuse.*

*In arvis propè Woluwe florentem vidi fine augusti; annua.*



---

## CLASSIS UNDECIMA.

---

### DODECANDRIA.

---

#### MONOGYNIA.

169. **LYTHRUM.** Calix dodecafidus, petala sex oblonga, calici inserta; capsula oblonga, bilocularis, polysperma.
383. *L. SALICARIA.* Foliis oppositis, cordato-lanceolatis, floribus spicatis, dodceandris. *Linn. sp. pl.* 446, n. 1; *Blakw. herb. tab.* 520; *Scop. fl. carn. sp.* 565.
- *Salicaria* foliis lanceolatis, subhirsutis, floribus spicatis. *Hall. hist.*, n. 854.
- Lysimachia purpurea communis major.* *Clus. hist. rar.* 51.
- Lysimachia purpurea.* *Lobel, kruid-b.*, fol. 416.
- Lysimachium purpureum.* *Dodon. kruid-b.*, 117.
- Lysimachia spicata, purpurea.* *Bauh. pin.* 246.
- Belgicè : *Partyke*; gallicè : *Salicaire*.
- Juxta rivulos ubique. Perennis; julio et augusto florens.
170. **PORTULACA.** Corolla pentapetala; calix bifidus; capsula unilocularis, circumscissa.
384. *P. OLERACEA.* Foliis cuneiformibus, floribus sessilibus. *Linn. sp. pl.* 445, n. 1; *Hall. hist.*, n. 968; *Scop. fl. carn. sp.* 564; *Blakw. herb. tab.* 287.
- Portulaca sativa (et sylvestris).* *Dodon. kruid-b.* 1032; *Lobel, kruid-b.* 471; *Dalech. hist.* 1, fol. 463; *Bauh. pin.* 288; *Moris. hist.* 2, fol. 570.
- Belgicè : *Porceleynne*; gallicè : *Pourpier*.
- In et circa hortos communis. Julio floret; annua.



## DIGYNIA.

171. **CARPINUS.** Flores *monoïci* absque corollâ, calix monophyllus, squama ciliata; in flore *masculo* stamina decem ad quindecim, in *femineo* germina duo, styli in utroque duo; nux ovata, angulosa.
385. **C. BETULUS.** Squamis strobilorum planis. *Linn. syst. nat.* 631; *Scop. fl. carn. sp.* 1189; *Hall. hist. n.* 1627; *Gouan, hort. monsp.* 495.  
*Carpinus.* *Dodon. kruyd-b.* 1315; *Boerh. hort. lugd.* 176, p. 2; *Tourn. inst.* 582.  
*Ostrya Theophrasti.* *Clus. hist. rar., fol.* 55.  
*Fagus sepium vulgo.* *Bauh. hist.* 1, fol. 146.  
 Belgicè : *Hesselter*; gallicè : *Charme*.  
 In sylvis et sepibus ubiquè.
172. **JUGLANS.** Flores *monoïci*. *Masc.* Calix monophyllus, squamiformis; corolla sexpartita, filamenta octodecim. *Fem.* Calix quadrifidus, superus; corolla quadripartita; drupa nucleo sulcato,
386. **J. REGIA.** Foliolis ovalibus, glabris, subserratis, subæqualibus. *Linn. syst. nat.* 630; *Scop. fl. carn. sp.* 1186; *Blakw. herb. tab.* 247.  
*Juglans foliis septenis, ovato-lanceolatis, integerrimis.* *Hall. hist., n.* 1624.  
*Nux juglans.* *Dodon. kruyd-b.* 1277; *Bauh. hist.* 1, fol. 241.  
*Nux juglans, sive regia.* *Bauh. pin.* 417; *Boerh. hort. lugd.* 175, n. 1—5.  
 Belgicè : *Okkernôt-boom*; gallicè : *Noyer*.  
 Ad *Etterbeek, Laken, etc.* Aprili floret.
173. **AGRIMONIA.** Calix monophyllus, quinque-dentatus, altero calice obvallatus; petala quinque, emarginata; semina duo in fundo calicis.
387. **A. EUPATORIA.** Foliis caulinis pinnatis, impari pe-

- tiolato, fructubus hispidis. *Linn. sp. pl.* 448, n. 1;  
*Scop. fl. carn. sp.* 567; *Blakw. herb. tab.* 21.  
*Agrimonia foliis pinnatis, pinnulis alternè minimis.*  
*Hall. hist., n.* 991.  
*Agrimonia officinarum. Lobel, kruid-b.* 841; *Boerh.*  
*hort. lugd.* 79; *Tourn. inst.* 301; *Delamark, fl.*  
*franc.* 3, fol. 477.  
*Eupatorium. Dodon. kruid-b.* 33; *Fusch. hist.* 244;  
*Matthiol. in Diosc.* 335.  
*Eupatorium veterum. Bauh. pin.* 321.  
 Belgicè : *Agrimonie*; gallicè : *Aigremoine*.  
 In umbrosis sylvaticis. Perennis; julio florens.
- 

## TRIGYNIA.

174. FAGUS. Flores *monoïci* absque corollâ. *Masc.*  
 Calix quinquefidus, campanulatus. *Fem.* Calix  
 quadridentatus, in capsulam muricatam, qua-  
 drivalvè, dispermam, abiens.
388. *F. SYLVATICA.* Foliis ovatis, obsolete serratis. *Linn.*  
*syst. veget.* 758, n. 4.  
*Fagus foliis ovato-lanceolatis, ovis undulatis. Hall.*  
*hist., n.* 1622.  
*Castanea Fagus. Scop. fl. carn. sp.* 1188.  
*Fagus. Dodon. kruid-b.* 1303; *Bauh. pin.* 419; *Boerh.*  
*hort. lugd.* 178, p. 2; *Lobel. kruid-b.* 171, p. 2;  
*Matthiol. in Diosc.* 90; *Dalech. hist.* 1, fol. 28.  
 Belgicè : *Bueken-boom*; gallicè *Hêtre*.  
 In sylvis; juxtâ vias, etc. Maio floret. *Stamina* 8—12.
175. RESEDA. Calix monophyllus, partitus; petala  
 laciniata; capsula unilocularis, apice perviâ,  
 polyspermâ.
389. *R. LUTEOLA.* Foliis lanceolatis integris, basi utrin-  
 que unidentatis, calicibus quadrifidis. *Blakw. herb.*  
*tab.* 283; *Fl. dan. tab.* 864; *Linn. syst. veget.* 758,  
 n. 1.  
*Reseda foliis ellipticis, obtuse lanceolatis, undulatis,*  
*calicibus quadrifidis. Hall. hist., n.* 1038.

*Luteola* herba *Salicis* folio. *Bauh. pin.* 100.

*Luteola. Lobel, kruid-b. fol.* 427.

*Lutum* herba. *Dodon. kruid-b. fol.* 109.

*Lutea* *Plinii* quibusdam. *Bauh. hist.* 3, *fol.* 465.

Belgicè : *Wouwe, Geêlkruid* ; gallicè : *Gaude*.

In arvis, ad margines pratorum, etc. Biennis; junio florens.

176. *EUPHORBIA*. Calix monophyllus, ventricosus; corolla tetra-aut-pentapetala, calici insidens; capsula tricocca.

390. *E. PEPLUS*. Umbellâ trifidâ dichotomâ, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis, petiolatis. *Linn. syst. veget.* 763, n. 47; *Bulliard, herb. franc. tab.* 79.

*Tithymalus* foliis rotundis, stipulis floralibus cordatis, petalis argutè corniculatis. *Hall. hist.*, n. 1049.

*Peplus. Dodon. kruid-b.* 611; *Dalech. hist.* 2, *fol.* 523.

*Peplus* seu *Esula* rotunda. *Lobel, kruid-b.* 439; *Bauh. pin.* 292.

Belgicè : *Duyvels-melk*; gallicè : *Petite Tithymale*.

In cultis ubiquè. Annuâ; julio florens.

391. *L. EXIGUA*. Umbellâ trifidâ, dichotomâ; involucellis lanceolatis. *Linn. syst. veget.* 763, n. 49; *Fl. dan. tab.* 592.

*Tithymalus* foliis linearibus, stipulis lanceolatis, aristatis. *Hall. hist.*, n. 1048.

*Esula exigua* *Tragi. Lobel, kruid-b.* 432; *Dalech. hist.* 2, *fol.* 520.

*Tithymalus exiguus erectus. Boerh. hort. lugd.* 257.

*Tithymalus* sive *Esula exigua. Bauh. pin.* 291.

*Tithymalus minimus, angustifolius, annuus. Bauh. hist.* 3, *fol.* 664.

Belgicè : *Kleyn Wetten-kruid* ; gallicè : *Tithymale fluet*.

In agris *Laken. Ever ad St.-Job, etc.* Annuâ; junio florens.

392. *E. HELIOSCOPIA*. Umbellâ quinquesfidâ, trifidâ, dichotomâ, involucellis obovatis, foliis cuneiformi-

bus, serratis. *Linn. syst. veget.* 765, n. 74; *Fl. dan. tab.* 725.

*Tithymalus* foliis petiolatis, subrotundis, serratis, stipulis rotundis, serratis. *Hall. hist.*, n. 1050.

*Tithymalus Helioscopius*. *Scop. fl. carn. sp.* 579; *Dodon. kruid-b.* 601; *Lobel, kruid-b.* 431; *Bauh. pin.* 291.

*Tithymalus* subrotundis foliis, majoribus crenatis. *Boerh. hort. lugd.* 256, n. 18.

Belgicè : *Kroonkens-kruid*; gallicè : *Réveille-matin*; In cultis ubiquè. Annuæ; junio florens.

393. *E. SYLVATICA*. Umbellâ quinquefidâ, bifidâ, involuclis perfoliatis, subcordatis, acutiusculis; foliis lanceolatis, integerrimis. *Linn. sp. pl.* 463, n. 55; *Jacq. fl. austr.* 4, tab. 375.

*Tithymalus* foliis ellipticis, hirsutis, stipulis umbellatis, obscuris, floralibus connatis, petalis lunatis. *Hall. hist.*, n. 1045.

*Tithymalus* sylvaticus *Scop. fl. carn. sp.* 572.

*Tithymalus* toto anno folia retinens. *Bauh. hist.* 3, fol. 671.

*Tithymalus* sylvaticus lunato flore. *Bauh. pin.* 290.

Belgicè : *Groot Wolfs-melk*; gallicè : *Grand Tithymale*.

In sylvis propè *Ter-Kameren*, etc. Perennis; julio florens.

394. *E. ESULA*. Umbellâ multifidâ, bifidâ, involuclis subcordatis, mucronatis, petalis subbicornibus, ramis sterilibus, foliis uniformibus. *Linn. sp. pl.* 461, n. 48; *Blakw. herb. tab.* 163, fig. 1, 2.

*Tithymalus* foliis linearibus, petalis emarginatis. *Hall. hist.*, n. 1046.

*Tithymalus* *Esula*. *Scop. fl. carn. sp.* 580.

*Tithymalus* maritimo affinis, *Linariæ* folio. *Bauh. pin.* 291.

*Esula* minor. *Dodon. kruid-b.* 608; *Lobel, kruid-b.* 432; *Dalech. hist.* 2, fol. 518.

Belgicè : *Kleyn Wolfs-melk*; gallicè : *Esule*.

In arvis *Haren*, *Diegem*, *Ever*, etc. Julio florens; perennis.

## DODECAGYNIA.

177. **SEMPERVIVUM.** Calix dodecafidus, petala duodecim, capsulæ duodecim polyspermæ, leguminosæ.

395. **S. TECTORUM.** Foliis ciliatis, propaginibus patentibus. *Linn. syst. nat.* 335; *Blakw. herb.* 366.

*Sedum* rosulis ciliatis, petalis conglutinatis, lanceolatis, hirsutis. *Hall. hist.*, n. 949.

*Sedum tectorum.* *Scop. fl. carn. sp.* 559.

*Sempervivum majus.* *Lobel, kruid-b.* 454.

*Barba jovis.* *Dodon. kruid-b.* 181.

*Sedum majus vulgare.* *Bauh. pin.* 283.

Belgicè : *Donder-baert*; gallicè : *Joubarbe*.

In tectis, muris, etc. Augusto floret; perennis.



---

## CLASSIS DUODECIMA.

---

### POLYANDRIA.

---

#### MONOGYNIA.

178. **PRUNUS.** Calix quinquefidus, inferus; petala quinque; drupa unilocularis, supernè clausa; nux suturis prominulis.
396. *P. PADUS.* Floribus racemosis, foliis deciduis basi subtùs biglandulosis. *Linn. sp. pl.* 473, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 589.  
*Padus foliis ovato-lanceolatis, serratis. Hall. hist., n.* 1086.  
*Cerasus avium racemosa. Lobel, kruid-b. fol.* 304, p. 2.  
*Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli. Bauh. pin.* 451.  
*Pseudo-ligustrum. Dodon. kruid-b. fol.* 1218.  
 Belgicè : *Wilde-hers*; gallicè : *Prunier à grappes*.  
 In sylvà propè *Terkameren*. Maio floret.
397. *P. CERASUS.* Umbellis subpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis, glabris, conduplicatis. *Linn. sp. pl.* 474, n. 8; *Scop. fl. carn. sp.* 587; *Blakw. herb. tab.* 449.  
*Cerasus foliis ovato-lanceolatis, glabris, serratis, mucrone producto. Hall. hist. n.* 1083.  
*Cesarus. Dodon. kruid-b.* 1265; *Dalech. hist. 1, fol.* 263.  
*Cerasus hortensis. Bauh. pin.* 450; *Boerh. hort. lugd.* 243, p. 2, n. 1—4.  
 Belgicè : *Krieken-boom*; gallicè : *Cérisier*.  
 In hortis ubique.
398. *P. ARIUM.* Umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis, subtùs pubescentibus, conduplicatis. *Linn. sp. pl.* 475, n. 11; *Blakw. herb. tab.* 425.  
*Cerasus foliis ovato-lanceolatis, serratis, inferne subhirsutis, mucrone producto. Hall. hist., n.* 1082.  
*Cerasus sylvestris. Dodon. kruid-b. fol.* 1265.  
*Cerasus sylvestris fructu nigro et rubro. Bauh. hist. 1, fol.* 228.  
*Cerasus crassa carne durà. Bauh. pin.* 450.

Belgicè : *Vogelkers* ; gallicè : *Merisier* ;  
In sylvis sepibusque.

399. *P. DOMESTICA*. Pedunculis subsolitariis, foliis lanceolato-ovatis, convolutis, ramis muticis. *Linn. sp. pl.* 475, n. 12; *Blakw. herb. tab.* 309; *Lobel, kruid-b. fol.* 205, p. 2.

*Prunus* foliis serratis, hirsutis, ovato-lanceolatis, floribus longè petiolatis. *Hall. hist.*, n. 1079.

*Prunus*. *Dodon. kruid-b.* 1260; *Bauh. pin.* 443; *Raij. hist.* 1526; *Dalech. hist.* 1, fol. 266.

Belgicè : *Pruym-boom* ; gallicè : *Prunier*.

In hortis ubique.

400. *P. SPINOSA*. Pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosis. *Linn. sp. pl.* 475, n. 10; *Blakw. herb. tab.* 494; *Scop. fl. carn. sp.* 586; *Hall. hist.*, n. 1080.

*Prunus sylvestris*. *Dodon. kruid-b.* 1181; *Lobel, kruid-b.* 203, p. 2; *Bauh. pin.* 444; *Dalech. hist.* 1, fol. 108.

Belgicè : *Sleedoren* ; gallicè : *Prunelier*.

In Sepibus ubique.

179. *CHELIDONIUM*. Calix diphyllus ; corolla tetrapetala ; siliqua linearis, unilocularis, receptaculo fenestrato.

401. *C. MAJUS*. Pedunculis umbellatis. *Linn. sp. pl.* 505, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 634; *Dodon. kruid-b.* 62; *Lobel, kruid-b.* 917; *Dalech. hist.* 2, fol. 143; *Mathiol. in Diosc.* 220; *Blakw. herb. tab.* 91.

*Chelidonium lobis foliorum subrotundis*. *Hall. hist.*, n. 1059.

*Chelidonium vulgare majus*. *Bauh. pin.* 144; *Boerh. hort. lugd.* 305, n. 1—3; *Clus. hist. rar.* 203, p. 2; *Moris. hist.* 2, fol. 257.

Belgicè : *Gouwe* ; gallicè : *Chelidoine*.

Sub sepibus, juxta muros, etc. Perennis; initio maii florens.

180. *PAPAVER*. Calix diphyllus ; corolla tetrapetala ; stigma peltatum, radiatum, crenatum ; capsula unilocularis, sub stigmate persistente poris dehiscens.

402. *P. HYBRIDUM*. Capsulis subglobosis, torosis, hispi-

dis, caule folioso, multifloro. *Linn. sp. pl.* 506, n. 1; *Moris. hist.* 2, fol. 278, tab. 14, fig. 9.

*Papaver erraticum* capite oblongo, hispido. *Tourn. inst.* 238.

*Argemone capitulo brevior.* *Bauh. pin.* 172.

*Argemone Lacunæ.* *Lobel, kruid-b.* fol. 339.

*Argemone capitulis parvis.* *Dalech. hist.* 1, fol. 370.

*Argemone capitulo brevior, hispido.* *Bauh. hist.* 3, fol. 396.

Belgicè : *Klapper-roos*; gallicè : *Coquelicot bâlard.*

In arvis *Laken, Jette, etc.* Annuæ; junio florens.

403. *P. ARGEMONE.* Capsulis clavatis, hispidis, caule folioso, multifloro. *Linn. sp. pl.* 506, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 636; *Fl. dan. tab.* 867.

*Papaver foliis hispidis pinnatis, pinnis lobatis, capsulis ellipticis, hispidis.* *Hall. hist.*, n. 1061.

*Argemone capitulo longior.* *Lobel, kruid-b.* 339; *Bauh. pin.* 172; *Bauh. hist.* 3, fol. 396.

*Argemone capitulis longis.* *Dalech. hist.* 1, fol. 370.

*Papaver Argemone dictum capitulo tenuior, longior, hirsuto.* *Moris. hist.* 2, fol. 278, tab. 14, fig. 10.

*Papaver erraticum capitulo longior hispido.* *Tourn. inst.* 238.

Belgicè : *Koren-roos*; gallicè : *Argemone.*

In Campis vulgaris. Annuæ; junio florens.

404. *P. RHÆAS.* Capitulis globosis, glabris, caule piloso, multifloro, foliis pinnatifidis, incis. *Linn. sp. pl.* 507, n. 5; *Blakw. herb. tab.* 2 et 56c; *Lobel, kruid-b.* 338.

*Papaver rhæas prius.* *Dalech. hist.* 1, fol. 369.

*Papaver erraticum.* *Dodon. kruid-b.* 732; *Matthiol. in Diosc.* 345.

*Papaver erraticum rubrum campestre.* *Bauh. hist.* 3, fol. 395.

*Papaver erraticum majus et minus.* *Bauh. pin.* 171.

Belgicè : *Kolle-bloem*; gallicè : *coquelicot.*

In arvis ubique. Annuæ; junio florens.

405. *P. DUBIUM.* Capitulis oblongis, glabris, caule multifloro, setis adpressis, foliis pinnatifidis, incis. *Linn. sp. pl.* 507, n. 6; *Jacq. fl. austr.* 1, tab. 25.

*Papaver foliis hispidis, pinnatis, pinnis lobatis, fructu ovato, lævi.* *Hall. hist.*, n. 1063.

*Papaver Argemone dictum, capitulo longior, glabro.* *Moris. hist.* 2, fol. 279, tab. 14, fig. 11.



*Papaver erraticum*, capitulo longissimo, glabro.  
*Tourn. inst.* 238; *Boerh. hort. lugd.* 280, n. 34.

Belgicè : *Kleyne Kollé-bloem*; gallicè : *Petit coquelicot*.

In arvis *Diegem, Saventhem, etc.* Annuæ; julio florens.

406. *P. SUMNIFERUM*. Calicibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus, incis. *Linn. sp. pl.* 508; n. 7;  
*Hall. hist.*, n. 1065.

*Papaver sativum*. *Lobel, kruid-b.* 335; *Dodon. kruid-boek*, 730; *Dalech. hist.* 2, fol. 565; *Matthiol. in Diosc.*, fol. 346.

*Papaver hortense*. *Bauh. pin.* 170; *Boerh. hort. lugd.* 279.

*Papaver album* (et nigrum). *Blakw. herb. tab.* 482, 483.

Belgicè : *Heul*; gallicè : *Pavot*.

In arvis et hortis *Haren, Machelen, etc.*, seritur.

181. NYMPHÆA. Calix tetra-aut-pentaphyllus, corolla polypetala; stigma orbiculatum, sessile; bacca multilocularis, truncata, supera.

407. *N. LUTEA*. Foliis cordatis, integerrimis, calice pentaphyllo, petalis majore. *Linn. sp. pl.* 510, n. 1;  
*Scop. fl. carn. sp.* 639; *Blakw. herb. tab.* 497; *Dodon. kruid-b.* 928; *Lobel, kruid-b.* 702; *Bauh. hist.* 3, fol. 771.

*Nymphæa calice pentaphyllo*, petalis majore, fructu conico. *Hall. hist.*, n. 1066.

*Nymphæa lutea major*. *Clus. hist. rar.* 77; *Bauh. pin.* 193; *Dalech. hist.* 1, fol. 880; *Boerh. hort. lugd.* 281.

Belgicè : *Gele Plompen*; gallicè : *Nenuphar jaune*.  
 In aquis mœniorum, canalis etc. Piceanis; junio florens.

408. *N. ALBA*. Foliis cordatis, integerrimis, calice quadrifido. *Linn. sp. pl.* 510, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 640; *Blakw. herb. tab.* 498, 499; *Dodon. kruid-b.* 927; *Lobel, kruid-b.* 702; *Bauh. hist.* 3, fol. 771.  
*Nymphæa alba major*. *Bauh. pin.* 193; *Dalech. hist.* 1, fol. 879.

*Leuconymphæa major*. *Boerh. hort. lugd.* 281.

Belgicè : *Witte plompen*; gallicè : *Nenuphar blanc*.

In piscinis *Machelen, Boschfort, Uccle, etc.* Præcedenti rarior.

182. **TILIA.** Calix quinquepartitus; corolla pentapetala; antrum globosum quinqueloculare, articulosum; quinquevalve, basi dehiscens.

409. *T. EVROPEA.* Floribus nectario destitutis, baccis quinquelocularibus, foliis acuminatis, serratis. *Lin. sp. pl.* 514; *Fl. dan. tab.* 553.

*Tilia platyphyllos.* *Scop. fl. carn. sp.* 641; *Bauh. hist.* 1, fol. 133.

*Tilia femina folio majore.* *Bauh. pin.* 426; *Blakw. herb. tab.* 969.

*Tilia femina.* *Dodon. kruid-b.* 1311; *Lobel, kruid-b.* 220, p. 2; *Dalech. hist.* 1, fol. 74.

Belgicè : *Linden-boom*; gallicè : *Tilleul*.

In ambulacris, juxta prata, etc. Junio floret.

410. *T. CORDATA.* Floribus nectario destitutis, baccis quinquelocularibus, foliis cordatis, acuminatis, inæqualiter serratis. *Linn. syst. veget.* 815, n. 2.

*Tilia ulmifolia.* *Scop. fl. carn. sp.* 642.

*Tilia mas.* *Dodon. kruid-b.* 1311; *Lobel, kruid-b.* 220, p. 2; *Dalech. hist.* 1, fol. 75.

*Tilia femina, folio minore.* *Bauh. pin.* 426.

*Tilia folio minore.* *Bauh. hist.* 1, fol. 137.

Belgicè : *Steen-Linde*; gallicè : *Tilleul mâle*.

Cum precedente, sed paulò tardius frondescit et floret.

183. **PLATANUS.** Flores *monoïci*, amentum globosum. *Masc.* Corolla vix manifesta, antheræ filamentum circumnatæ. *Fem.* Corolla polypetalâ, stigma recurvum; semina subrotunda, stylo mucronata, basi papposa.

411. *P. ORIENTALIS.* Foliis palmatis, utrinque glabris. *Linn. syst. veget.* 828, n. 1.

*Platanus.* *Dodon. kruid-b.* 1316; *Lobel, kruid-b.* 232, p. 2. *Clus. hist. rar.* 9; *Bauh. pin.* 431; *Dalech. hist.* 1, fol. 78.

Belgicè : *Plataen-boom*; gallicè : *Platane*.

In ambulacris ubique.

## DIGYNIA.

184. *CRATÆGUS*. Calix quinquefidus; corolla pentapetala; bacca infera, disperma.

412. *C. OXYACANTHA* Foliis obtusis, subtrifidis, serratis. *Linn. sp. pl.* 477, n. 8; *Jacq. fl. austr. tab.* 292; *Blakw. herb. tab.* 149.

*Mespilus oxyacantha. Scop. fl. carn. sp.* 590.

*Oxyacantha*, sive *Spina acuta. Dodon. kruyd-b.* 1176;

*Lobel, kruyd-b.* 234, p. 2; *Dalech. hist.* 1, fol. 113.

*Mespilus Apii folio, sylvestris, spinosa. Bauh. pin.* 454.

Belgicè : *Haag-doren*; gallicè : *Aube-épine*.

In sepibus ubique. Initio maii floret.

185. *POTERIUM*. Flores *monoïci*, calix tetraphyllus, corolla quadripartita. *Masc.* Stamina longissima flaccida. *Fem.* Drupa exsucca, infera, angulata, è tubo corollæ indurato.

413. *P. SANGUISORBA*. Inermis, caulibus subangulosis.

*Linn. sp. pl.* 994, n. 1; *Blakw. herb. tab.* 413.

*Sanguisorba minor. Scop. fl. carn. sp.* 168.

*Pimpinella polystemon. Hall. hist.*, n. 706.

*Pimpinella minor Matthioli. Dalech. hist.* 1, fol. 951.

*Pimpinella sangisorba. Dodon. kruyd-b. fol.* 144.

*Pimpinella. Lobel, kruyd-b.* 876; *Matthiol. in Diosc.* 144.

*Pimpinella sanguisorba minor. Boerh. hort. lugd.* 99, p. 2.

Belgicè : *Kleyne Pimpinelle*; gallicè : *Pimprenelle*.

In pascuis et versuris. Perennis; fine julii florens.

## TRIGYNIA.

186. *SORBUS*. Calix quinquefidus; petala quinque; pomum quinqueloculare, supernè apertum, trispermum.

414. *S. AUCUPARIA*. Foliis pinnatis, utrinque glabris.

- Linn. sp. pl.* 477, n. 1; *Blakw. herb. tab.* 73; *Bauh. hist.* 1, fol. 62; *Tourn. inst.* 634.  
*Aleupilus aucuparia. Scop. fl. carn. sp.* 593; *Hall. hist.* 1091.  
*Sorbus sylvestris, foliis Domesticæ similis. Bauh. pin.* 415.  
 Belgicè : *Lysterbeziën - boom*; gallicè : *Cormier sauvage*.  
 In sylvis omnibus. Initio aprilis floret.
415. *S. DOMESTICA*. Foliis pinnatis, subtùs villosis. *Linn. sp. pl.* 477, n. 2; *Matthiol. in Diosc.* 106; *Jacq. fl. aust.* 1, tab. 447.  
*Sorbus. Dodon. kruid-b.* 1257; *Dalech. hist.* 1, fol. 279.  
*Sorbus sativa. Bauh. pin.* 415; *Tourn. inst.* 633.  
*Sorbus legitima. Clus. hist. rar. fol.* 10.  
 Belgicè : *Sorben-boom*; gallicè : *Cormier cultivé*.  
 Juxta hortos, prata, etc. Præcedenti tardius floret.
187. *DELPHINIUM*. Calix nullus; petala quinque; nectarium bifidum, posticè cornutum; capsulæ leguminosæ, subternæ, polyspermæ.
416. *D. CONSOLIDA*. Nectariis monophyllis, caule subdiviso. *Linn. sp. pl.* 530, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 651; *Blakw. herb.* 26; *Fl. dan. tab.* 683.  
*Delphinium unisiliquum, caule brachiato, diffuso, floribus sparsis. Hall. hist., n.* 1203.  
*Delphinium vulgare. Clus. hist. rar.* 205, p. 2.  
*Delphinium segetum. Boerh. hort. lugd.* 302, n. 4—9.  
*Flos regius. Dodon. kruid-b.* 401, fig. 1—2; *Lobel, kruid-b.* 902, fig. 1—3.  
*Consolida regalis arvensis. Bauh. pin.* 142.  
 Belgicè : *Ridders-spoór*; gallicè : *Pied d'Alouette*.  
 In arvis *Elmet, Ever, Haren, etc.* Annua; julio floret.

## PENTAGYNIA.

188. *MESPILUS*. Calix quinquefidus; petala quinque, bacca infera pentasperma.
417. *M. PYRACANTHA*. Foliis lanceolato-ovatis, crenatis, calicibus fructûs obtusis. *Linn. sp. pl.* 478, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 596.

*Mespilus spinosa* Pyri folio. *Boerh. hort. lugd.* 257, p. 2.

*Pyracantha quibusdam*. *Bauh. hist.* 1, fol. 51.

*Pyracantha* quæ *Rhamnus tertius Dioscoridis*. *Lobel, kruyd-b.* 211, p. 2.

*Oxyacantha Dioscoridis*, sive *Spina acuta* Pyri folio.

*Bauh. pin.* 464; *Raij. hist.* 1459.

*Mespilus aculeatus*, *Amygdali* folio. *Tourn. inst.* 642.

Belgicè : *Mespeldoren*; gallicè : *Buisson ardent*

In sylva *Linthout*. Communis.

189. **SPIRÆA.** Calix quinquefidus; corolla pentapetala; capsulæ polyspermæ, uniloculares, bivalves.

418. **S. ULMARIA.** Foliis interrupte-pinnatis, foliolis ovatis, biserratis, subtus canis floribus cymosis. *Linn. sp. pl.* 490, n. 10; *Scop. fl. carn. sp.* 603.

*Ulmaria*. *Clus. hist. rar.* 198, p. 2; *Blakw. herb. tab* 465.

*Barba Capræ*, floribus compactis. *Bauh. pin.* 164.

*Barbicapra*. *Lobel, kruyd-b.*, fol. 369.

*Regina prati*. *Dodon. kruyd-b.*, fol. 75.

*Ulmaria vulgaris*. *Moris. hist.* 3, fol. 323.

Belgicè : *Geyten-baerd*; gallicè : *Reine des prés*.

In pratis sylvisque uliginosis, Julio floret; perennis.

## POLYGYNIA.

190. **ROSA.** Calix urceolatus, quinquefidus, carnosus, collo coarctatus; petala quinque; antrum duplicatum, uniloculare, supernè apertum; pericarpis osseis intus nidulantibus.

419. **R. CANINA.** Germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Linn. syst. nat.* 348; *Blakw. tab.* 8; *Scop. fl. carn. sp.* 604; *Dodon. kruyd-b.* 283; *Lobel, kruyd-b.* 243, p. 2.

*Rosa spinis aduncis*, foliis septenis, calicibus tomentosis, segmentis pinnatis et semipinnatis, tubis brevissimis. *Hall. hist. n.* 1101.

*Rosa sylvestris incarnato flore*. *Boerh. hort. lugd.* 252, p. 2.

*Rosa sylvestris* flore odorato, incarnato. *Bauh. pin.*

483.

Belgicè : *Honds-Roos*; gallicè : *Rosier sauvage*.

In collibus et sylvis communis. Junio floret.

191. **RUBUS.** Calix quinquefidus; petala quinque; styli ex apice germinum; drupæ congregatæ, receptaculo conico baccanti superimpositæ.

420. *R. FRUTICOSUS.* Foliis quinato-digitatis ternatisque; caule petiolisque aculeatis. *Linn. sp. pl.* 493, n. 5; *Scop. fl. carn. sp.* 613.

*Rubus* caule spinoso, serpente, foliis quinatis et ternatis, subtus tomentosis, baccis lævibus. *Hall. hist.*, n. 1109.

*Rubus* major. *Dodon. kruid-b.* 1162; *Lobel, kruid-b.* 245, p. 2.

*Rubus vulgaris* fructu nigro. *Bauh. pin.* 479; *Blakw. herb. tab.* 45.

*Rubus magnus.* *Dalech. hist.* 1, fol. 99.

Belgicè : *Groote Braem*; gallicè : *Ronce*.

Ad margines, inque sylvis, etc. Julio floret.

421. *R. IDÆUS.* Foliis pinnato-quinatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Linn. sp. pl.* 492, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 611; *Blakw. herb. tab.* 289; *Dodon. kruid-b.* 1164; *Lobel, kruid-b.* 245, p. 2; *Dalech. hist.* 1, fol. 102; *Matthiol. in Diosc.*, fol. 334.

*Rubus idæus* spinosus. *Bauh. pin.* 479; *Bauh. hist.* 2, fol. 59.

*Rubus idæus* *Placæ. Clus. hist. rar.*, fol. 117.

Belgicè : *Framboos*; gallicè : *Framboisier*.

In sylvis *Linthout*, *Ter-Kameren*, *Heder*, etc.

422. *R. CÆSIUS.* Foliis ternatis, subnudis, lateralibus bilobis, caule aculeato, tereti. *Linn. sp. pl.* 492, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 612.

*Rubus* caule aculeato prostrato, foliis ternatis. *Hall. hist.*, n. 1110.

*Rubus repens* fructu cæcio. *Bauh. pin.* 479.

*Rubus minor* fructu cæruleo. *Bauh. hist.* 2, fol. 14.

*Rubus minor.* *Dodon. kruid-b.*, fol. 1162.

Belgicè : *Hinne-braem*; gallicè : *Petite ronce*.

Ad margines propè *Laken*, in sylvis, etc.

192. FRAGARIA. Calix decafidus; petala quinque; semina nuda, glabra, receptaculo ovato, baccanti, deciduo, colorato, superimposita.

423. *F. Vesca*. Foliis ternatis, glabris, flagellis reptantibus. *Linn. sp. pl.* 494, n. 1; *Blakw. herb. tab.* 77. *Fragaria foliis ternatis, flagellis reptantibus. Hall. hist.* n. 1112.

Potentilla vesca. *Scop. fl. carn. sp.* 625.

*Fragaria vulgaris. Bauh. pin.* 326; *Boerh. hort. lugd.* 41.

*Fragaria. Dodon. kruid-b.* 1050; *Lobel. kruid-b.* 843.

Belgicè : *Aerd-beziën*; gallicè : *Fraisier*.

In hortis collibusque.

424. *F. Sterilis*. Foliis ternatis petiolisque pilosis, ramis floriteris laxis. *Linn. sp. pl.* 495, n. 2; *Gouan, hort. monsp.* 247; *Bauh. pin.* 327; *Boerh. hort. lugd.* 42, n. 2.

*Fragaria sterilis seu minimè vesca. Moris. hist.* 2, fol. 186.

*Fragaria sylvestris minimè vesca seu sterilis. Lobel, kruid-b.* 844.

*Fragaria caule prostrato, foliis ternatis, retusis, sericeis. Hall. hist.* 1113.

Belgicè : *Wilde Aerd-beziën*; gallicè : *Fraisier sauvage*.

Propè *St.-Gillis*, vulgò *op de Heyde*. Initio martis floret. In hortis translata fit frugifer.

193. TORMENTILLA. Calix octofidus; petala quatuor; semina nuda, rotunda, receptaculo parvo, exsucco affixa.

425. *T. Erecta*. Caule erectiusculo, foliis sessilibus. *Linn. sp. pl.* 500, n. 11; *Blakw. herb. tab.* 445.

Potentilla Tormentilla erecta. *Scop. fl. carn. sp.* 620.

*Fragaria tetrapetala, foliis caulinis, sessilibus, quinatis. Hall. hist., n.* 1117.

*Tormentilla sylvestris. Bauh. pin.* 326.

*Tormentilla. Dodon. kruid-b.* 164; *Lobel, kruid-b.* 843; *Dalech. hist.* 2, fol. 160; *Bauh. hist.* 2, fol. 598.

Belgicè : *Seven-blad*; gallicè : *Tormentille*.

In fossis mœniorum propè *den Dikken Toren*, etc. Perennis; julio florens.

194. **POTENTILLA.** Calix decafidus; petala quinque; semina nuda, subrotunda, rugosa, receptaculo parvo, exsucco, fungoso, tuberculato, affixa.

426. *P. ANSERINA.* Foliis pinnatis, serratis, caule repente, pedunculis unifloris. *Linn. sp. pl.* 495, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 615.

*Fragaria* caule repente, foliis pinnatis, serratis, tomentosis, petiolis longis, unifloris. *Hall. hist.*, n. 1126.

*Potentilla.* *Bauh. pin.* 321; *Dalech. hist.* 1, fol. 930.

*Argentina.* *Dodon. kruid-b.* 948; *Lobel, kruid-b.* 841.

*Pentaphylloides argenteum alatum sive Potentilla.* *Tourn. inst.* 298.

Belgicè : *Ganserik*; gallicè : *Anserine*.

Juxta vias ubique. Junio floret; pereunns.

427. *P. ARGENTEA.* Foliis quinatis, cuneiformibus, incisis, subtùs tomentosis, caule erecto. *Linn. sp. pl.* 497, n. 11; *Scop. fl. carn. sp.* 619.

*Fragaria* caule erecto, foliis quinatis, apice serratis, subtùs tomentosis. *Hall. hist.* n. 1124.

*Quinquefolium folio argenteo.* *Bauh. pin.* 325; *Boerh. hort. lugd.* 40.

*Pentaphyllum rectum*, foliis profundè sectis, subtùs argenteis, flore luteo. *Bauh. hist.* 2, fol. 398; *Moris. hist.* 2, fol. 190.

Belgicè : *Silver-kruid*; gallicè : *Argentine*.

Propè Beersel, Vorst, etc. Florentem inveni fine junii; perennis. *Rarior*.

428. *P. REPTANS.* Foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Linn. sp. pl.* 499, n. 17; *Scop. fl. carn. sp.* 622; *Blakw. herb. tab.* 454.

*Fragaria* foliis quinatis, serratis, petiolis unifloris, caule reptante. *Hall. hist.*, n. 1118.

*Quinquefolium supinum vel repens.* *Dodon. kruid-boek*, 162.

*Quinquefolium majus repens.* *Bauh. pin.* 325.

*Pentaphyllum supinum*, *Tormentillæ facie.* *Lobel, kruid-b.* 840.

*Pentaphyllum vel Quinquefolium vulgare repens.* *Bauh. hist.* 2, fol. 397.

Belgicè : *Kleyn Vyfvinger-kruid*; gallicè : *Quintefeuille*.

Juxta fossas in pratis. Perennis; junio florens.



195. GEUM. Calix decafidus; petala quinque; styli terminales; semina aristâ geniculatâ; receptaculum columnare.

429. *G. URBANUM*. Floribus erectis, fructubus globosis, villosis, aristis uncinatis, nudis, foliis lyratis. *Linn. sp. pl.* 501, n. 2; *Blakw. herb. tab.* 253.

Geum foliis pinnatis, pinnâ ultima trilobatâ: floribus patulis, tubis aduncis. *Hall. hist.*, n. 1130.

Caryophyllata urbana. *Scop. fl. carn. sp.* 628.

Caryophyllata vulgaris. *Moris. hist.* 2, fol. 430; *Bauh. pin.* 321; *Lobel. kruyd-b.* 845; *Bauh. hist.* 2, f. 398.

Caryophyllata. *Dodon. kruyd-b.* 198; *Dalech. hist.* 1, fol. 586.

Belgicè: *Nagelkruyd*; gallicè: *Benoite*.

In umbrosis humidis ubique. Perennis; junio florens.

196. ARUM. Spatha monophylla, cucullata; spadix supra nudus, infernè femineus, medio stamineus.

430. *A. MACULATUM*. Acaule, foliis hastatis, integerimis, spadice clavato. *Linn. sp. pl.* 966, n. 12; *Scop. fl. carn. sp.* 1138; *Blakw. herb. tab.* 228.

Arum foliis sagittatis, spathâ rectâ, clavâ cylindricâ. *Hall. hist.*, n. 1302.

Arum officinarum. *Lobel, kruyd-b.* 707; *Dodon. kruyd-b.* 528.

Arum vulgare maculatum (et non maculatum.) *Bauh. pin.* 195.

Arum. *Bauh. hist.* 2, fol. 783; *Matthiol. in Diosc.* 211; *Dalech. hist.* 2, fol. 464.

Belgicè: *Kalfs-Voet*; gallicè: *Pied de veau*.

In sylvis omnibus et ponè murum mæniorum inter portam Canalis et Flandriæ. Perennis; fine maii florens.

197. ANEMONE. Calix nullus; petala quinque ad septem; capsulæ plures caudatæ aut mucronatæ, stylum retinentes.

431. *A. NEMOROSA* Caule unifloro, foliolis incisis, se-

minibus acutis. *Linn. sp. pl.* 541, n. 15; *Scop. fl. carn. sp.* 660.

*Anemone* seminibus nudis, caule unifloro, foliis caulinis quinquepartitis, lobis tripartitis, incisis. *Hall. hist.*, n. 1154.

*Anemone* nemorosa flore majore. *Bauh. pin.* 176.

*Anemone* quinta. *Dodon. kruid-b. fol.* 713.

*Ranunculus* nemorosus. *Lobel, kruid-b. fol.* 820.

*Ranunculus* sylvarum. *Clus. hist. rar.* 247.

Belgicè : *Bosch-Haenevoet*; gallicè : *Sylvie*.

In sylvis omnibus. Initio aprilis floret. Perennis.

432. *A. RANUNCULOIDES*. Caule subbifloro, petalis subrotundis, foliolis incisis, seminibus acutis. *Linn. sp. pl.* 541, n. 17; *Scop. fl. carn. sp.* 661.

*Ranunculus* nemorosus luteus. *Lobel, kruid-b.* 820; *Bauh. pin.* 178; *Moris. hist.* 2, fol. 437; *Dalech. hist.* 1, fol. 899.

*Ranunculus* phragmites, luteus, nemorosus. *Bauh. hist.* 3, fol. 413.

*Anemonoides* flore luteo unico. *Boerh. hort. lugd.* 36.

Belgicè : *Geëlen Raenevoet*; gallicè : *Anémone sauvage*.

In sylvis propè *Berchem*; Bruxellis etiam in *de warande*, in *het dal van Magdalena*. Perennis; initio aprilis florens.

433. *A. SYLVESTRIS*. Pedunculo nudo, seminibus subrotundis, hirsutis, muticis. *Linn. sp. pl.* 542, n. 18; *Bulliard, herb. franc. tab.* 59.

*Anemone* seminibus lanatis, foliis digitatis, hirsutis, floribus pentapetalis. *Hall. hist.*, n. 1150.

*Anemone* sylvestris prima. *Clus. hist. rar.* 244.

*Anemone* sylvestris alba major. *Bauh. pin.* 176; *Boerh. hort. lugd.* 37; *Moris. hist.* 2, fol. 425.

*Anemone* alba, magna, plurimà parte anni florens. *Bauh. hist.* 3, fol. 411.

Belgicè : *Wilden Haenevoet*; gallicè : *Coquelourde*.

In pratis uliginosis. *Itterbeek* et *Dilbeek*. Planta rara, bifera, vere et autumnò florens.

198. *CLEMATIS*. Calix nullus; petala quatuor; rarius quinque; styli persistentes; capsulæ plures caudatæ; receptaculum capitatum.

434. *C. VITALBA*. Foliis pinnatis, foliolis cordatis, scan-

dentibus. *Linn. sp. pl.* 544, n. 5; *Scop. fl. carn.* sp. 669; *Jacq. fl. austr. tab.* 308.

*Clematis caule scandente, foliis pinnatis, ovato-lanceolatis. Hall. hist., n.* 1542.

*Clematis latifolia dentata. Bauh. hist. 2, fol.* 125.

*Clematis sylvestris latifolia. Bauh. pin.* 300.

*Atragene Theophrasti. Clus. hist. rar.* 122.

*Vitalba. Dodon. kruid-b., fol.* 662.

*Viorna vulgi. Lobel, kruid-b., fol.* 748.

Belgicè : *Lynen*; gallicè : *Herbe aux gueux*.

In sepibus. *Etterbeek, Elsen, etc.* Julio floret.

199. **CALTHA.** Calix nullus; petala quinque; nectaria nulla; capsulæ plures polyspermæ.

435. *C. PALUSTRIS.* *Linn. syst. veget.* 883; *Hall. hist., n.* 1188; *Dodon. kruid-b.* 946; *Fl. dan. tab.* 668;

*Lobel, kruid-boek, fol.* 701; *Bauh. hist. 3, fol.* 470.

*Populago palustris. Scop. fl. carn. sp.* 698.

*Populago flore majore. Tourn. inst.* 273; *Boerh. hort. lugd.* 298.

*Caltha palustris vulgaris. Clus. hist. rar.* 114, p. 2.

*Caltha palustris flore simplici (et pleno). Bauh. pin.* 276.

Belgicè : *Dotterbloem*; gallicè : *Souci des marais*.

In aquosis ubique. Perennis; initio maii florens.

200. **RANUNCULUS.** Calix pentaphyllus, deciduus; petala quinque ad octo, intra ungues squamula vel poro mellifero; styli persistentes; semina incrustata erecta.

436. *R. FICARIA.* Foliis cordatis, angulatis, petiolatis, caule unifloro, floribus octopetalis, calice triphylo.

*Linn. sp. pl.* 550, n. 9; *Scop. fl. carn. sp.* 684.

*Ficaria. Hall. hist., n.* 1160; *Blakw. herb. tab.* 51.

*Scrophularia minor. Bauh. hist. 3, fol.* 468.

*Chelidonium minus. Dodon. kruid-b.* 64; *Lobel, kruid-b.* 701; *Matthiol. in Diosc.* 220; *Dalech. hist. 1, fol.* 915; *Boerh. hort. lugd.* 29.

Belgicè : *Speên-kruid*; gallicè : *Petite Chelidoine*.

Juxta aquas, in pratis humidis, etc. Perennis; medio martis florens.

437. *R. FLAMMULA.* Foliis ovato-lanceolatis, petiolatis,

- caule declinato. *Linn. sp. pl.* 548; *Scop. fl. carn. sp.* 681; *Dodon. kruid-b.* 708, n. 1—2; *Lobel, kruid-b.* 817, n. 1-2; *Dalech. hist.* 1, fol. 904.
- Ranunculus* caule declinato, foliis elliptico-lanceolatis, subserratis. *Hall. hist.*, n. 1182.
- Ranunculus* longifolius, aliis flammula. *Bauh. hist.* 3, fol. 864.
- Ranunculus* longifolius, palustris, minor. *Bauh. pin.* 180; *Moris. hist.* 2, fol. 443; *Boerh. hort. lugd.* 34.
- Belgicè : *Egelkool*; gallicè : *Douve*.
- In stagnis, fossis pratorum, etc. Perennis; maio florens.
433. *R. SCLERATUS*. Foliis inferioribus palmatis, summis digitatis, fructibus oblongis. *Linn. sp. pl.* 551, n. 15; *Scop. fl. carn. sp.* 688.
- Ranunculus* foliis lævibus, semitrilobatis, rotundè serratis, fructu ovato. *Hall. hist.*, n. 1175.
- Ranunculus* sylvestris primus. *Dodon. kruid-b.* 699.
- Ranunculus* palustris rotundiore folio. *Lobel, kruid-b.* 815.
- Ranunculus* palustris Apii folio lævis. *Bauh. pin.* 180.
- Ranunculus* palustris flore minimo. *Bauh. hist.* 3, app. 858.
- Ranunculus* palustris. *Blakw. herb. tab.* 259.
- Belgicè : *Fiel kruid*; gallicè : *Piedpou*.
- In stagnis fossisque pratorum. Fine maii floret.
439. *R. ACERIS*. Foliis tripartito-multifidis, summis linearibus, pedunculis teretibus, calicibus patulis. *Linn. sp. pl.* 554, n. 28; *Scop. fl. carn. sp.* 690.
- Ranunculus* pratensis, surrectis cauliculis. *Lobel, kruid-b.* 812.
- Ranunculus* pratensis, erectus, acris. *Bauh. pin.* 178; *Moris. hist.* 2; fol. 439; *Boerh. hort. lugd.* 30.
- Ranunculus* rectus non repens, flore simplici luteo. *Bauh. hist.* 3, fol. 416.
- Ranunculus* hortensis secundus. *Dodon, kruid-b.* 698.
- Belgicè : *Goude Knoppen*; gallicè : *Bouton d'Or*.
- In pratis humidis ubique. Maio floret; perennis. *Culturâ flos fit plenus.*
440. *R. HETEROPHYLLUS*. Foliis submersis capillaceis, emersis reniformi-palmatis. *Linn. syst. pl.* 879, n. 21; *Scop. fl. carn. sp.* 681; *Dodon. kruid-b.* 931.

*Ranunculus aquaticus* Hepaticæ facie. *Lobel, kruyd-b.* 41, p. 2.

*Ranunculus aquaticus* folio rotundo et capillaceo. *Bauh. pin.* 180.

Belgicè : *Water Haenevoet*; gallicè : *Renoncule des marais*.

In aquis mœniorum, etc. Junio floret; perennis.

441. *R. HEDERACEUS*. Foliis subrotundis, trilobis, integerrimis, caule repente. *Linn. syst. pl.* 879, n. 26; *Fl. Dan. tab.* 321; *Dalech. hist.* 1, fol. 899.

*Ranunculus aquaticus hederaceus*. *Moris. hist.* 2, fol. 441, tab. 39, fig. 29; *Boerh. hort. lugd.* 35.

*Ranunculus aquaticus hederaceus luteus*. *Bauh. pin.* 180.

*Ranunculus hederaceus* atrâ maculâ notatus. *Bauh. hist.* 3, fol. 782.

Belgicè : *Water-Onderhave*; gallicè : *Lierre aquatique*.

In piscinis propè *Diligem*, etc. Fine aprilis florens. *Præcedenti multò rarior*.

442. *R. AQUATILIS*. Pedunculis unifloris, foliis multifidis, capillaceis, laciniis divergentibus. *Linn. syst. pl.* 879, n. 32; *Hall. hist.*, n. 1163.

*Ranunculus aquaticus capillaceus*. *Bauh. pin.* 180; *Moris. hist.* 2, fol. 442; *Boerh. hort. lugd.* 34.

*Ranunculus aquaticus* omninò tenuifolius. *Bauh. hist.* 3, fol. 781.

*Millefolium maratriphyllum* tertium, etc. *Lobel, kruyd-b.* 967.

Belgicè : *Water-Boter-bloem*; gallicè : *Renoncule d'eau*.

In aquis mœniorum, etc. Maio florens; perennis.

443. *R. FLUVIATILIS*. Foliis multifidis, capillaceis, laciniis parallelis. *Linn. syst. pl.* 880, n. 33. *Hall. hist.*, n. 1161; *Fl. dan. tab.* 376.

*Ranunculus fluitans* Peucedani foliis. *Boerh. hort. lugd.* 34.

*Millefolium aquaticum* foliis Feniculi, *Ranunculi* flore et capitulo. *Bauh. pin.* 141.

*Ranunculo* Affine, *Millefolium* maratriphyllon fluitans. *Bauh. hist.* 3, fol. 782.

Belgicè : *Water-Venkel*; gallicè : *Fenouil d'eau*.

In aquis *Sennæ*, propè pontem *Hoogevondel*, et alibi in aquis fluentibus. Perennis; junio florens,

444. *R. POLYANTHEMOS*. Calicibus patulis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis multipartitis. *Linn. syst. pl.* 881, n. 35; *Lobel, kruid-b.* 813; *Boerh. hort. lugd.* 31.  
*Ranunculus ramosus*, multiflorus, foliis semiseptilobis, lobis tridentatis, acutis. *Hall. hist.*, n. 1171.  
*Ranunculus sylvestris secundus*. *Dodon. kruid-b.* 700.  
 Belgicè : *Luypaerdsklauw*.  
 In pratis et arvis *Laken*, etc. Perennis; maio florens.
445. *R. BULBOSUS*. Calicibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto, multifloro, foliis compositis. *Linn. sp. pl.* 554, n. 25; *Scop. fl. carn. sp.* 692; *Lobel, kruid-b.* 813.  
*Ranunculus radice subrotundâ*, foliis hirsutis, septilobis, lobis petiolatis. *Hall. hist.*, n. 1174.  
*Ranunculus tuberosus*. *Dodon. kruid-b.* 706.  
*Rapum divi Antonii*. *Dalech. hist.* 1, fol. 902.  
*Ranunculus pratensis*, radice verticilli modo rotundâ, *Bauh. pin.* 179.  
 Belgicè : *St.-Anthony's raep*; gallicè : *Bacinet*.  
 In arvis *Molebeek*, *Laken*, etc. Perennis; fine aprilis florens.
446. *R. REPENS*. Foliis compositis, stolonibus repentibus, pedunculis sulcatis, calicibus patulis. *Linn. sp. pl.* 554, n. 8; *Scop. fl. carn. sp.* 689; *Blakw. herb. tab.* 31.  
*Ranunculus caule repente*, radicato, foliis semitri-lobatis, lobis petiolatis. *Hall. hist.*, n. 1173.  
*Ranunculus hortensis primus*. *Dodon. kruid b.* 698.  
*Ranunculus pratensis repens hirsutus*. *Bauh. pin.* 179.  
*Ranunculus pratensis*. *Lobel, kruid-b.* 812.  
*Ranunculus repens flore luteo simplici*. *Bauh. hist.* 3, fol. 419.  
 Belgicè *Groote Boterbloem*; gallicè : *Renoncule des prés*.  
 In pratis, viis, herbosisque humidis. Maio floret; perennis.
447. *R. ARVENSIS*. Foliis superioribus decompositis, linearibus, seminibus aculeatis. *Linn. sp. pl.* 555, n. 31; *Scop. fl. carn. sp.* 693.  
*Ranunculus seminibus aculeatis*, foliis tripartitis, lobis longe petiolatis, bi-et-tripartitis, acute incis. *Hall. hist.*, n. 1176.

*Ranunculus arvensis echinatus.* *Bauh. pin.* 179; *Moris. hist.* 2, fol. 440; *Bauh. hist.* 3, fol. 859; *Boerh. hort. lugd.* 32.

*Ranunculus arvorum.* *Lobel, kruyd b.* 813.

*Ranunculus sylvestris tertius.* *Dodon. kruyd-b.* 700.

Belgicè : *Akker Haenevoet* ; gallicè : *Renoncule des champs*.

Ad margines arvorum ubique. Annuæ ; junio florens.

**201. HELLEBORUS.** Corolla nulla ; calix pentaphyllus , sæpè coloratus ; nectaria bilabiata , tubulosa ; capsulæ polyspermæ , erectiusculæ , rostratæ , leguminosæ.

448. *H. NIGER.* Scapo subbifloro , subnudo , foliis pedatis. *Linn. sp. pl.* 558 , n. 2 ; *Scop. fl. carn. sp.* 696 ; *Lobel, kruyd-b.* 827 ; *Blakw. herb. tab.* 506 , 507 ; *Jacq. fl. austr. tab.* 201.

*Helleborus foliis multipartitis , serratis , caule paucifloro.* *Hall. hist.* , n. 1192.

*Helleborus niger legitimus.* *Clus. hist. rar.* 275.

*Helleborus niger flore roseo.* *Bauh. pin.* 186.

*Veratrum nigrum.* *Dodon. kruyd-b.* 629.

Belgicè : *Swart Nieskruyd* ; gallicè : *Hellebore noir*.

In sylvâ Soniæ inter *Oudergem* et *Tervueren*. Perennis ; februario florens.

449. *H. VIRIDIS.* Caule bifido , ramis foliosis bifloris , foliis digitatis. *Linn. sp. pl.* 558 , n. 3 ; *Scop. fl. carn. sp.* 697 ; *Jacq. fl. austr. tab.* 106 ; *Blakw. herb. tab.* 509 , 510.

*Helleborus caule ramoso , multifloro , foliis multipartitis , serratis , stipulis ovato-lanceolatis , coloratis.* *Hall. hist.* , n. 1193.

*Veratrum nigrum secundum , Dodonæi.* *Clus. hist. rar.* 275.

*Veratrum nigrum adulterinum.* *Dodon. kruyd-b.* 629.

*Helleborastrum.* *Lobel. kruyd-b.* 827.

Belgicè : *Vuer-kruyd* ; gallicè : *Hellebore vert*.

Juxta murum mœniorum , propè *de Kleyne Spuy*. Perennis ; fine martis florens.

**202. SAGITTARIA.** Flores *monoïci* , calix triphyllus ; corolla tripetala ; *Masc.* Filamenta circiter

viginti-quatuor. *Fem.* Pistilla multa; semina multa, nuda.

450. *S. SAGITTIFOLIA*. Foliis sagittatis, acutis. *Linn. sp. pl.* 993, n. 1; *Fl. dan. tab.* 172.

*Sagitta* foliis acuminatis. *Hall. hist.*, n. 1185.

*Sagitta* major. *Scop. fl. carn. sp.* 1181; *Dodon. kroyd-bock*, 931; *Bauh. hist.* 3, fol. 790.

*Sagitta* aquatica (et minor) *Lobel, kroyd-b.* 371.

*Sagitta* aquatica (major et minor). *Bauh. pin.* 194.

*Sagittaria europæa* major. *Moris. hist.* 3, fol. 618.

Belgicè : *Serpent's-Tong*; gallicè : *Sagittaire*.

In aquis ubiquè. Perennis; junio florens.





## CLASSIS DECIMA TERTIA.

## DIDYNAMIA.

## GYMNOSPERMIA.

203. **AJUGA**. Corollæ labium superius minimum, erectum, bifidum; stamina labio superiori longiora.
451. *A. REPTANS*. Glabra, stolonibus reptantibus, foliis ovatis, crenatis. *Linn. sp. pl.* 561, n. 5; *Blakw. herb. tab.* 64.  
*Bugula foliis ovatis, dentatis, flagellis reptans. Hall. hist., n.* 282; *Scop. fl. carn. sp.* 716.  
*Bugula. Dodon. kruid-b.* 196; *Lobel. kruid-b.* 560; *Dalech. hist.* 1, fol. 940; *Boerh. hort. lugd.* 184.  
*Bugula vulgaris sylvatica cærulæa. Moris. hist.* 3, fol. 391.  
*Consolida media pratensis cærulæa. Bauh. pin.* 260.  
 Belgicè : *Senne-groen*; gallicè : *Bugle*.  
 In humidis sylvosus ubiquè. Perennis; maio florens.
204. **TEUCRIUM**. Labium superius corollæ erectum, ultra basin profundè bipartitum; stamina inter ejus divisuram.
452. *T. SCORODONIA*. Foliis cordatis, serratis, petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto. *Linn. syst. pl.* 896, n. 48; *Scop. fl. carn. sp.* 721.  
*Chamædrys foliis cordatis, productis, spicis longissimis, nudis, heteromalis. Hall. hist., n.* 287.  
*Salvia agrestis. Dodon. kruid-b.* 469; *Dalech. hist.* 1, fol. 765.  
*Scordium alterum Plinii. Lobel, kruid-b.* 581.  
*Scordium alterum sive Salvia agrestis. Bauh. pin.* 247.  
*Scorodotis sive Scordium folio Salviæ. Bauh. hist.* 3, fol. 293.

Belgicè : *Wilde Salvie* ; gallicè : *Sauge sauvage*.  
In sylvis *Linthout*, *Heder*, etc. Perennis; julio flo-  
rens.

205. **NEPETA.** Corollæ labium inferius lacinulâ in-  
termidiâ crenatâ, faux margine reflexo; sta-  
mina approximata.

453. *N. CATARIA.* Floribus spicatis, verticillis subpedun-  
culatis, foliis petiolatis, cordatis, dentato-serratis.  
*Linn. sp. pl.* 570, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 743;  
*Blakw. herb. tab.* 455.

*Cataria* foliis cordatis, petiolatis, verticillis spicatis.  
*Hall. hist.*, n. 246.

*Cataria.* *Dodon. kruid-b.* 134; *Lobel, kruid-b.* 603.

*Cataria major vulgaris.* *Tourn. inst.* 202; *Boerh. hort.*  
*lud.* 174.

*Mentha Cataria.* *Bauh. hist.* 3, fol. 225; *Bauh. pin.* 228.

Belgicè : *Katten-kruid*; gallicè : *Herbe aux chats*.

Ad margines *Schaerbeek*, *Ever*, etc. Perennis.

206. **MENTHA.** Corolla subæqualis, quadrifida, la-  
ciniâ latiore emarginatâ; stamina erecta, dis-  
tantia.

454. *M. SYLVESTRIS.* Floribus spicatis, spicis oblongis,  
foliis oblongis, serratis, tomentosis, sessilibus, sta-  
minibus corollâ longioribus. *Linn. syst. veget.* 902,  
n. 6; *Fl. dan. tab.* 484.

*Menthastrum* spicatum, folio longiore, candicante.  
*Bauh. hist.* 3, fol. 321; *Blakw. herb. tab.* 292.

*Menthastrum.* *Lobel, kruid-b.* 603; *Clus. hist. rar.* 32,  
p. 2.

*Mentha sylvestris* folio longiore. *Bauh. pin.* 227.

*Mentha alba.* *Dodon. kruid-b.* 131.

Belgicè : *Witte Munte*; gallicè : *Menthe blanche*.

Copiosè propè castellum D. *Van Eekhout*, juxta viam  
quâ per præta *Ever*, secus *Sennam*, *Vilvordiam* itur.  
Floret julio; perennis.

455. *M. ROTUNDIFOLIA.* Floribus spicatis, spicis oblongis,  
foliis subrotundis, rugosis, crenatis, sessilibus. *Linn.*  
*syst. pl.* 902, n. 8.

*Mentha foliis ovatis, rugosis, spicis cylindricis. Hall. hist., n. 226.*

*Menthastrum folio rugoso rotundiore, spontaneum, flore spicato, odore gravi. Bauh. hist. 3, fol. 219.*

*Mentha sylvestris rotundiore folio. Bauh. pin. 227.*

Belgicè : *Water-munte* ; gallicè : *Menthe aquatique.*

Ad ripas Sennæ, propè *Randsvoort, etc.* Perennis ; junio florens.

456. *M. HIRUTA.* Floribus capitatis, foliis ovatis, serratis, subsessilibus, pubescentibus, staminibus corollâ longioribus. *Linn. syst. veget. 903, n. 11.*

*Mentha aquatica, hirsuta, sive Sisymbrium hirsutum. Bauh. hist. 3, fol. 224 ; Moris. hist. 3, fol. 370.*

*Sisymbrium hirsutum. Raij. hist. 3, fol. 233 tab. 10, fig. 1.*

Belgicè : *Beek-Munte.*

Ad *Molebeek*, vulgò in 't *Broek*, et alibi in aquosis. varietatem sequentis, vult *Haller.*, *hist. stirp. helv.*

457. *M. AQUATICA.* Floribus capitatis, foliis ovatis, serratis, petiolatis, staminibus corollâ longioribus. *Linn. sp. pl. 576, n. 3 ; Scop. fl. carn. sp. 748 ; Blakw. herb. tab. 32 ; Lobel, kruyd-b. 602.*

*Mentha foliis ovato-lanceolatis, serratis, verticillis paucissimis, terminante maximo. Hall. hist., n. 225.*

*Mentha aquatica sive Sisymbrium. Bauh. hist. 3, fol. 223.*

*Sisymbrium sylvestre. Dalech. hist. 1, fol. 579.*

*Sisymbrium. Dodon. kruyd-b. fol. 132.*

Belgicè : *Roode-Munte* ; gallicè : *Baume d'eau.*

Ad ripam Canalis, propè *Tres Fontes*, ad *Anderlegt, etc.*

458. *M. ARVENSIS.* Floribus verticillatis, foliis ovatis, acutis, serratis, staminibus corollam æquantibus. *Linn. sp. pl. 577, n. 6 ; Scop. fl. carn. sp. 746 ; Fl. dan. tab. 512.*

*Mentha Floribus verticillatis, foliis hirsutis, ovato-lanceolatis, verticillis tomentosis. Hall. hist. n. 223.*

*Mentha arvensis verticillata hirsuta. Bauh. hist. 3, fol. 217 ; Moris. hist. 3, fol. 369, tab. 9, fig. 5 ; Boerh. hort. lugd. 185.*

*Calamintha arvensis verticillata. Bauh. pin. 229.*

*Pulegium sylvestre. Dodon. kruyd-b. 135.*

Belgicè : *Wilde Poley* ; gallicè : *Pouliot sauvage.*

Communis post messem, propè villam *Hertog*, vulgo *op den Hoogenleest*, ad *Laken*. Inito septembris floret.

459. *M. PULEGIUM*. Floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis, subcrenatis, caulibus subteretibus, repentibus, staminibus corollâ longioribus. *Linn. sp. pl.* 577, n. 8; *Scop. fl. carn. sp.* 747; *Blakw. herb. tab.* 302.

*Pulegium latifolium*. *Bauh. pin.* 222; *Boerh. hort. lugd.* 186.

*Pulegium regium vulgatum*. *Lobel, kruyd-b.* 590.

*Pulegium regium*. *Dalech. hist.* 1, fol. 775; *Moris. hist.* 3, fol. 371.

*Pulegium*. *Dodon. kruyd-b.* 454; *Bauh. hist.* 3, fol. 258. Belgicè : *Poley*; gallicè : *Pouliot*.

Inveni in arvo *Van Schaftingen*, juxtà viam ab *St.-Gillis*, ad *Carloo* ducentem. Alibi non vidi.

207. *GLECOMA*. Calix quinquefidus; antherarum singula paria in formam crucis conniventia.

460. *G. HEDERACEA*. Foliis reniformibus crenatis *Linn. sp. pl.* 578, n. 1.

*Chamæclema* caule procumbente, radicato, foliis reniformibus, rotunde crenatis. *Hall. hist.*, n. 245.

*Chamæclema* vulgare. *Boerh. hort. lugd.* 172.

*Hedera terrestris vulgaris*. *Bauh. pin.* 306; *Blakw. herb. tab.* 225.

*Hedera terrestris*. *Dodon. kruyd-b.* 644; *Lobel, kruyd-boek.* 730.

*Calamintha hederacea*. *Scop. fl. carn. sp.* 730.

Belgicè : *Onderhave*; gallicè : *Lierre terrestre*.

Sub sepibus ubiquè. Aprili floret.

208. *LAMIUM*. Labium superius corollæ integrum, fornicatum; labium inferius obcordatum, faux utrinquè dente setaceo.

461. *L. ALBUM*. Foliis cordatis, acuminatis, serratis, petiolatis, verticillis vigintifloris. *Linn. sp. pl.* 579, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 700; *Blakw. herb. tab.* 33.

*Lamium* foliis cordato-lanceolatis, serratis, verticillis multifloris. *Hall. hist.*, n. 271,

*Lamium album non fætens, folio oblongo. Bauh. pin. 231.*

*Urtica iners prima. Dodon. kruid-b. 226.*

*Galeopsis, sive Urtica iners floribus albis. Bauh. hist. 3, fol. 322.*

*Lamium, sive Archangelica flore albo. Lobel, kruid-boek; 615.*

Belgicè : *Doove Netel*; gallicè : *Lamier blanc*.

Sub sepibus ubiquè. Fine aprilis floret; perennis.

462. *L. PURPUREUM*. Foliis cordatis, obtusis, petiolatis. *Linn. sp. pl. 579, n. 2; Scop. fl. carn. sp. 701; Gouan, fl. monsp. 90.*

*Lamium foliis cordatis, obtusis, in summo ramo congestis. Hall. hist.; n. 272.*

*Lamium purpureum fætidum, folio subrotundo. Bauh. pin. 230.*

*Galeopsis floribus purpurascentibus. Lobel, kruid-b. 614.*

*Urtica iners altera. Dodon. kruid-b. 226.*

*Galeopsis sive Urtica iners folio et flore minore. Bauh. hist. 3, fol. 323.*

*Lamium annuum vulgare rubrum. Moris. hist. 3, fol. 385.*

Belgicè : *Stinkende Netel*; gallicè : *Lamier puant*.

In hortis, versuris, etc. Initio aprilis florens; annua.

209. *GALEOPSIS*. Labium superius corollæ subcrenatum, fornicatum; labium inferius trifidum, faux tubo paulò latior, supra basin labii inferioris, utrinquè dente obtusiusculo, concavo.

463. *G. LADANUM*. Internodiis caulinis æqualibus, verticillis omnibus remotis, calicibus campanulatis, pubescentibus, dentibus lineari-setaceis, longioribus. *Linn. syst. veget. 905, n. 1; Scop. fl. carn. sp. 727; Gouan. fl. monsp. 90.*

*Galeopsis foliis linearibus, serratis, verticillis dissitis. Hall. hist.; n. 266.*

*Sideritis arvensis angustifolia rubra. Bauh. pin. 233.*

*Galeopsis patula segetum, flore purpurascente. Tourn. inst. 185.*

*Ladanum segetum flore rubro quorundam. Bauh. hist. 3, fol. 855.*

*Sideritis prima.* *Clus. hist. rar.* 39, p. 2.

Belgicè : *Glid-kruyd.*

Ad margines arborum propè *Zellik*, etc. Junio floret; annua.

464. *G. TETRAHIT.* Internodiis caulinis supernè incrassatis, verticillis summis subcontiguïs, calicibus ventricosis, dentibus longissimis, setaceis, æqualibus. *Linn. syst. veget.* 905, n. 3; *Scop. fl. carn. sp.* 728.

*Galeopsis* caule hirsuto, foliis ovato-lanceolatis, serratis. *Hall. hist.*, n. 268.

*Cannabis sylvestris*, spuria altera. *Lobel, kruyd-b.* 624.

*Cannabina* flore purpurascente. *Boerh. hort. lugd.* 159.

*Cannabis sylvestris* quorundam. *Bauh. hist.* 3, app. 854.

*Urtica aculeata*, foliis serratis. *Bauh. pin.* 232.

Belgicè : *Wilde-Kemp*; gallicè : *Crapaudine.*

In hortis olitoriis, sub sepibus, etc. Junio floret.

465. *G. CANNABINA.* Verticillis summis subcontiguïs, calicibus tubulosis, dentibus brevioribus, linearibus, inæqualibus, tribus majoribus. *Linn. syst. veget.* 905, n. 4.

*Galeopsis* caule hirsuto, foliis ovato-lanceolatis, serratis, flore calice quadruplo majore. *Hall. hist.*, n. 269.

*Cannabina* flore magno, luteo, labiis purpureis. *Boerh. hort. lugd.* 159.

*Cannabis sylvestris* spuria tertia. *Lobel, kruyd-b.*, 624.

*Galeopsis angustifolia*, flore variegato. *Tourn. inst.* 185.

Belgicè : *Valsche-Kemp.*

Ad margines hortorum. *Schaerbeek, Ten-Noode*, etc. Annua; julio florens.

210. *POLLICHIA.* Corollæ labium superius integrum, fornicatum; faux absque dentibus.

466. *P. GALEOBDOLON.* Calicibus pungentibus, corollæ labio inferiore trifido, foliis omnibus dentatis, petiolatis. *Linn. syst. veget.* 905, n. 1.

*Cardiaca* foliis petiolatis, cordatis, verticillis foliosis. *Hall. hist.*, n. 274.

*Leonurus galeobdolon.* *Scop. fl. carn. sp.* 705.

*Lamium folio oblongo luteum.* *Bauh. pin.* 231.

*Galeopsis Galeobdolon.* *Linn. sp. pl.* 580, n. 4;

*Gouan. fl. monsp.* 91.

*Urtica iners* tertia. *Dodon. kruyd-b. fol.* 226.  
 Belgicè : *Geële Netel*; gallicè : *Ortie jaune*.  
 In sylvis omnibus. Perennis; maio floret.

467. *P. AMPLEXICAULIS*. Calicibus inermibus, corollæ labio inferiore bifido, foliis caulinis sessilibus, rotundatis, incis, radicalibus petiolatis, cordato-lobatis. *Linn. syst. veget.* 905, n. 2.

*Lamium amplexicaule*. *Scop. fl. carn. sp.* 702; *Gouan. fl. monsp.* 90; *Fl. dan. tab.* 752.

*Lamium* foliis radicalibus petiolatis, lobatis, superioribus rotundis, amplexicaulibus, incis. *Hall. hist.* n. 273.

Morsus gallinæ folio *Hederulæ* alterum. *Lobel, kruyd-boek.* 548.

*Lamium* folio caulem ambiente. *Bauh. pin.* 231.

Belgicè : *Roo de Netel*; gallicè : *Lamier rouge*.  
 Inter olera ubiquè. Annuæ; maio florens.

211. *BETONICA*. Calix aristatus; corollæ labium superius erectum, planum, tubus cylindricus.

468. *B. OFFICINALIS*. Spicâ interruptâ, corollæ galeâ integrâ, labii laciniâ intermediâ emarginatâ, calicibus glabriusculis. *Linn. sp. pl.* 573, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 729; *Blakw. herb. tab.* 46.

*Betonica* foliis petiolatis, imis cordatis, superioribus crenatis, spicâ brevi, insidente foliis. *Hall. hist.* n. 264.

*Betonica vulgaris* purpurea. *Bauh. hist.* 3, fol. 301; *Clus. hist. rar.* 39; *Moris. hist.* 3, fol. 365.

*Betonica*. *Dodon. kruyd-b.* 50; *Lobel, kruyd-b.* 629; *Matthiol. in Diosc.* 318.

Belgicè : *Betonie*; gallicè : *Betoine*.

In sylvis *Linkenbeek*, *Alseberg*, etc. Perennis; julio florens.

212. *STACHYS*. Labium superius corollæ fornicatum, labium inferius majus, lateribus reflexum, trifidum, laciniâ intermediâ majore emarginatâ; stamina deflorata versus latera reflexa.

469. *S. SYLVATICA*. Verticillis sexfloris, foliis cordatis, petiolatis, serratis. *Linn. sp. pl.* 580, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 706; *Gouan, fl. monsp.* 91.

*Cardiaca* foliis cordatis, serratis, verticillis nudis, spicatis. *Hall. hist.*, n. 275.

*Galeopsis legitima*. *Clus. hist. rar.* 35, p. 2; *Blakw. herb. tab.* 84.

*Galeopsis procerior*, fœtida, spicata. *Tourn. inst.* 185.

*Stachys fœtida* sepium, flagellis reptatricibus. *Moris. hist.* 3, fol. 382.

*Lamium maximum* sylvaticum fœtidum. *Bauh. hist.* 3, app. 853.

Belgicè : *Wilden Anhoren*; gallicè : *Épi puant*.

Sub sepibus ubiquè. Annuæ; julio florens.

470. *S. PALUSTRIS*. Verticillis subsexfloris, foliis lineari-lanceolatis, semi-amplexicaulibus, sessilibus. *Linn. sp. pl.* 580, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 707; *Blakw. herb. tab.* 273.

*Stachys* foliis hirsutis, elliptico-lanceolatis, breviter petiolatis, verticillis spicatis. *Hall. hist.*, n. 257.

*Stachys palustris* fœtida. *Bauh. pin.* 236; *Moris. hist.* 3, fol. 383.

*Galeopsis palustris* *Betonicæ* folio. *Tourn. inst.* 185.

*Galeopsis angustifolia* fœtida. *Bauh. hist.* 3, app. 854.

Belgicè : *Water-Anhoren*; gallicè : *Epiaire des marais*.

Juxta aquas *Etterbeek*, *Elsen*, etc. Perennis, Julio florens.

471. *S. ARVENSIS*. Verticillis sexfloris, foliis obtusis, nudiusculis, corollis longitudine calicis, caule debili. *Linn. syst. veget.* 907, n. 11.

*Trixago* foliis hirsutis, ovato-cordatis, rotundè dentatis. *Hall. hist.*, n. 231.

*Marrubiastrum* vulgare. *Tourn. inst.* 190.

*Lamium paludosum* belgicum *Melissæ* folio. *Boerh. hort. lugd.* 171.

*Sideritis Alsines* *Trixaginis* folio. *Bauh. prodr.* 111; *Moris. hist.* 3, fol. 389.

*Sideritis humilis*, lato obtuso folio. *Raij. hist.* 565.

Belgicè : *Veld-Anhoren*; gallicè : *Epiaire des champs*.

In arvis *Jette*, *Ganshoren*, etc. Junio florens.

213. *BALLOTA*. Calix hypocrateriformis, quinque-dentatus, decemstriatus; labium superius corollæ crenatum, concavum.

472. *B. NIGRA*. Foliis cordatis, indivisis, serratis, calici-



- bus acuminatis. *Linn. sp. pl.* 582; *Scop. fl. carn. sp.* 714; *Blakw. herb. tab.* 136.  
 Ballota foliis cordatis, serratis, verticillis nudis. *Hall. hist., n.* 259.  
 Marrubium nigrum fœtidum. *Bauh. pin.* 230; *Dalech. hist.* 2, fol. 146.  
 Marrubium nigrum. *Dodon. kruyd-b.* 122; *Lobel, kruyd-b.* 613.  
 Ballote. *Matthiol. in Diosc.* 288; *Boerh. hort. lugd.* 175.  
 Belgicè : *Swarte Malrouwe*; gallicè : *Marrube puant*.  
 Sub sepibus ubiquè. Perennis; augusto florens.

214. MARRUBIUM. Calix hypocrateriformis; rigidus, decemstriatus, corollæ labium superius bifidum, lineare, rectum.

473. *M. VULGARE*. Dentibus calicum setaceis, uncinatis. *Linn. sp. pl.* 583, n. 5; *Scop. fl. carn. sp.* 712; *Clus. hist. rar.* 34, p. 2.  
 Marrubium album vulgare. *Bauh. pin.* 230; *Moris. hist.* 3, fol. 376; *Boerh. hort. lugd.* 156.  
 Marrubium album. *Lobel, kruyd-b.* 612; *Bauh. hist.* 3, fol. 316.  
 Marrubium candidum. *Dodon. kruyd-b.* 119.  
 Marrubium. *Matthiol. in Diosc., fol.* 289.  
 Belgicè : *Witte Malrouwe*; gallicè : *Marrube blanc*.  
 Ad margines *Haren, Machelen, etc.* Perennis; augusto florens.

215. LEONURUS. Labium superius corollæ longius, concavum, villosum, labium inferius tripartitum, laciniis subæqualibus; antheræ adspersæ punctis nitidis.

474. *L. CARDIACA*. Foliis Caulinis lanceolatis, trilobis. *Linn. sp. pl.* 584, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 703; *Fl. dan. tab.* 727.  
 Cardiacæ foliis tripartitis lanceolatis. *Hall. hist., n.* 274.  
 Cardiacæ. *Dodon. kruyd-b.* 129; *Dalech. hist.* 2, fol. 142; *Blakw. herb. tab.* 171; *Lobel, kruyd-b.* 610; *Fusch. hist.* 395; *Bauh. hist.* 3, fol. 320.  
 Marrubium Cardiacæ dictum. *Bauh. pin.* 230.  
 Belgicè : *Heerte-gespan*; gallicè : *Agripaume*.  
 Sub sepibus *Watermale, Uccle, etc.* Perennis; junio florens.

216. CLINOPODIUM. Involucrum multisetum, verticillo subjectum; stamina curvata, antheris conniventibus.

475. *C. VULGARE*. Capitulis subrotundis, hispidis, bracteis setaceis. *Linn. sp. pl.* 587, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 731; *Matthiol. in Diosc.* 285.

*Clinopodium* Matthioli. *Clus. hist. rar.* 354; *Dalech. hist.* 1, fol. 809.

*Clinopodium* Origano simile. *Bauh. pin.* 225; *Moris. hist.* 3, fol. 374.

*Clinopodium* quorundam Origani facie. *Bauh. hist.* 3, fol. 250.

*Acinos*. *Lobel, kruid-b.*, fol. 595.

Belgicè : *Wilden Basilicum*; gallicè : *Basilic sauvage*.

Ad margines inter fruteta communis. Julio floret; perennis.

217. ORIGANUM. Strobilus tetragonus, spicatus, calices colligens.

476. *O. VULGARE*. Spicis subrotundis, paniculatis, conglomeratis, bracteis ovatis, calice longioribus. *Linn. sp. pl.* 590, n. 7; *Scop. fl. carn. sp.* 740; *Dalech. hist.* 1, fol. 771; *Fl. dan. tab.* 638; *Bauh. hist.* 3, fol. 236.

*Origanum* foliis ovatis, umbellis coloratis, staminibus exsertis. *Hall. hist.*, n. 233.

*Origanum* sylvestre. *Dodon. kruid-b.* 458; *Bauh. pin.* 223; *Blakw. herb. tab.* 280; *Boerh. hort. lugd.* 179.

*Agrioriganum*. *Lobel, kruid-b.*, fol. 583.

Belgicè : *Orego*; gallicè : *Origan*.

Ad margines *Schaerbeek, Berghem, etc.* Perennis; julio florens.

218. SCUTELLARIA. Calix ore subintegro, post florescentiam clauso, operculato.

477. *S. GALERICULATA*. Foliis cordato-lanceolatis, crenatis, floribus axillaribus. *Linn. sp. pl.* 599, n. 4; *Blakw. herb. tab.* 516; *Fl. dan. tab.* 637.

*Cassida* foliis oblongè cordatis, crenatis, verticillis nudis, bifloris. *Hall. hist.*, n. 286.

*Cassida* galericulata. *Scop. fl. carn. sp.* 741.

*Cassida* palustris vulgatiores flore cæruleo. *Tourn. inst.* 182.

*Lysimachia* galericulata. *Lobel, kruid-b.* 418; *Dalech. hist.* 1, fol. 927.

Herba judaica altera. *Dodon. kruid-b.*, fol. 127.

*Textanaria*, aliis *Lysimachia* galericulata. *Bauh. hist.* 3, fol. 453.

Belgicè : *Blauwe-water-Widerik*; gallicè : *Centauree bleue*.

Juxta aquas communis. Perennis; julio florens.

## 219. THYMUS. Calix bilabiatus, faux villis clausa.

478. *T. SERPILLUM*. Caulibus repentibus, foliis planis, obtusis, basi ciliatis, floribus capitatis. *Linn. sp. pl.* 590, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 736; *Gouan, hort. monsp.* 289.

*Thymus* foliis ovatis, basi ciliatis. *Hall. hist.*, n. 235.

*Serpillum* vulgare repens. *Clus. hist. rar.* 359; *Blakw. herb. tab.* 418.

*Serpillum* vulgare. *Dodon. kruid-b.* 444; *Lobel, kruid-boek*, 507; *Bauh. hist.* 3, fol. 269; *Moris. hist.* 3, fol. 403.

*Serpillum* vulgare majus (et minus). *Bauh. pin.* 220.

Belgicè : *Kwendel*; gallicè : *Serpolet*.

Ad margines siccis ubiquè. Perennis; floret ferè per totam æstatem.

479. *T. ACINOS*. Floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis, subramosis, foliis acutis, serratis. *Linn. sp. pl.* 591, n. 4; *Scop. fl. carn. sp.* 735; *Gouan, hort. monsp.* 290.

*Clinopodium* foliis ovatis, dentatis, flore folio brevior. *Hall. hist.*, n. 237.

*Clinopodium* vulgare. *Lobel, kruid-b.* 598; *Clus. hist. rar.* 354.

*Clinopodium* arvense *Ocymi* facie. *Bauh. pin.* 225.

*Ocimum* sylvestre sive *Acinos*. *Dodon. kruid-b.* 450.

Belgicè : *Wilde Marjolyne*; gallicè : *Thym sauvage*.

Ad *Diegem* propè molam chartariam, ad *Bootendal*, in margine sylvæ in quâ olim cœnobium fuit, etc. fine julii floret.

220. **MELISSA.** Calix aridus, angulatus, labio superiori reflexo-patente; corollæ labium superius subforficatum, bifidum, labium inferius lobo medio cordato.
480. *M. CALAMINTHA.* Pedunculis axillaribus, dichotomis, longitudine foliorum. *Linn. sp. pl.* 593, n. 3; *Blakw. herb. tab.* 166.  
*Melissa* foliis subhirsutis, ovato-lanceolatis, acutè serratis, petiolis florigeris ramosis, folia superantibus. *Hall. hist.*, n. 241.  
*Thymus Calamintha.* *Scop. fl. carn. sp.* 733.  
*Calamintha vulgaris.* *Bauh. hist.* 3, fol. 228; *Bauh. pin.* 228.  
*Calamintha montana.* *Dodon. kruyd-b.* 134; *Lobel, kruyd-b.* 605; *Matthioli. in Diosc.* 250; *Dalech. hist.* 1, fol. 787.  
 Belgicè : *Calamint*; gallicè : *Calament*.  
 In versuris horticorum *Schaerbeek, St.-Gillis.* Perennis; julio florens. *Rarior*.
221. **PRUNELLA.** Filamenta bifurca, altero apice antherifera; stigma bifidum.
481. *P. VULGARIS.* Foliis omnibus ovato-oblongis, serratis, petiolatis, calicibus labio superiore truncato, subtridentato. *Linn. sp. pl.* 600, n. 1; *Bauh. hist.* 3, fol. 428; *Hall. hist.*, n. 277.  
*Brunella vulgaris.* *Scop. fl. carn. sp.* 715; *Gouan, hort. monsp.* 294.  
*Brunella.* *Dodon. kruyd-b.* 197; *Blakw. herb. tab.* 24.  
*Brunella major* folio non dissecto. *Bauh. pin.* 260.  
*Symphitum petræum.* *Lobel, kruyd-b.*, fol. 559.  
 Belgicè : *Bruynelle*; gallicè : *Brunelle*.  
 In pratis omnibus. Perennis; junio florens.

## ANGIOSPERMIA.

222. **RHINANTHUS.** Calix quadrifidus, inflatus; capsula bilocularis, obtusa, compressa; semina pauca.
482. *R. CRISTA-GALLI.* Corollis labio superiori compresso, breviori, calicibus glabris. *Linn. sp. pl.* 603, n. 3; *Bull. herb. franc. tab.* 125.

*Alectorolophus calicibus glabris. Hall. hist., n. 313.*

*Mimulus Crista-galli. Scop. fl. carn. sp. 751.*

*Crista-galli. Dodon. kruid-b. 884; Lobel, kruid-b. 626.*

*Crista-galli femina. Bauh. hist. 3, fol. 436.*

*Pedicularis palustris lutea, vel Crista galli. Bauh. pin. 163.*

Belgicè : *Haene-Kam, Ratel*; gallicè : *Crête de coq*.  
In pratis ubiquè. Annua; maio florens.

226. **EUPHRASIA.** Calix quadrifidus, cylindricus; antheræ inferiores altero lobo basi spinosæ; capsula bilocularis, ovato-oblonga, semina pauca, deorsum incumbentia.

483. *E. OFFICINALIS.* Foliis ovatis, lineatis, argutè dentatis. *Linn. sp. pl. 604, n. 2; Scop. fl. carn. sp. 753; Blakw. herb. tab. 427; Hall. hist., n. 303.*

*Euphrasia officinarum. Bauh. pin. 233; Moris. hist. 3. fol. 430.*

*Euphrasia. Dodon. kruid b. 71; Lobel, kruid-b. 580; Bauh. hist. 3, fol. 432; Matthiol. in Diosc. 337; Dalech. hist. 2, fol. 66.*

Belgicè : *Oogen-Troost*; gallicè : *Eufraise*.

In locis siccis ubiquè. Annua; septembri florens.

484. *E. ODONTITES.* Foliis linearibus, omnibus serratis; *Linn. sp. pl. 604, n. 4; Scop. fl. carn. sp. 754, Fl. dan. tab. 655.*

*Odontites bracteis serratis, hirsutis. Hall. hist., n. 304.*

*Euphrasia altera. Dodon. kruid-b. 71; Lobel, kruid-b. 580.*

*Euphrasia pratensis rubra. Bauh. pin. 234; Moris. hist. 3, fol. 431; Boerh. hort. lugd. 236.*

*Euphrasia parva purpurea. Bauh. hist. 3, fol. 433.*

Belgicè : *Grooten Oogen-Troost*; gallicè : *Grande Eufraise*. Cum precedenti.

224. **MELAMPYRUM.** Calix quadrifidus; corollæ labium superius compressum, margine replicato; capsula bilocularis, compressa, obliqua; semina solitaria.

485. *M. SYLVATICUM.* Floribus secundis, lateralibus,

ANGIOSPERMIA. 225

foliorum conjugationibus remotis, corollis hiantibus. *Linn. sp. pl.* 605, n. 5; *Scop. fl. carn. sp.* 759; *Gouan, fl. monsp.* 98; *Bauh. hist.* 3, fol. 441.

*Melampyrum* foliis integerrimis, floribus hiantibus. *Hall. hist.*, n. 307.

*Melampyrum* luteum latifolium. *Bauh. pin.* 234; *Morris. hist.* 3, fol. 420; *Boerh. hort. lugd.* 236, n. 2.

*Parietaria* sylvestris secunda. *Clus. hist. rar.* 44, p. 2.

Belgicè : *Koey-terwe*; gallicè : *Bled de vache*.

In sylvis *Linthout*, *Lorbeek*, etc. Annuæ; junio florens.

225. **PEDICULARIS.** Calix quinquefidus; capsula bilocularis, mucronata, obliqua; semina tunicata, pauca.

486. *P. SYLVATICA.* Caule ramoso, calicibus oblongis, angulatis, lævibus, corollis labio cordato. *Linn. sp. pl.* 607, n. 2; *Fl. dan. tab.* 225; *Gouan, fl. monsp.* 103.

*Pedicularis* caule ramoso, procumbente, foliis pinatis, pinnis dentatis. *Hall. hist.*, n. 321.

*Pedicularis* pratensis purpurea. *Bauh. pin.* 163.

*Pedicularis* quibusdam Crista galli flore rubro. *Bauh. hist.* 3, fol. 437.

*Pedicularis.* *Lobel, kruyd-b.*, fol. 913.

*Fistularia.* *Dodon. kruyd-b.*, fol. 885.

Belgicè : *Luysen-kruyd*; gallicè : *Pediculaire des bois*.

In humidis sylvarum. *Vorst, Heder*, etc. Junio florens

226. **ANTIRRHINUM.** Calix quinquepartitus; corolla basi gibba aut calcarata; capsula bilocularis, polysperma, apice dehiscens in lacinias reflexas.

487. *A. CYMBALARIA.* Foliis cordatis, quinquelobis, alternis, caulibus procumbentibus. *Linn. sp. pl.* 612, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 770.

*Cymbalaria* caule repente, foliis reniformibus quinquelobatis. *Hall. hist.*, n. 339.

*Cymbalaria* italica, folio hederaceo. *Lobel, kruyd-b.* 733.

*Cymbalaria* flosculis purpurascens. *Bauh. hist.* 3, fol. 685.

*Cymbalaria*. *Matthiol. in Diosc.* 364; *Dalech. hist.* 2, fol. 211; *Bauh. pin.* 306.

Belgicè : *Navel kruid*; gallicè : *Cymbalaire*.

Inter fissuras murorum communis. Maio florens; perennis.

488. *A. ELATINE*. Foliis hastatis, alternis, caulibus procumbentibus. *Linn. sp. pl.* 612, n. 3; *Scop. fl. carn. sp.* 772; *Blakw. herb. tab.* 170.

*Antirrhinum* caule procumbente, foliis hastatis, imis conjugatis, superioribus alternis. *Hall. hist.*, n. 340.

*Elatine* folio acuminato, flore cæruleo et luteo. *Bauh. pin.* 253.

*Elatine* femina, folio anguloso. *Bauh. hist.* 3, fol. 372.

*Elatine* altera. *Dodon. kruid-b.* 54; *Lobel, kruid-b.* 554.

*Elatine* *Matthioli*. *Dalech. hist.* 2, fol. 133.

Belgicè : *Aerd-winde*; gallicè : *Velvete*.

Ad margines *Schaerbeek*, vulgò *in de Groen-stræet*, etc. Annuæ; junio florens.

489. *A. SPURIUM*. Foliis ovatis, alternis, villosis, caulibus procumbentibus. *Linn. sp. pl.* 613, n. 4; *Scop. fl. carn. sp.* 771.

*Antirrhinum* caule procumbente, foliis villosis, ovatis, imis conjugatis, superioribus alternis. *Hall. hist.*, n. 341.

*Elatine* folio subrotundo. *Bauh. pin.* 252.

*Linaria* *Segetum* *Nummulariæ* folio villosa. *Tourn. inst.* 169.

*Veronica* femina. *Dodon. kruid-b.* 53; *Lobel, kruid-boek*, 554; *Dalech. hist.* 2, fol. 134; *Matthiol. in Diosc.* 244.

Belgicè : *Eeren-prys-wysken*; gallicè : *Velvete semelle*.

Ad margines pratorum *Elmet*, vulgò *Mon-Plaisir*, etc. Annuæ; julio florens.

490. *A. LINARIA*. Foliis lanceolato-linearibus, alternis, confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis. *Linn. sp. pl.* 616, n. 21; *Scop. fl. carn. sp.* 768.

*Antirrhinum* foliis linearibus, adscendentibus, congestis, caule erecto, spicato. *Hall. hist.*, n. 336.

*Linaria* vulgaris lutea. *Bauh. pin.* 212; *Tourn. inst.* 170; *Boerh. hort. lugd.* 231; *Bauh. hist.* 3, fol. 456; *Blakw. herb. tab.* 115.

- Linaria prima*. Dodon. *kruyd-b.* 277; Lobel, *kruyd-boek*, 493.  
 Belgicè : *Wild Vlas*; gallicè : *Linairè*.  
 Sub sepibus, ad margines ubiquè. Perennis; augusto florens.
491. *A. MINUS*. Foliis plurimis alternis, lanceolatis, obtusis, caule ramosissimo, diffuso, floribus caudatis, solitariis. Linn. *sp. pl.* 617, n. 24; Scop. *fl. carn. sp.* 769.  
 Antirrhinum viscidum, foliis inferioribus conjugatis, ellipticis, obtusis, calcare dimidii floris longitudine. Hall. *hist.*, n. 335.  
 Anthirrinum alterum, minimum, repens. Lobel, *kruyd-b.* 492.  
 Anthirrinum minimum. Bauh. *hist.* 3, fol. 465.  
 Antirrhinum arvense minus. Bauh. *pin.* 212.  
 Linaria Pumila vulgatiore arvensis. Tourn. *inst.* 169.  
 Linaria minima foliis hirsutis. Boerh. *hort. lugd.* 232.  
 Belgicè : *Kleyn Orant*; gallicè : *Petite Linairè*.  
 In hortis olitoriis Schaerbeek, St.-Gillis, etc. Annua; julio florens.
492. *A. ARVENSE*. Foliis sublinearibus, inferioribus quaternis, calicibus piloso-viscidis, floribus spicatis, caule erecto. Linn. *sp. pl.* 614, n. 12; Gouan, *hort. monsp.* 300.  
 Linaria altera purpurea. Dodon. *kruyd-b.* 278.  
 Linaria arvensis cærulea. Bauh. *pin.* 213; Tourn. *inst.* 170.  
 Linariæ purpureæ varietas. Lobel, *kruyd-b.* 494.  
 Belgicè : *Blauw Lyn - kruyd*; gallicè : *Linairè des champs*.  
 Inveni hanc rarissimam plantam juxta viam à Stokkel ad St.-Lambregts-Woluwe ducentem. Florebat initio augusti.
493. *A. ORONTIUM*. Corollis ecaudatis, floribus subspicatis, calicibus digitatis, corollis longioribus. Linn. *sp. pl.* 617, n. 26; Scop. *fl. carn. sp.* 774.  
 Antirrhinum arvense majus. Bauh. *pin.* 212; Tourn. *inst.* 168; Boerh. *hort. lugd.* 233.  
 Antirrhinum minus seu sylvestre. Dodon. *kruyd-b.* 276.  
 Antirrhinum angustifolium sylvestre. Bauh. *hist.* 3, fol. 464.  
 Antirrhinum minimum. Lobel, *kruyd-b.* 492.



*Antirrhinum arvense minus*. *Moris. hist. 2, fol. 505*;  
Belgicè : *Orant* ; gallicè : *Musle-de-veau sauvage*.  
In arvis inter *Schaerbeek* et *Ten-Noode*. Annuæ ; au-  
gusto florens.

227. **SCROPHULARIA**. Calix quinquefidus ; co-  
rolla quinquepartita, tubo globoso, laciniâ in-  
fimâ reflexâ ; capsula bilocularis, dissepimento  
duplicato.

494. *S. NODOSA*. Foliis cordatis, trinervatis, caule ob-  
tusangulo. *Linn. sp. pl. 619, n. 2* ; *Scop. fl. carn.*  
*sp. 775* ; *Blakw. herb. tab. 87*.

*Scrophularia* caule quadrangulâ, paniculato, foliis  
cordatis oblongis. *Hall. hist., n. 326*.

*Scrophularia nodosa* fœtida. *Bauh. pin. 235* ; *Tourn.*  
*inst. 166*.

*Scrophularia vulgaris major*. *Bauh. hist. 3, fol. 421*.

*Scrophularia major*. *Dodon. kruid-boek 65* ; *Lobel,*  
*kruid-b. 632* ; *Dalech. hist. 1, fol. 950* ; *Matthiol.*  
*in Diosc. 365*.

Belgicè : *Klier-kruid* ; gallicè : *Scrophulaire*.

In sepibus *Ganshoren*, *Jette*, etc. Perennis ; augusto  
florens.

495. *S. AQUATICA*. Foliis cordatis, petiolatis, decurren-  
tibus, obtusis, caule membranâ angulato, racemis  
terminalibus. *Linn. sp. pl. 620, n. 3* ; *Scop. fl. carn.*  
*sp. 776* ; *Blakw. herb. tab. 86*.

*Scrophularia* caule quadrangulo, alato, paniculato,  
foliis ovato-lanceolatis. *Hall. hist., n. 325*.

*Scrophularia radice fibrosâ*. *Moris. hist. 2, fol. 482* ;  
*Boerh. hort. lugd. 234*.

*Scrophularia maxima*, radice fibrosâ. *Bauh. hist. 3,*  
*fol. 421*.

*Betonica aquatica*. *Dodon. kruid-b. 65* ; *Lobel, kruid-*  
*boek, 632*.

Belgicè : *Water-betonie* ; gallicè : *Betoine d'eau*.

Juxta aquas *Elsen*, *Etterbeek*, etc. Julio floret ;  
biennis.

228. **DIGITALIS**. Calix quinquepartitus ; corolla  
campanulata, quinquefida, ventricosa ; capsula  
ovata, polysperma.

496. *D. PURPUREA*. Foliolis calicis ovatis, acutis ; corollis

obtusis, labio superiore integro. *Linn. sp. pl.* 621, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 780; *Blakw. herb. tab.* 16; *Dodon. kruid-b.* 253; *Bauh. hist.* 2, fol. 812; *Lobel, kruid-b.* 674; *Dalech. hist.* 1, fol. 719.  
*Digitalis purpurea*, folio aspero. *Bauh. pin.* 243; *Tourn. inst.* 165; *Boerh. hort. lugd.* 228, n. 1—3; *Moris. hist.* 2, fol. 478.  
 Belgicè : *Vingerhoed-kruid*; gallicè : *Digitale*.  
 In sylvis *Heder*, prope *het Vleug-gat*. Biennis; julio florens.

229. OROBANCHE. Calix subbifidus; corolla ringens, glandulo sub basi germinis; capsula unilocularis, polysperma.
497. *O. MAJOR*. Caule simplicissimo, pubescente, staminibus subexsertis. *Linn. sp. pl.* 632, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 782.  
 Orobanche caule simplici, stipulâ unicâ, calice quadrifido. *Hall. hist.*, n. 295.  
*Orobanche major caryophyllum olens*. *Bauh. pin.* 87; *Tourn. inst.* 176; *Moris. hist.* 3, fol. 502; *Boerh. hort. lugd.* 240.  
*Orobanche prima*. *Clus. hist. rar.*, fol. 270.  
*Orobanche*. *Dodon. kruid-b.*, fol. 880.  
*Rapum Genistæ*. *Lobel, kruid-b.*, fol. 302.  
 Belgicè : *Brem-raep*; gallicè : *Orobanche*.  
 In arvis *Laeken*, *Jette*, etc. inter *Trifolia*; julio floret.
498. *O. RAMOSA*. Caule ramoso, corollis quinquefidis. *Linn. sp. pl.* 633, n. 5, *Bull. herb. franc. tab.* 399; *Gouan, hort. monsp.* 308; *Bauh. pin.* 88; *Moris. hist.* 3, fol. 502.  
 Orobanche caule ramoso, flore quinquepartito. *Hall. hist.*, n. 296.  
*Orobanche tertia*. *Clus. hist. rar.*, fol. 271.  
*Orobanche minor purpureis floribus sive ramosa*. *Bauh. hist.* 2, fol. 782; *Tourn. inst.* 176.  
 Belgicè : *Smeér-kruid*; gallicè : *Orobanche rameuse*.  
 Prope *Machelen* florentem vidi mense julio. *Precedenti multo rarior*.

## CLASSIS DECIMA QUARTA.

## TETRADYNAMIA.

## SILICULOSA.

230. DRABA. Silicula integra, ovali-oblonga, compressiuscula, valvis planiusculis, dissepimento parallelis; stylus nullus.

499. *D. Verna*. Scapis nudis, foliis subserratis. *Linn. sp. pl.* 642, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 792; *Gouan. hort. monsp.* 313.

*Draba cauliculis nudis, foliis subhirsutis, tridentatis. Hall. hist., n.* 496.

*Alysson vulgare* Polygoni folio, caule nudo. *Tourn. inst.* 217; *Boerh. hort. lugd. fol.* 4, p. 2.

*Bursa pastoris minor* loculo oblongo. *Bauh. pin.* 108.

*Paronichia Alsine* folio. *Lobel, kruid-b. fol.* 553.

*Paronichia prima. Dodon. kruid-b. fol.* 155.

Belgicè : *Kleyn Borsekens kruid.*

In arvis ubique. Annuæ; aprili florens.

231. MOENCHIA. Silicula integra, ovata, stylo coronata, valvis convexiusculis, dissepimento parallelis, loculis polyspermis.

500. *M. SATIVA*. Floribus racemosis, petalis integerri-  
mis, siliculis subovatis. *Linn. syst. veget.* 971, n. 2.

*Myagrum sativum. Linn. sp. pl.* 641, n. 6; *Bauh. pin.* 109.

*Alyssum sativum. Scop. fl. carn. sp.* 794.

*Alyssum foliis sagittatis, siliquis cordiformibus. Hall. hist., n.* 489.

*Alyssum segetum foliis auriculatis acutis. Tourn. inst.* 217.

*Camelina, sive Myagrum. Dodon. kruid-b.* 853; *Lobel, kruid-b. fol.* 268; *Dalech. hist.* 2, fol. 38, *Bauh. hist.* 2, fol. 892.

Belgicè : *Turkshoren* ; gallicè : *Caméline*.

In arvis, prope *Kleyenen Bygaerde*, etc. Annuæ; augusto florens. *Variat foliis denticulatis et integris*.

232. *LEPIDIUM*. Silicula emarginata, compressa, valvis carinatis; loculis monospermis.

501. *L. SATIVUM*. Floribus tetradinamis, foliis oblongis, multifidis. *Linn. sp. pl.* 644, n. 9; *Gouan, hort. monsp.* 315; *Bauh. prodrom. tab.* 43.

*Nasturtium hortense*. *Dodon. kruid-b.* 1112; *Lobel, kruid-b.* 254; *Dalech. hist.* 1, fol. 559; *Matthiol. in Diosc.* 203; *Tourn. inst.* 213; *Blakw. herb. tab.* 23.

*Nasturtium hortense vulgare tenuiter divisum*. *Moris. hist.* 2, fol. 300.

*Nasturtium vulgare*. *Bauh. hist.* 2, fol. 912.

Belgicè : *Hof-Kersse*; gallicè : *Cresson alenois*.

Ad *Schaerbeek*, *Anderlegt*, *St.-Gillis*, etc., juxta hortos. Annuæ; junio florens.

233. *THLASPI*. Silicula emarginata, obcordata, valvis navicularibus emarginato-carinatis; loculis polyspermis.

502. *T. ARVENSE*. Siliculis orbiculatis, foliis oblongis, dentatis, glabris. *Linn. sp. pl.* 646, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 810; *Fl. dan. tab.* 793.

*Nasturtium siliquis orbiculatis, planis, foliis oblongis, dentatis, glabris*. *Hall. hist.*, n. 511.

*Thlaspi arvense siliquis latis*. *Bauh. pin.* 105; *Tourn. inst.* 212; *Moris. hist.* 2, fol. 293; *Bauh. hist.* 2, fol. 923.

*Thlaspi latius*. *Dodon. kruid-b.* 1114; *Blakw. herb. tab.* 68.

*Thlaspi Dioscoridis*. *Lobel, kruid-b.* 255.

Belgicè : *Wissel-kruid*; gallicè : *Sénévé sauvage*.

In arvis *Laken*, vulgò *op den Stuyvenberg*. Annuæ; junio florens.

503. *T. BURSA PASTORIS*. Siliculis compressis, obcordato-triangulis, valvis dorso nudis, obtusis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Linn. sp. pl.* 647, n. 9; *Scop. fl. carn. sp.* 808; *Blakw. herb. tab.* 5.

*Nasturtium siliquis triangulis. Hall. hist. 514.*

*Bursa pastoris. Dodon. kruid-b. 141; Lobel, kruid-b. 263; Dalech. hist. 2, fol. 1; Matthiol. in Diosc. 204; Bauh. hist. 2, fol. 936; Bauh. pin. 108.*

Belgicè : *Teskens-kruid*; gallicè : *Bourse à berger.*

*Juxta vias ubique. Variat foliis integerrimis aut simpliciter dentatis, caule ramoso et simplicissimò.*

504. *T. CAMPESTRE.* Siliculis subrotundis, foliis sagittatis, dentatis, incanis. *Linn. sp. pl. 646, n. 7; Scop. fl. carn. sp. 807; Blakw. herb. tab. 407; Gouan, hort. monsp. 317.*

*Nasturtium foliis imis petiolatis, ovatis, caulinis sagittatis, dentatis. Hall. hist., n. 509.*

*Thlaspi arvense Vaccariæ folio incano. Bauh. pin. 106.*

*Thlaspi vulgatus. Bauh. hist. 2, fol. 921; Tourn. inst. 212.*

*Thlaspi vulgatissimum Vaccariæ folio. Lobel, kruid-boek, 255.*

*Thlaspi primum. Matthiol. in Diosc. 203; Dalech. hist. 1, fol. 564.*

*Thlaspi alterum. Dodon. kruid-b. fol. 1115.*

Belgicè : *Wilde Kersse*; gallicè : *Sénévé commun.*

*In arvis Anderlegt, juxta viam ad Dilbeek ducentem. Biennis; maio florens.*

234. *COCHLEARIA.* Silicula emarginata, turgida, scabra, polysperma; valvis gibbis, obtusis.

505. *C. CORONOPUS.* Foliis pinnatifidis, caule depresso. *Linn. sp. pl. 648, n. 5; Scop. fl. carn. sp. 800; Gouan, hort. monsp. 318.*

*Nasturtium sylvestre, capsulis cristatis. Tourn. inst. 214.*

*Coronopus Ruellii. Lobel, kruid-b. 525; Dalech. hist. 1, fol. 572; Bauh. hist. 2, fol. 919.*

*Coronopus. Hall. hist., n. 502; Blakw. herb. tab. 120.*

*Cornu cervi alterum. Dodon. kruid-b., fol. 152.*

Belgicè : *Krayen-voet*; gallicè : *Cresson-corne de cerf.*

*Juxta Canalem, prope molam serrariam. Junio floret.*

506. *C. ARMORACIA.* Foliis radicalibus lanceolatis, crenatis, caulinis incisis. *Linn. sp. pl. 648, n. 6; Gouan, hort. monsp. 318; Blakw. herb. tab. 415.*

*Nasturtium foliis radicalibus lanceolatis, crenatis, caulinis incisis. Hall. hist., n. 504.*

*Cochlearia folio cubitali. Tourn. inst. 215; Boerh. hort. lugd. 10, p. 2.*

*Raphanus rusticus. Lobel, kruid-b. 394; Bauh. pin. 96.*

*Raphanus sylvestris Armoracia multis. Bauh. hist. 2, fol. 851.*

*Raphanus magnus. Dodon. kruid-b., fol. 1058.*

Belgicè : *Meer-radys*; gallicè : *Crame*.

Ad *Schaerbeek*, in *den Neérweg*; prope *Curegem*, etc. Perennis; maio florens.

235. **IBERIS.** Corolla inæqualis, petalis duobus exterioribus majoribus; silicula subrotunda, compressa, septo contrario, loculis monospermis.

507. *I. AMARA.* Herbacea, foliis lanceolatis, acutis, subdentatis, floribus racemosis. *Linn. sp. pl. 649, n. 7; Scop. fl. carn. sp. 806; Gouan, hort. monsp. 319.*

*Iberis foliis dilatatis, dentatis, floribus umbellatis. Hall. hist., n. 520.*

*Thlaspi umbellatum arvense amarum. Bauh. hist. 2, fol. 925; Tourn. inst. 213; Boerh. hort. lugd. 7, p. 2.*

*Thlaspi umbellatum arvense, Iberidis folio. Bauh. pin. 106.*

*Thlaspi amarum. Tabern. icon. pl. 173, p. 2.*

Ad *Vorst*, prope *het Vosse-gat*, juxta sepimentum *D. Passy*, nec alibi. Fine julii floret; annua.

508. *I. NUDICAULIS.* Herbacea, foliis sinuatis, caule nudo, simplici. *Linn. sp. pl. 650, n. 10; Gouan, hort. monsp. 319; Fl. dan. tab. 323.*

*Iberis foliis pinnatis, pinnis ovatis, acutis. Hall. hist., n. 521.*

*Bursa pastoris minor, foliis incisis. Bauh. pin. 108.*

*Bursa pastoris minor. Dodon. kruid-b. 142.*

*Bursa pastoris minima. Lobel, kruid-b. 262.*

*Bursa pastoris parvo folio, glabro, spisso. Bauh. hist., 2, fol. 937.*

Belgicè : *Kleyn Teskens-kruid*.

Juxta vias, hortos, etc. Annua; julio florens.

---

### SILICULOSA.

236. **CARDAMINE.** Siliqua longa, anceps, elastice dehiscens, valvis revolutis; dissepimento mem-

branaceo, parallelo; stigma integrum, capitatum; calix subhians.

509. *C. PRATENSIS*. Foliis pinnatis, foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis. *Linn. sp. pl.* 656, n. 11; *Scop. fl. carn. sp.* 819; *Blakw. herb. tab.* 223; *Hall. hist.*, n. 473.

Cardamine pratensis magno flore. *Tourn. inst.* 224.

Cardamine altera. *Lobel, hruid-b.* 252; *Clus. hist. rar.* 128, p. 2.

Nasturtium pratense magno flore. *Bauh. pin.* 104.

Iberis Fuschii sive Nasturtium pratense. *Bauh. hist.* 2, fol. 889.

Flos Cuculi. *Dodon. hruid-b.* fol. 937.

Belgicè: *Koekhoeks-bloem*; gallicè: *Cresson des prés*;

In pratis humidis ubiquè. Perennis; maio florens.

510. *C. HIRSUTA*. Foliis pinnatis, foliolis subrotundis; obiter creuatis, petiolis semicylindricis, basi ciliatis, floribus interdum tetrandris. *Linn. sp. pl.* 655, n. 10; *Scop. fl. carn. sp.* 817, tab. 38.

Cardamine sive Sisymbrium alterum. *Lobel, hruid-b.* 252.

Cardamine quarta. *Dalech. hist.* 1, fol. 563; *Tourn. inst.* 224.

Sisymbrium cardamine, hirsutum, minus. *Bauh. hist.* 2, fol. 888.

Nasturtium aquaticum minus. *Bauh. pin.* 104.

Belgicè: *Wilde Kersse*; gallicè: *Cresson sauvage*.

In pratis humidis prope *Vorst*, etc. Annuæ; aprilis florens. *Glabram ut plurimum vidi aut hirsutie quâdam inferius tantum notatam; folia radicalia pinnata, pinnis subrotundis, impari majore, caulina angustiora, elongata, flores tetrandri et tetradynami.*

511. *C. AMARA*. Foliis pinnatis, axillis stoloniferis. *Linn. sp. pl.* 656, n. 12; *Gouan, hort. monsp.* 324.

Cardamine foliis pinnatis, foliolis subrotundis, angulosis. *Hall. hist.*, n. 474.

Nasturtium aquaticum majus et amarum. *Bauh. pin.* 104.

Cardamine flore majore, elatior. *Tourn. inst.* 224; *Boerh. hort. lugd.* 17, p. 2.

Nasturtium aquaticum flore majore, clatius. *Bauh. hist.* 2, fol. 885.

Belgicè : *Bitter Kersse*; gallicè : *Cresson amer*.

Juxta aquas mœniorum prope portam *Hallæ*, etc.  
Perennis; aprili florens. *Axillæ semper non sunt stoliferæ*, nec constans est figura foliorum; modò observabam angulosa, elongata, dentata; corolla lactea aut purpurea, folia amaritie non ingrata.

§12. *C. PARVIFLORA*. Foliis pinnatis, exstipulatis, foliolis subrotundis, floribus corollatis. *Linn. sp. pl.* 655; *Gouan, fl. monsp.* 163.

*Nasturtium pratense* parvo flore. *Bauh. pin.* 104, *prodr.* 44.

*Nasturtium minimum*, annuum, flore albo. *Moris. hist.* 2, *fol.* 221.

*Cardamine pratensis* parvo flore. *Tourn. inst.* 224.

*Cardamine annua* exiguo flore. *Tourn. inst.* 224.

Juxta fossas pratorum humidorum. Aprili floret.

237. *SISYMBRIUM*. Siliqua teres, dehiscens valvīs rectiusculis, dissepimento ferè æqualibus; calix patens; corollā patens.

513. *S. NASTURTIVM*. Siliquis declinatis, foliis pinnatis, foliolis subcordatis. *Linn. sp. pl.* 657, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 820; *Fl. dan. tab.* 690.

*Sisymbrium* foliis pinnatis, pinnis subrotundis, spicis sessilibus. *Hall. hist.*, n. 482.

*Sisymbrium aquaticum*. *Matthiol. in Diosc.* 186; *Tourn. inst.* 226; *Boerh. hort. lugd.* 15, p. 2.

*Nasturtium aquaticum supinum*. *Blakw. herb. tab.* 260; *Bauh. pin.* 104; *Moris. hist.* 2, *fol.* 223.

*Nasturtium aquaticum*. *Dodon. kruid-b.*, *fol.* 936.

*Sion cruceifolium* *Cratævæ*. *Lobel, kruid-b.* 250.

Belgicè : *Water-Kersse*; gallicè : *Cresson d'eau*.

In aquis purioribus communis. Maio floret; perennis.

514. *S. AMPHIBIVM*. Siliquis declinatis, oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis, serratis, petalis calice longioribus. *Linn. syst. veget.* 980, n. 4; *Gouan, hort. monsp.* 325.

*Sisymbrium Roripa*. *Scop. fl. carn. sp.* 823.

*Sisymbrium aquaticum*, foliis in profundas lacinias divis. *Tourn. inst.* 226; *Boerh. hort. lugd.* 16, p. 2.

*Radicula* foliis integris et pinnatifidis, petalis calice longioribus. *Hall. hist.*, n. 486.



*Raphanus aquaticus*, foliis in profundas lacinias divisis. *Bauh. pin.* 97, *Moris. hist.* 2, fol. 237.

*Rapistrum aquaticum*. *Tabern. icon. pl.* 118, p. 2.

Belgicè : *Poel Rakhet*; gallicè : *Raisfort amphibie*.

In aquosis *Molebeek*, etc. Perennis; junio florens.

515. *S. PALUSTRE*. Siliquis declinatis, oblongo-ovatis, foliis pinnatis, pinnis dentatis, petalis calice minoribus. *Linn. syst. veget.* 981, n. 5.

*Radicula* foliis pinnatis, pinnis dentatis, petalis calice brevioribus. *Hall. hist.*, n. 487.

*Raphanus aquaticus* *Rapistri* folio. *Bauh. pin.* 97.

*Raphanus aquaticus* alter, foliis serratis. *Moris. hist.* 2, fol. 237.

*Sisymbrium aquaticum* *Raphani* folio. *Tourn. inst.* 226.

Belgicè : *Water Rakhet*; gallicè : *Raisfort aquatique*.

In aquis *Anderlegt*, *Molebeek*, etc. Junio floret.

516. *S. SYLVESTRE*. Siliquis declinatis, oblongo-ovatis, foliolis lanceolatis, serratis. *Linn. sp. pl.* 657, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 822.

*Sisymbrium* foliis pinnatis, pinnis dentatis, dissitis. *Hall. hist.*, n. 485.

*Sisymbrium palustre* repens, *Nasturtii* folio. *Tourn. inst.* 226; *Boerh. hort. lugd.* 16, p. 2.

*Eruca* quibusdam *sylvestris*, repens, flosculo luteo. *Bauh. hist.* 2, fol. 866.

*Eruca palustris* *Nasturtii* folio. *Bauh. pin.* 98.

*Eruca palustris* minor. *Tabern. Icon. pl.* 159, p. 2.

*Eruca sylvestris*. *Fusch. hist.* 263.

Belgicè : *Wilde Rakhet*; gallicè : *Raisfort sauvage*.

Prope *Scheut*, juxta viam publicam, etc. Julio floret; perennis.

517. *S. TENUIFOLIUM*. Siliquis declinatis, foliis integerrimis, infimis tripinnatifidis, supremis integris. *Linn. syst. veget.* 981, n. 8.

*Eruca* foliis glabris, pinnatis, pinnis linearibus difformibus. *Hall. hist.*, n. 461.

*Sinapi sylvestre*. *Dodon. kruid-b.* 1106; *Lobel, kruid-boek*, 242.

*Sinapi Erucae* folio. *Bauh. pin.* 99.

*Eruca sylvestris*. *Blakw. herb. tab.* 266.

*Eruca sativa*. *Fusch. hist.*, 262.

Belgicè : *Wild Mostaert-kruid*; gallicè : *Roquette sauvage*.

In ruderatis ubiquè. Julio florens; annua.

518. *S. SOPHIA*. Siliquis sessilibus, axillaribus, foliis decomposito-pinnatis, petalis calice minoribus. *Linn. sp. pl.* 659, n. 11; *Blakw. herb. tab.* 440; *Scop. fl. carn. sp.* 821.

Sisymbrium pinnis et pinnulis pinnatis, laciniis linearibus subhirsutis. *Hall. hist.*, n. 484.

*Sophia chirurgorum. Lobel, kruyd-b., fol.* 901.

*Sophia. Dodon. kruyd-b., fol.* 192.

*Nasturtium sylvestre tenuissimè divisum. Bauh. pin.* 105.

*Sisymbrium annuum folio Absynthii minoris. Tourn. inst.* 226.

Belgicè : *Welsamen*; gallicè : *Thalitron*.

Ad *Schaerbeek*, vulgò in *de Groen-straet*, juxta arenarias, etc. Annua; julio florens.

238. *ERYSIMUM*. Siliqua linearis, stricta, exacte tetraëdra; calix clausus, stigma capitatum.

519. *E. OFFICINALE*. Siliquis spicæ adpressis, foliis runcinatis. *Linn. sp. pl.* 660, n. 1; *Blakw. herb. tab.* 28; *Gouan, hort. monsp.* 327.

*Erysimum* foliis pinnatis, pinnis rectangulis, acutis extremâ maximâ triangulari, siliquis adpressis. *Hall. hist.*, n. 478.

*Erysimum vulgare. Bauh. pin.* 100; *Tourn. inst.* 228; *Moris. hist.* 218; *Boerh. hort. lugd.* 16, p. 2.

*Erysimum Dioscoridis. Lobel, kruyd-b., fol.* 245.

*Erysimum. Dodon. kruyd-b.,* 1118.

*Sisymbrium officinale. Scop. fl. carn. sp.* 824.

Belgicè : *Edel Rakket*; gallicè : *Velar*.

Juxta vias ubiquè. Julio et augusto floret; annua.

520. *E. ALLIARIA*. foliis cordatis. *Linn. sp. pl.* 660, n. 3; *Hall. hist.*, n. 480; *Blakw. herb. tab.* 372; *Gouan, hort. monsp.* 328.

*Alliaria. Dodon. kruyd-b.* 1073; *Lobel, kruyd-b.* 627; *Matthioli. in Diosc.* 294; *Bauh. pin.* 110; *Dalech. hist.* 1, fol. 793; *Bauh. hist.* 2, fol. 883.

*Hesperis Allium redolens. Moris. hist.* 2, fol. 252; *Tourn. inst.* 222; *Boerh. hort. lugd.* 19, p. 2.

Belgicè : *Look zonder look*; gallicè : *Alliaire*.

Sub sepibus ubiquè. Biennis; junio florens.

521. *E. BARBAREA*. Siliquis obsolete tetragonis, foliis

- lyratis, extimo subrotundo. *Linn. sp. pl.* 660, n. 2;  
*Gouan, hort. monsp.* 327.
- Erysimum foliis pinnatis, pinnâ extremâ maximâ  
subrotundâ. *Hall. hist.*, n. 479.
- Barbarea. *Dodon. kruid-b.* 1113; *Bauh. hist.* 2, fol. 868.
- Barbarea, sive Pseudo-Bunias. *Lobel, kruid-b.* 247.
- Eruca lutea latifolia, sive Barbarea. *Bauh. pin.* 98.
- Sisymbrium Erucae folio glabro. *Tourn. inst.* 226.
- Sisymbrium Barbarea. *Scop. fl. carn. sp.* 826.
- Belgicè : *Winter-Kersse*; gallicè : *Herbe de Ste-Barbe*;  
Ad ripam Canalis, prope de Dry Gatén, etc. Perennis;  
junio florens.
522. *E. CHEIRANTOIDES*. Caule ramosissimo, foliis lanceolatis, obliquis, integerrimis, siliquis patulis.  
*Linn. sp. pl.* 661, n. 4; *Scop. fl. carn. sp.* 831;  
*Hall. hist.*, n. 477; *Jacq. fl. austr. tab.* 23.
- Myagrû alterum Thlaspi effigie. *Lobel, kruid-b.* 268.
- Myagrû siliquâ longâ. *Bauh. pin.* 109.
- Myagro affinis planta, siliquis longis. *Bauh. hist.* 2,  
fol. 894.
- Turritis folio Leucoji. *Tourn. inst.* 224; *Boerh. hort. lugd.* 15, p. 2.
- Belgicè : *Wilde Cameline*; gallicè : *Cameline sauvage*.  
Ad Elmet, prope de Kalkhoven-brugge, etc. Annua;  
julio florens.
239. *CHEIRANTHUS*. Germen utrinquè denticulo glandulato; calix clausus foliolis duobus basi gibbis; semina plana.
523. *C. ERYSIMOIDES*. Foliis lanceolatis, dentatis, nudis, caule erecto, simplicissimo, siliquis tetragonis. *Linn. sp. pl.* 661, n. 1; *Jacq. fl. austr. tab.* 74.
- Hesperis foliis glabris, linearibus, lanceolatis, obiter dentatis. *Hall. hist.*, n. 449.
- Leucoium sylvestre. *Clus. hist. rar.* 299; *Bauh. hist.* 2, fol. 873.
- Leucoium luteum sylvestre angustifolium. *Bauh. pin.* 202.
- Hesperis Leucoji folio non serrato, siliquâ quadrangulâ. *Tourn. inst.* 223; *Boerh. hort. lugd.* 19, p. 2.
- Eruca sylvestris angustifolia. *Lobel, kruid-b.* 244;  
*Dalech. hist.* 1, fol. 556.

*Erysimum Hesperis. Scop. fl. carn. sp. 829.*

Belgicè : *Wilde Violier*; gallicè : *Violier sauvage*.

Ad *Haren*, prope *den Nieuwen Molen*; ad *St-Gillis*,  
in *de gemeynte*. Annuæ; augusto florens.

524. *C. CHEIRI*. Foliis lanceolatis, acutis, glabris, ramis angulatis, caule fruticoso. *Linn. sp. pl. 661, n. 2; Blakw. herb. tab. 179.*

*Leucoium foliis glabris, lanceolatis, integerrimis. Hall. hist., n. 443.*

*Leucoium luteum. Dodon. kruid-b. 238; Lobel, kruidboek, 405.*

*Leucoium luteum vulgare. Bauh. pin. 202; Tourn. inst. 221.*

*Leucoium luteum vulgò Cheiri. Bauh. hist. 2, fol. 872.*

Belgicè : *Steen-violier*; gallicè : *Giroflier jaune*.

Ad muros hinc indè. Perennis; maio florens.

240. *ARABIS*. Glandulæ nectariferæ quatuor, singulæ intra calicis foliola, squamæ instar reflexæ; siliqua longa, compressa, linearis, apice integro capitato.

525. *A. THALIANA*. Foliis lanceolatis, petiolatis, radicalibus dentatis, caulinis integerrimis. *Linn. sp. pl. 665, n. 6; Gouan, hort. monsp. 331.*

*Arabis foliis radicalibus petiolatis, ovatis, dentatis, caule subnudo, ramoso. Hall. hist., n. 452.*

*Bursa pastoris sive Pilosella siliquosa. Bauh. hist. 2, fol. 870.*

*Bursæ pastoris similis, siliquosa major. Bauh. pin. 108.*

*Turritis vulgaris ramosa. Tourn. inst. 224; Boerh. hort. lugd. 15, p. 2.*

Ad *Jette*, vulgò *op den Koekhoek*. Annuæ; julio florens.

241. *TURRITIS*. Siliqua longissima, angulata, stricta, stigmata bicolli terminata; calix connivens, erectus; corolla recta.

526. *T. HIRSUTA*. Foliis omnibus hispidis, caulinis amplexicaulibus. *Linn. sp. pl. 666; Hall. hist. n. 456.*

*Arabis hirsuta. Scop. fl. carn. sp. 835.*

*Turrita vulgatiore. Clus. hist. rar. 126, p. 2.*

*Turritis. Lobel, kruid-b., fol. 262.*

*Turritis quæ Barbarea muralis. Boerh. hort. lugd. 14, p. 2; Bauh. hist. 2, fol. 869.*

*Erysimo similis hirsuta, non laciniata, alba. Bauh. pin. 101.*

*Turritis minor. Tourn. inst. 223.*

Belgicè : *Toren-kruyd*; gallicè : *Tourelle.*

Ad muros abbatiæ *Terhameren, etc.* Biennis; junio florens.

242. **BRASSICA.** Calix erectus, connivens; glandula inter stamina breviora et pistillum, interque longiora et calicem; semina globosa.

527. *B. ARVENSIS.* Foliis amplexicaulibus, spatulatis, repandis, summis cordatis, integerrimis. *Linn. syst. veget. 988; n. 3.*

*Brassica campestris secunda. Clus. hist. rar. 127, p. 2.*

*Brassica campestris Clusii. Lobel, kruyd-b. 482.*

*Brassica campestris perfoliata. Dodon. kruyd-b. 978.*

*Brassica campestris perfoliata. Bauh. pin. 112.*

Belgicè : *Wilde Kool.*

Prope *Ste.-Anna-Pede* in simeto. Junio floret. Rara.

528. *B. CAMPESTRIS.* Foliis caulinis uniformibus, cordatis, sessilibus, radice cauleque tenui. *Linn. syst. veget. 988, n. 5; Fl. dan. tab. 550.*

*Brassica sylvestris Crambe dicta. Dodon. kruyd-b. 974.*

*Brassica vulgaris sativa. Lobel, kruyd-b. 293.*

Belgicè : *Sloor*; gallicè : *Colsa.*

In campis ubique seritur. Biennis; aprili florens.

529. *B. NAPUS.* Radice caulecente, fusiformi, foliis radicalibus lyratis, caulinis cordato-oblongis. *Linn. sp. pl. 666; Blakw. herb. tab. 224.*

*Bunias sive Napus. Lobel, kruyd-b. 238.*

*Napus sativa. Bauh. pin. 95.*

*Napus. Dodon. kruyd-b. 1054; Dalech. hist. 1, fol. 549.*

*Napus radice albâ. Tourn. inst. 229.*

Belgicè : *Steek-raep.*

In arvis. Maio florens; biennis.

530. *B. RAPA.* Radice caulescente, orbiculari, depressâ, carnosâ. *Linn. sp. pl. 666; Blakw. herb. tab. 226; Scop. fl. carn. sp. 841.*

*Rapa sativa. Bauh. pin. 89; Moris. hist. 2, fol. 213.*

*Rapum vulgare. Dodon. kruyd-b., fol. 1052.*

Rapum sativum rotundum seu oblongum. *Bauh. hist.* 2, fol. 838.

Rapum majus orbiculatum seu turbinatum. *Lobel, kruid-b.* 235.

Belgicè : *Raep*; gallicè : *Navet*.

In arvis hortisque seritur. Biennis; maio florens.

531. *B. OLERACEA*. Radice caulescente tereti, carnosa. *Linn. sp. pl.* 667; *Scop. fl. carn. sp.* 840.

Brassica capitata, rubra, crispa, sabauda, viridis, cauliflora, etc. *Dodon. kruid-b.* 971—974; *Bauh. pin.* 111; *Bauh. hist.* 2, fol. 826—831; *Lobel, kruid-boek*, 292—297; *Boerh. hort. lugd.* 11, p. 2, n. 1—13.

Belgicè : *Kool*; gallicè : *Chou*.

In hortis colitur. Biennis; maio florens.

243. *SINAPIS*. Calix patens, corollæ ungues erecti; glandula inter stamina breviora et pistillum, interque longiora et calicem; siliqua rostrata, dehiscens valvis dissepimento brevioribus.

532. *S. ARVENSIS*. Siliquis multangulis, toroso-turgidis; rostro ancipiti longioribus. *Linn. sp. pl.* 668, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 842; *Hall. hist.* n. 467.

Rapistrum flore luteo. *Bauh. pin.* 95; *Bauh. hist.* 2, fol. 844.

Rapistrum arvense præcox semine nigro. *Tourn. inst.* 227.

Rapistrum. *Dodon. kruid-b.* 1055; *Dalech. hist.* 1, fol. 545.

Rapistrum arborum. *Lobel, kruid-b.* 236.

Belgicè : *Herik*; gallicè : *Rave sauvage*.

In cultis ubique. Annuæ; totâ æstate florens.

533. *S. NIGRA*. Siliquis glabris, racemo adpressis. *Linn. sp. pl.* 668, n. 3; *Blakw. herb. tab.* 446; *Gouan, hort. monsp.* 333.

Sinapi sativum. *Dodon. kruid-b.*, fol. 1105.

Sinapi Rapi folio. *Bauh. pin.* 99; *Moris. hist.* 2, fol. 215.

Sinapi sativum Erucae aut Rapi folio. *Lobel; kruid-boek*, 241.

Sinapi siliquâ latiusculâ glabrâ. *Bauh. hist.* 2, fol. 855.

Belgicè : *Mostaert*; gallicè : *Moutarde*.

In hortis seritur. Julio floret; annuæ.

244. **RAPHANUS.** Calix clausus; glandulæ duæ inter stamina breviora et pistillum, totidem inter longiora et calicem; siliqua torosa, subarticulata, loculamentosa, teres.

534. *R. SATIVUS.* Siliquis teretibus, torosis, bilocularibus. *Linn. sp. pl.* 669, n. 1; *Gouan, hort. monsp.* 334.

Radicula sativa. *Dodon. kruyd-b.* 1056, 1057.

Raphanus magnus (et minor). *Lobel. kruyd-b.* 239.

Raphanus major (et minor). *Bauh. pin.* 96.

Raphanus. *Bauh. hist.* 2, fol. 846; *Blakw. herb. tab.* 81.

Belgicè : *Radys, Ramelats*; gallicè : *Radis, Raifort, Rave.*

In hortis seritur. Junio floret.

535. *R. RAPHANISTRUM.* Siliquis articulatis teretibus; lævibus, unilocularibus. *Linn. sp. pl.* 669, n. 2; *Hall. hist.*, n. 468; *Gouan, hort. monsp.* 334.

Raphanistrum segetum flore luteo vel pallido. *Tourn. inst.* 230.

Rapistrum siliquâ articulatâ. *Bauh. pin.* 95.

Rapistrum flore albo Erucae foliis. *Lobel, kruyd-b.* 236.

Belgicè : *Wilde Radys*; gallicè : *Ravenon.*

In arvis *Etterbeek, etc.* Annua; florens totâ æstate.

---

## CLASSIS DECIMA QUINTA.

---

### MONADELPHIA.

---

#### TRIANDRIA.

245. JUNIPERUS. Flores diclini. *Masc.* Calix squama amenti; corolla nulla. *Fem.* Calix tripartitus, corolla tripetala; pistilla tria, drupa succulenta, polysperma.
536. *J. COMMUNIS.* Foliis ternis; patentibus, mucronatis, baccâ longioribus. *Linn. sp. pl.* 1040, n. 8; *Scop. fl. carn. sp.* 1229; *Blakw. herb. tab.* 187.  
*Juniperus* foliis convexo-concavis, aristatis, baccis alaribus, sessilibus. *Hall. hist.*, n. 1661.  
*Juniperus vulgaris.* *Bauh. pin.* 488; *Tourn. inst.* 588; *Clus. hist. rar.* 38; *Boerh. hort. lugd.* 208, p. 2, 1—2.  
*Juniperus.* *Dodon. kruyd-b.* 1333; *Lobel, kruyd-b.* 258; *Matthiol. in Diosc.* 61.  
 Belgicè : *Genever-boom*, gallicè : *Genevrier*.  
 In aridis *Alseberg*, *Beersel*, etc. Junio floret;

---

#### DECANDRIA.

246. GERANIUM. Calix quinquepartitus; corollæ pentapetala; pistillum unum, stigmata quinque; receptaculum commune rostratum; cocci quinque, caudâ longissimâ tortili.
537. *G. COLUMBINUM.* Caule procumbente, foliis oppositis, palmatis, laciniis pinnatis, pedunculis subbifloris longissimis; calicibus aristatis, petalis emarginatis. *Linn. sp. pl.* 682, n. 35; *Scop. fl. carn. sp.* 840; *Gouan, hort. monsp.* 343.  
*Geranium* caule procumbente, foliis quinquepartitis, lobis trilobis, lobulis trifidis. *Hall. hist.*, n. 938.



*Geranium columbinum* foliis dissectis, florum pedicellis longissimis. *Raij. hist.* 1059; *Vaill. bot. par.* 79, tab. 15, fig. 4.

*Geranium columbinum majus*, foliis tenuiter dissectis, petalis bifidis. *Tourn. inst.* 268.

Belgicè : *Duyven-voet* ; gallicè : *Pied de pigeon*.

Ad margines prope *Laken*, *Uccle*, etc. Non communis.

538. *G. PUSILLUM*. Caule herbaceo, ramoso, foliis subrotundo-lobatis, lobis trifidis, pedunculis bifloris, floribus pentandris, petalis emarginatis. *Linn. syst. veget.* 1016, n. 16.

*Geranium* foliis hirsutis, semiseptilobis, lobis semitrilobis, obtusis. *Hall. hist.*, n. 940.

*Geranium columbinum* tenuius laciniatum. *Bauh. pin.* 318, prod. 138; *Boerh. hort. hist.*, 268.

*Geranium columbinum humile*, flore cæruleo minimo. *Raij. hist.* 3, fol. 359, tab. 16, fig. 2.

Belgicè : *Kleynen Duyvenvoet*.

Sub sepibus ad *Molebeek*, etc. *Folia hirsuta*, *petala emarginata*, *purpurea*, *antheræ cæruleæ*, *stamina quinque antherifera*, *totidem castrata*.

539. *G. MOLLE*. Pedunculis bifloris, caule suberecto, foliis orbiculatis, subseptemlobatis, trifidis, obtusis, caulinis oppositis, superioribus alternis. *Linn. sp. pl.* 682, n. 33; *Scop. fl. carn. sp.* 850.

*Geranium* foliis mollissimis, hirsutis, reniformibus, semiquinquefidis, lobis semitripartitis, obtusis. *Hall. hist.*, n. 939.

*Geranium columbinum minus*, majori flore, foliis bifidis. *Tourn. inst.* 268.

*Geranium columbinum villosum* petalis bifidis, purpureis. *Vaill. bot. par.* 79, tab. 15, fig. 3.

Belgicè : *Sagten Duyvenvoet*.

Ad *Schaerbeek*, etc., secus vias. Annuæ; junio florens.

540. *G. ROTUNDIFOLIUM*. Caule prostrato, foliis oppositis, inferioribus subrotundis, superioribus subcuneatis, pedunculis bifloris, petalis integris, calice paulò longioribus. *Linn. sp. pl.* 683, n. 36; *Scop. fl. carn. sp.* 846.

*Geranium viscidum* caule decumbente, foliis semiquinquelobis, lobis tridentatis et quinquelobatis. *Hall. hist.*, n. 941.

*Geranium folio Malvæ rotundo Majus. Bauh. pin.* 328; *Moris. hist.* 2, fol. 511; *Boerh. hort. lugd.* 265; *Tourn. inst.* 268.

*Pes columbinus, seu Geranium alterum Dioscoridis. Lobel, kruid-b.* 804.

*Geranium columbinum. Dodon. kruid-b.* 81.

*Geranium folio rotundo serrato, sive columbinum. Bauh. hist.* 3, fol. 473.

Belgicè : *Grooten Duyven-voet.*

In versutris hortorum, etc. Annuæ; junio florens.

541. *G. ROBERTIANUM.* Foliis ternatis, pinnatis, incisis, pedunculis bifloris, petalis integris, calicibus decem striatis, pilosis. *Linn. sp. pl.* 681, n. 31; *Scop. fl. carn. sp.* 845; *Blakw. herb. tab.* 480; *Dodon. kruid-boek,* 82; *Lobel, kruid-b.* 804.

*Geranium robertianum primum. Bauh. pin.* 319; *Tourn. inst.* 268; *Boerh. hort. lugd.* 266.

*Geranium robertianum murale. Bauh. hist.* 3, fol. 480.

Belgicè : *Robertgts-kruid*; gallicè : *Herbe à Robert.*  
In umbrosis humentibus ubiquè. Perennis; maio florens.

542. *G. CICONIUM.* Caule herbaceo, reclinato, foliis pinnatis, pinnulis incisis, pedunculis subtrifloris, floribus pentandris, petalis integris. *Linn. syst. veget.* 1019, n. 61.

*Geranium petiolis multifloris, foliis pinnatis, pinnis latebentibus, dentatis, alterne maximis. Hall. hist.,* n. 946.

*Rostrum Ciconiæ inodorum vulgatum. Lobel, kruid-boek,* 805.

*Geranium Cicutæ folio, acu longissimâ. Bauh. pin.* 319.

*Geranium Coriandri folio inodorum. Moris. hist.* 2, fol. 510.

*Geranium gruinaie. Dodon. kruid-b., fol.* 85.

Belgicè : *Kraenhals*; gallicè : *Bec de Cigogne.*

Ad *Schaerbeek, St.-Gillis, etc.* Ad margines hortorum.

543. *G. CIRCUTARIUM.* Caule ramoso, prostrato, foliis pinnatis, pinnulis subovatis, pedunculis multifloris, floribus pentandris. *Linn. sp. pl.* 680, n. 21; *Scop. fl. carn. sp.* 853; *Gouan, hort. monsp.* 340.

*Geranium caule procumbente, petiolis multifloris;*

foliis duplicato-pinnatis, pinnis acute incisis. *Hall. hist.*, n. 944.

*Geranium supinum. Dodon. kruyd-b.* 83.

*Geranium Cicutæ folio*, minus et supinum. *Bauh. pin.* 319.

Belgicè : *Oeyvaertsbek*; gallicè : *Bec de Grue*,

Ad margines *Anderlegt*, *St.-Gillis*, etc.

### POLYANDRIA.

247. **MALVA.** Calix duplex, exterior triphyllus; arilli plurimi in verticillum dispositi, uniloculares, monospermæ.

544. *M. ROTUNDIFOLIA.* Caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis, plicatis, quinquelobis septemlobisque, pedunculis fructiferis declinatis. *Linn. sp. pl.* 688, n. 8, *Scop. fl. carn. sp.* 858; *Hall. hist.*, n. 1070.

*Malva sylvestris repens pumila. Lobel, kruyd-b.* 796.

*Malva sylvestris folio subrotundo. Bauh. pin.* 314.

*Malva vulgaris flore minore, folio rotundo. Bauh. hist.* 2, fol. 949.

*Malva minor sylvestris repens. Dalech. hist.* 1, fol. 496.

*Malva pumila. Dodon. kruyd-b.* 1019.

Belgicè : *Kleyne Maluwe*; gallicè : *Petite Mauve*.

Ad *Curegem*, *Anderlegt*, etc. Annuæ; junio florens.

545. *M. SYLVESTRIS.* Caule erecto, scabro, foliis quinquevel-septemlobis, dentatis, calice exteriori submonophyllo. *Linn. sp. pl.* 689, n. 9; *Scop. fl. carn. sp.* 859; *Blakw. herb. tab.* 22.

*Malva caule erecto, foliis lobatis, lobis serratis, quinque et septenis. Hall. hist.*, n. 1069.

*Malva sylvestris procerior. Dodon. kruyd-b.* 1019; *Lobel, kruyd-b.* 796.

*Malva sylvestris flore majore, folio sinuato. Bauh. hist.* 2, fol. 949; *Tourn. inst.* 95; *Boerh. hort. lugd.* 268.

*Malva sylvestris folio sinuato. Bauh. pin.* 314.

Belgicè : *Wilde Maluwe*; gallicè : *Mauve sauvage*.

In ruderalis ubiquè. Perennis; junio florens.

546. *M. ALCEA.* Caule erecto foliisque cordatis, scabrius-

culis, superioribus profundè quinquepartitis. *Linn. sp. pl.* 689, n. 13; *Scop. fl. carn. sp.* 860.

alva caule erecto, foliis scabris, trilobatis, lobis lateralibus bipartitis, medio tri-et-quinquepartito. *Hall. hist.*, n. 1071.

*Alcea vulgaris.* *Dodon. kruyd-b.* 1024; *Blakw. herb. tab.* 309; *Lobel, kruyd-b.* 802; *Clus. hist. rar.* 24, p. 2; *Dalech. hist.* 1, fol. 502; *Bauh. hist.* 2, fol. 953.

*Alcea vulgaris major.* *Bauh. pin.* 316; *Tourn. inst.* 97. Belgicè : *Sigmaerts-kruyd*; gallicè : *Alcée*.

Prope het Schaeps-hoofd, ad Anderlegt; propè Randvoort, etc. Perennis; julio florens.

---

---

 CLASSIS DECIMA SEXTA.
 

---



---

 DIADELPHIA.
 

---



---

 HEXANDRIA.
 

---

248. **FUMARIA.** Calix diphyllus, corolla ringens; filamenta duo, membranacea, singula antheris tribus; capsula unilocularis monosperma.

547. *F. OFFICINALIS.* Leguminibus monospermis, racemosis, caule diffuso. *Linn. sp. pl.* 700, n. 7; *Scop. fl. carn. sp.* 866; *Blakw. herb. tab.* 237.

*Fumaria* foliis multifidis, subrotunde lanceolatis, fructibus monospermis. *Hall. hist.*, n. 346.

*Fumaria* officinarum. *Bauh. pin.* 143; *Tourn. inst.* 422.

*Fumaria* vulgaris. *Bauh. hist.* 3, fol. 201; *Moris. hist.* 2, fol. 261.

*Fumaria.* *Dodon. kruid-b.* 77. *Lobel, kruid-b.* 924; *Matthiol. in Diosc.* 371; *Dalech. hist.* 2, fol. 182.

Belgicè : *Duyckervel*, *Grysekom*; gallicè : *Fumeterre*.

In agris inter segetes ubiquè. Annuæ; maio florens.

---

 OCTANDRIA.
 

---

249. **POLYGALA.** Calix pentaphyllus, foliolis duobus majoribus alæformibus, ante maturitatem seminis coloratis; capsula obcordata, bilocularis; semina solitaria.

548. *P. VULGARIS.* Floribus cristatis racemosis, caulis herbaceis, simplicibus, procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. *Linn. sp. pl.* 702, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 867; *Fl. dan. tab.* 516; *Bauh. pin.* 215.

- Polygala caule erecto, foliis linearibus, acutis. Hall. hist., n. 344.*  
*Polygala vulgaris major. Clus hist. rar. 324.*  
*Polygala recentiorum. Lobel, kruid-b., fol. 502.*  
*Flos ambervalis. Dodon. kruid-b., fol. 403.*  
 Belgicè : *Kruys-bloem*; gallicè : *Polygale*.  
 In sylvis *Linthout, Berghem, etc.* Perennis; maio florens.

DECANDRIA.

250. SPARTIUM. Calix bilabiatus, deorsum productus; filamenta germini adhærentia; stigma longitudinale, supra villosum.
549. *S. SCOPARIUM*. Foliis ternis simplicibusque, ramis inermibus angulatis. *Linn. sp. pl. 709, n. 11; Fl. dan. tab. 313; Gouan, hort. monsp. 356.*  
*Spartium foliis inferioribus ternatis, hirsutis, superioribus simplicibus. Hall. hist., n. 354.*  
*Genista scoparia. Lobel, kruid-b., fol. 103, p. 2.*  
*Genista angulosa et scoparia. Bauh. pin. 395.*  
*Genista. Dodon. kruid-b., fol. 1193; Blakw. herb. tab. 244.*  
*Cytiso-genista scoparia vulgaris flore luteo. Tourn. inst. 649.*  
 Belgicè : *Brem*; gallicè : *Genet*.  
 Ad margines *Schaerbeek, Ten-Noode, etc.* Maio floret.
251. GENISTA. Calix bilabiatus, labium superius bidentatum, inferius tridentatum; vexillum oblongum à pistillo staminibusque deorsum reflexum; legumen æquale.
550. *G. TINCTORIA*. Ramis striatis, teretibus, erectis, foliis lanceolatis, glabris. *Linn. sp. pl. 710, n. 4; Scop. fl. carn. sp. 873; Gouan, hort. monsp. 357.*  
*Genista inermis, foliis glabris, confertis, ellipticis, lanceolatis, floribus sessilibus spicatis. Hall. hist., n. 350.*  
*Genista tinctoria vulgaris. Clus. hist. rar. 101.*  
*Genistella infectoria. Lobel, kruid-b. 103, p. 2.*  
*Genista tinctoria germanica. Bauh. pin. 395; Tourn. inst. 643.*  
*Tinctorius flos. Bauh. hist. 1, fol. 392,*

Belgicè : *Verwers-brem* ; gallicè : *Genet des teinturiers*.

Prope *Relegem*. Julio florens. *Rara*.

551. *G. ANGLICA*. Spinosa, spinis simplicibus compositisque, foliis lanceolatis, ramis floriferis inermibus. *Linn. sp. pl.* 712. n. 11; *Fl. dan. tab.* 619.

*Genista-spartium minus anglicum*. *Tourn. inst.* 645; *Boerh. hort. lugd.* 24, p. 2.

*Genistella minor asphalatioides*. *Bauh. pin.* 595, *prodr.* 157; *Bauh. hist.* 1, fol. 401.

*Genistella aculeata*. *Lobel. kruid-b.*, fol. 108, p. 2.

*Genistella*. *Dodon. kruid-b.*, fol. 1190.

Belgicè : *Steekende-brem* ; gallicè : *Petit Genet épineux*.

Ad *Vorst*, prope tabernam *het Vosse-gat* ; inter *Beygem* et *Kapellen*, nihil abundantius. Fine maii floret.

252. *ULEX*. Calix diphyllus, legumen vix calice longius.

552. *U. EUROPEUS*. Foliis villosis acutis, spinis sparsis. *Linn. syst. pl.* 1093, n. 1; *Fl. dan. tab.* 608; *De-lamark, fl. franc.* 2, fol. 665.

*Genista spinosa major longioribus aculeis*. *Bauh. pin.* 394.

*Genista spartium majus, longioribus aculeis*. *Tourn. inst.* 645; *Boerh. hort. lugd.* 24, p. 2.

*Genista spinosa*. *Dodon. kruid-b.*, fol. 1189.

Belgicè : *Gaspel-doren* ; gallicè : *Genet épineux*.

Prope abbatiam *Diligem*, etc. Maio floret.

253. *ONONIS*. Calix quinquepartitus, laciniis linearibus; vexillum striatum; filamenta connata absque fissura; legumen turgidum, sessile, simplex, uniloculare.

553. *O. ARVENSIS*. Floribus racemosis geminatis, foliis ternatis, superioribus simplicibus, ramis inermibus subvillosis. *Linn. syst. veget.* 1096, n. 3; *Gouan, hort. monsp.* 359; *Blakw. herb. tab.* 301.

*Anonis purpurea spinis carens*. *Bauh. pin.* 389; *Tourn. inst.* 408.

*Anonis mitior. Clus. hist. rar., fol. 99.*

Belgicè : *Stal-kruyd*; gallicè : *Bugrande*.

Ad margines *St.-Gillis*, *Stalle*, etc. Perennis, augusto florens.

554. *O. SPINOSA*. Floribus racemosis solitariis, foliis ternatis simplicibusque, ramis spinosis. *Linn. syst. veget. 1096, n. 2*; *Gouan. hort. monsp. 358*; *Scop. fl. carn. sp. 877*; *Fl. dan. tab. 783*.

*Anonis spinosa* flore purpureo. *Bauh. pin. 389*; *Tourn. inst. 408*.

*Anonis. Dodon. kruyd-b. 1164*; *Lobel, kruyd-b. 32, p. 2*.

*Anonis*, sive *Resta bovis vulgaris purpurea. Bauh. hist. 2, fol. 395*.

Belgicè : *Prang-wortel*; gallicè : *Arrête-bœuf*.

Ad margines *Schaerbeek*, *Elmet*, etc. Cum preccedenti in unam speciem conjunxit *Hall. hist., n. 356*.

254. **LATHYRUS**. Calicis laciniae duæ superiores breviores; stylus planus, suprâ villosus, supernè latior; legumen æquale, acuminatum.

555. *L. NISSOLIA*. Pedunculis unifloris, foliis simplicibus, stipulis subulatis. *Linn. sp. pl. 729, n. 2*; *Scop. fl. carn. sp. 888*; *Gouan, hort. monsp. 367*.

*Lathyrus* pedunculis unifloris, foliis gramineis, stipulis minimis. *Hall. hist., n. 441*.

*Nissolia vulgaris. Tourn. inst. 656*; *Boerh. hort. lugd. 25, p. 2*.

*Ervum sylvestre herbariorum. Lobel, kruyd-b. 83, p. 2*.

*Ervum sylvestre. Dodon. kruyd-b., fol. 847*.

*Lathyrus sylvestris minor. Bauh. pin. 344*.

Belgicè : *Wilde Erven*; gallicè : *Nissole*.

In arvis *Laken*, *Berchem*, etc. Annua; junio florens.

556. *L. TUBEROSUS*. Pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ovalibus, internodiis nudis. *Linn. sp. pl. 732, n. 15*; *Gouan, hort. monsp. 369*.

*Lathyrus* scapis multifloris, foliis ovatis, capreolis trifidis. *Hall. hist., n. 435*.

*Lathyrus arvensis, repens tuberosus. Bauh. pin. 344*; *Tourn. inst. 395*.



*Chamaëbalanus leguminosa. Bauh. hist. 1, fol. 324.*  
*Terræ glandes. Dodon. kruid-b. 876; Lobel, kruid-boek, 81, p. 2.*

Belgicè : *Aerdenoten* ; gallicè : *Magjon*.

In arvo, prope *Elmet*, alibi non vidi. Perennis ;  
 junio florens.

557. *L. PRATENSIS*. Pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis simplicissimis, foliolis lanceolatis. *Linn. sp. pl. 733, n. 17; Scop. fl. carn. sp. 892; Gouan, hort. monsp. 369.*

*Lathyrus scapis multifloris, foliis lanceolatis, capreolis simplicibus. Hall. hist. n. 436.*

*Lathyrus sylvestris luteus, foliis Viciæ. Bauh. pin. 344; Tourn. inst. 395.*

*Lathyrus luteus sylvestris dumetorum. Bauh. hist. 2, fol. 304.*

Belgicè : *Wikken* ; gallicè : *Gesse des prés*.

In pratis *Laken*, etc. Perennis, junio florens.

558. *L. SYLVESTRIS*. Pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ensiformibus, internodiis membranaceis. *Linn. sp. pl. 733, n. 16; Scop. fl. carn. sp. 893; Fl. dan. tab. 325; Dodon. kruid-b. 840; Clus. hist. rar. 229, p. 2.*

*Lathyrus caule alato, foliis geminis ensiformibus. Hall. hist., n. 434.*

*Lathyrus sylvestris major. Bauh. pin. 344; Tourn. inst. 395.*

*Lathyrus angustifolius alter. Moris. hist. 2, fol. 51.*

Belgicè : *Bosch-wikken* ; gallicè : *Gesse sauvage*.

Ad margines sylvarum, etc. Perennis ; junio florens.

255. *VICIA*. Stigma latere inferiore transversè barbatus ; legumen longum, bivalve, uniloculare, nodosum.

559. *V. SATIVA*. Leguminibus subbinatis, erectis, sessilibus, foliolis oblanceolatis, retusis, emarginatis, stipulis notatis, dentatis. *Linn. sp. pl. 736, n. 10; Scop. fl. carn. sp. 895.*

*Vicia foliis imis ovatis, superioribus linearibus, scapis brevissimis bifloris. Hall. hist., n. 430.*

*Vicia sativa vulgaris. Bauh. pin. 344; Bauh. hist. 2, fol. 310; Boerk. hort. lugd. 43, p. 2, n. 2-4; Tourn. inst. 396.*

*Vicia. Dodon. kruid-b. 850; Lobel, kruid-b. 88, p. 2.*  
 Belgicè : *Vitsen*; gallicè : *Vesce*.  
 In agris ubiquè. Annuæ; junio florens.

560. *V. CRACCA*. Pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis, pubescentibus, stipulis integris. *Linn. sp. pl. 735, n. 5; Scop. fl. carn. sp. 899; Gouan, hort. monsp. 371; Fl. dan. tab. 804.*

*Vicia foliis linearibus sericeis, racemis multifloris, reflexis, stipulis integerrimis. Hall. hist., n. 424.*

*Vicia multiflora. Bauh. pin. 345; Tourn. inst. 397; Boerh. hort. lugd. 44, p. 2, n. 4.*

Belgicè : *Krok*; gallicè : *Vesce sauvage*.

In agris *Ever, Haren, etc.* Junio florens; perennis.

561. *V. SEPIUM*. Leguminibus pedicellatis subquaternis, erectis, foliolis obovatis, integerrimis, exterioribus decreescentibus, stipulis dentatis. *Linn. sp. pl. 737, n. 15; Scop. fl. carn. sp. 897; Fl. dan. tab. 699; Gouan, hort. monsp. 372.*

*Vicia foliis ovatis oblongis, scapis brevibus, quadrifloris. Hall. hist., n. 428.*

*Vicia sepium folio rotundiore acuto. Bauh. pin. 345; Tourn. inst. 397.*

*Vicia sepium perennis. Bauh. hist. 2, fol. 313.*

*Cracca major. Tabern. icon. pl. 208, p. 2.*

Belgicè : *Haeg-wikken*; gallicè : *Vesceron*.

Ad sepes, inter fruteta, etc. Perennis; junio florens.

*Foliorum nervus triqueter sustinet foliola lanceolata aut oblonga, obtusa vel acumine terminata.*

562. *V. LATHYROIDES*. Leguminibus erectis, sessilibus, solitariis, glabris, foliolis subsenis, inferioribus obcordatis, stipulis integerrimis. *Linn. sp. pl. 736, n. 11; Gouan, hort. monsp. 371; Fl. dan. tab. 58.*

*Vicia minima cum siliquis glabris. Tourn. inst. 397; Boerh. hort. lugd. 44, p. 2, n. 8.*

*Arachus prior. Dodon. kruid-b. 866.*

*Arachus aut Cracca major. Lobel, kruid-b. 88, p. 2.*

Belgicè : *Groote Krok*; gallicè : *Vesce gessière*.

In arvis *Strombeek*, prope molam, etc. Annuæ; fine maii florens. *Non communis.*

563. *V. FABA*. Caule erecto, foliolis integerrimis, petiolis absque cirrhis. *Linn. sp. pl. 737, n. 18; Blakw. herb. tab. 19; Gouan, hort. monsp. 373.*

*Faba Cyamus leguminosa. Bauh. hist. 2, fol. 279.*

*Faba*, etc. *Bauh. pin. 338; Boerh. hort. lugd. 45, p. 2, n. 1—4.*

*Faba major. Lobel, kruid-b. 65, p. 2; Moris. hist. 2, fol. 83.*

*Bona seu Phaselus. Dodon. kruid-b. 826.*

Belgicè : *Platte-boon*, *Knepper*; gallicè : *Fève de marais.*

In arvis hortisque scriitur. Annua; maio florens.

256. *ERVUM*. Calix quinquepartitus, longitudine corollæ; legumen obtusum, nodosum, seminibus protuberantibus.

164. *E. TETRASPERMUM*. Pedunculis subhifloris, seminibus globosis, quaternis. *Linn. sp. pl. 738, n. 2; Scop. fl. carn. sp. 902; Gouan, hort. monsp. 374.*  
*Vicia foliis linearibus, siliquis gemellis, glabris. Hall. hist., n. 923.*

*Vicia* Segetum singularibus siliquis glabris. *Bauh. pin. 345.*

*Vicia minor* Segetum, cum siliquis paucis glabris. *Moris. hist. 2, fol. 64, tab. 4, fig. 16.*

*Lens minor. Dodon. kruid-b. 844; Lobel, kruid-b. 87, p. 2.*

Belgicè : *Kleyne Linsen*; gallicè : *Ers.*

Inter segetes ubique. Annua; junio florens. *Caulis subtetragonus.*

565. *E. HIRSUTUM*. Pedunculis multifloris, seminibus globosis binis, leguminibus hirsutis. *Linn. sp. pl. 738, n. 3; Scop. fl. carn. sp. 901; Fl. dan. tab. 639; Gouan, hort. monsp. 374.*

*Vicia foliis linearibus, siliquis racemosis, dispermis, hirsutis. Hall. hist., n. 422.*

*Vicia* Segetum cum siliquis plurimis hirsutis. *Bauh. pin. 345; Tourn. inst. 397.*

*Vicia* sive *Cracca* minimæ species, cum siliquis hirsutis. *Bauh. hist. 2, fol. 315.*

*Arachis minor. Dodon. kruid-b., fol. 866.*

*Arachis* sive *Cracca minima. Lobel, kruid-boek, 89, p. 2.*

Belgicè : *Ruyge Linsen*; gallicè : *Ers velu,*

In agris communis. Annua; junio florens.

257. ORNITHOPUS. Legumen articulatum, teres, arcuatum.

566. *O. PERPUSILLUS*. Foliis pinnatis, leguminibus incurvatis, bractea pinnata duplo majoribus. *Linn. sp. pl.* 743, n. 1; *Gouan, hort. monsp.* 379; *Fl. dan. tab.* 730.

Ornithopodium caule prostrato, foliis pinnatis, siliquis umbellatis, articulatis. *Hall. hist.*, n. 393.

Ornithopodium flore flavescente. *Bauh. hist.* 2, fol. 350.

Ornithopodium. *Dodon. kruyd-b.* 868; *Lobel, kruyd-boek*, 95, p. 2; *Dalech. hist.* 1, fol. 408; *Bauh. pin.* 350; *Boerh. hort. lugd.* 50, p. 2, n. 1—3.

Belgicè : *Vogel-voet*; gallicè : *Pied d'oiseau*.

Ad *Stalle* juxta viam ab *den Spytigen Duyvel*, ad *Forst* ducentem. Annuæ; junio florens.

258. ASTRAGALUS. Calix quinquedentatus, denticulis inferioribus gradatim minoribus; legumen biloculare, gibbum; filamentum solitarium teres.

567. *A. GLYCYPHYLLOS*. Prostratus, leguminibus subtriquestris, arcuatis, foliolis ovalibus pedunculo longioribus. *Linn. sp. pl.* 758, n. 13; *Boerh. hort. lugd.* 53, p. 2, n. 1, 2; *Scop. fl. carn. sp.* 919; *Gouan, hort. monsp.* 384.

Astragalus luteus procumbens perennis. *Tourn. inst.* 416; *Moris. hist.* 2, fol. 107.

Glycirriza sylvestris. *Dalech. hist.* 1, fol. 210.

Fœnum græcum sylvestre primum. *Dodon. kruyd-b.* 872.

Glaux vulgaris seu fœnum græcum sylvestre Tragi. *Lobel, kruyd-b.* 93, p. 2.

Belgicè : *Wild Soet-hout*; gallicè : *Reglisse sauvage*.

Inter *Ever* et *Haren*, juxta viam publicam. Ad *Stalle*, etc.; prope *Kapellen* ad Canalis ripam occidentalem nihil magis abundans. Perennis; junio florens.

259. **TRIFOLIUM.** Flores subcapitati, legumen vix calice longius, non dehiscens, deciduum.

568. *T. OFFICINALE.* Leguminibus racemosis, subdispermis, rugosis, acutis, caule erecto. *Linn. sp. pl.* 765, n. 4; *Scop. fl. carn. sp.* 935; *Blakw. herb. tab.* 80.

Melilotus siliquis racemosis, pendulis, acutis, rugosis, dispermis. *Hall. hist.*, n. 362.

Melilotus officinarum Germaniæ. *Bauh. pin.* 331; *Tourn. inst.* 407.

Melilotus germanica. *Lobel, kruyd-b.* 49, p. 2.

Melilotus sive Trifolium odoratum. *Dodon. kruyd-boek*, 901.

Melilotus vulgaris. *Dalech. hist.* 1, fol. 431.

Belgicè : *Melilote*; gallicè : *Melilot*.

In pratis *Haren, Machelen, etc.* Annua; julio florens.

569. *T. PRATENSE.* Trifolium spicis globosis, subvillosis, cinctis stipulis oppositis, membranaceis. *Linn. sp. pl.* 768, n. 18; *Scop. fl. carn. sp.* 923; *Blakw. herb. tab.* 20; *Dodon. kruyd-b.* 898; *Lobel, kruyd-boek*, 35, p. 2.

Trifolium caule obliquo, foliis ovatis, hirsutis, supremis conjugatis, vaginis aristatis. *Hall. hist.*, n. 377.

Trifolium pratense flore monopetalo. *Tourn. inst.* 404.

Trifolium pratense purpureum. *Bauh. pin.* 327; *Morris. hist.* 2, fol. 138; *Bauh. hist.* 2, fol. 374.

Belgicè : *Klaver*; gallicè : *Trèfle*.

In agris pratisque. Perennis; junio florens.

570. *T. ARVENSE.* Spicis ovalibus villosis, dentibus calicis setaceis, villosis, æqualibus. *Linn. sp. pl.* 769, n. 23; *Scop. fl. carn. sp.* 930; *Gouan, hort. monsp.* 391; *Fl. dan. tab.* 724.

Trifolium caule ramoso, foliis lanceolatis, serratis, spicis villosis, ovalibus. *Hall. hist.*, n. 373.

Trifolium arvense humile spicatum, sive Lagopus. *Bauh. pin.* 328; *Tourn. inst.* 405.

Lagopus trifolius quorundam. *Bauh. hist.* 2, fol. 377.

Lagopus. *Dodon. kruyd-b.* 916; *Lobel, kruyd-b.* 44, p. 2; *Dalech. hist.* 1, fol. 371; *Matthiol. in Diosc.* 328.

Belgicè : *Haese-poot* ; gallicè : *Pied de lièvre*.

In arvis ubiquè. Annuæ ; julio florens.

571. *T. AGRARIUM*. Spicis ovalibus, imbricatis, vexillis deflexis, persistentibus, stipulis cordatis, ciliatis, foliolo impari petiolato, caule diffuso. *Linn. sp. pl.* 772, n. 36; *Scop. fl. carn. sp.* 931; *Dodon. kruid-boek*, 915.

Trifolium caulibus diffusis, spicis ovatis, strepentibus. *Hall. hist.*, n. 363.

Trifolium luteum minimum. *Lobel, kruid-b.* 35, p. 2.

Trifolium pratense luteum, capitulo Lupuli, seu agrarium. *Bauh. pin.* 328; *Boerh. hort. lugd.* 31, p. 2.

Belgicè : *Steen-klaver* ; gallicè : *Trèfle jaune*.

Ad margines arborum, etc. Junio floret ; perennis.

572. *T. REPENS*. Capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule repente. *Linn. sp. pl.* 767 n. 12; *Scop. fl. carn. sp.* 934; *Gouan. hort. monsp.* 388.

Trifolium caule repente, spicis depressis, siliquis tetraspermis. *Hall. hist.*, n. 367.

Trifolium pratense album. *Bauh. pin.* 327; *Tourn. inst.* 406.

Trifolium pratense album vulgare odoratum. *Moris. hist.* 2, fol. 137.

Belgicè : *Witte-klaver* ; gallicè : *Trèfle blanc*.

In pascuis viisque. Perennis ; junio florens.

260. *LOTUS*. Calix tubulosus ; alæ sursùm longitudinaliter conniventes ; legumen strictum, cylindricum.

573. *L. CORNICULATUS*. Capitulis depressis, caulibus decumbentibus, leguminibus patentibus. *Linn. sp. pl.* 775, n. 13; *Scop. fl. carn. sp.* 937; *Gouan, hort. monsp.* 395.

Lotus siliquis umbellatis, rectissimis, cylindricis. *Hall. hist.*, n. 385.

Lotus seu Melilotus pentaphyllos minor glabra. *Bauh. pin.* 382.

Melilotus coronata. *Lobel, kruid-b.*, fol. 49, p. 2.

Trifolium corniculatum primum. *Dodon. kruid-b.* 911.

Belgicè *Vogel-vitsen* ; gallicè : *Lotier*.

Ad margines pratorum communis. Perennis ; totâ serè æstate florens.

261 **MEDICAGO**. Pistillum incurvatum, è carinâ elasticè exsiliens; legumen compressum, arcuat-  
tum aut spirale.

574. *M. SATIVA*. Pedunculis racemosis, leguminibus angustis, æqualibus, contortis, caule erecto, glabro.  
*Linn. sp. pl.* 778, n. 5; *Gouan, hort. monsp.* 398.  
Medica legitima. *Clus. hist. rar.* 242, p. 2.  
Medica sativa. *Moris. hist.* 2, fol. 150; *tab.* 16, *fig.* 1.  
Medica. *Dodon. kruid-b.*, fol. 914.  
Fœnum burgundicum. *Lobel, kruid-b.* 42, p. 2.  
Trifolium siliquâ cornutâ, sive Medica. *Bauh. pin.* 330.  
Belgicè : *Fransche Klaver*; gallicè : *Luserne*.  
In arvis *Schaerbeek, Ever, Haren, etc.* Perennis;  
junio florens.

575. *M. FALCATA*. Pedunculis racemosis, leguminibus lunatis, caule prostrato. *Linn. sp. pl.* 779, n. 6;  
*Scop. fl. carn. sp.* 941; *Fl. dan. tab.* 233.  
Medica foliis oblongis, serratis, siliquis semilunari-  
bus, racemosis. *Hall. hist.*, n. 381.  
Medica flavo flore. *Clus. hist. rar.* 243, p. 2.  
Trifolium sylvestre luteum, siliquâ cornutâ. *Bauh. pin.* 330.  
Medica sylvestris flore croceo. *Tourn. inst.* 410.  
Belgicè : *Boks-horen*; gallicè : *Luserne à faucilles*.  
Ad *Laken*, vulgò *op den Stuyvenberg, etc.* Perennis;  
junio florens. *Rarior*.

576. *M. LUPULINA*. Spicis ovalibus, pericarpis reniformibus, unilocularibus, monospermis, caulibus procumbentibus. *Linn. syst. veget.* 1147, n. 8.  
Medica caule diffuso, capitulis hemisphæricis, siliquis reniformibus. *Hall. hist.*, n. 380.  
Trifolium pratense luteum capitulo brevior. *Bauh. pin.* 328.  
Trifolium luteum, lupulinum, minimum. *Moris. hist.* 2, fol. 142.  
Trifolium lupulinum alterum, minus. *Raij. sinop.* 195.  
Belgicè : *Kleyne Geële Klaver*; gallicè : *Lupuline*.  
Prope *Ever*, ad margines. Biennis; junio florens.

577. *M. POLYMORPHA*. Pericarpis duplicatis, cochlea-

tis, stipulis dentatis, caule diffuso. *Linn. syst. veget.* 1147, n. 10; *Scop. fl. carn. sp.* 942; *Gouan, hort. monsp.* 398.


**M. HIRSUTA.** Pedunculis multifloris, leguminum spinulis hamatis, stipulis integris. *Linn. l. cit. variet.* 10; *Scop. l. cit. variet.* 6; *Gouan, l. cit. variet.* 8; *Hall. hist.*, n. 383, *variet.* 2.

*Medica echinata, hirsuta. Tourn. inst.* 410; *Bauh. hist.* 2, *fol.* 386.

*Trifolium arvense echinatum. Bauh. pin.* 329.

Belgicè : *Vogel-klover.*

Prope *Woluwe*, ad margines; et super murum *Pontis Diaboli* pone, de *Kleyne-Spuye*, ubi D. de *Hemptinne*, amicus et collega, mihi indicavit. *Annua; fine maii* florens.





---

 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.
 

---



---

 POLYADELPHIA.
 

---



---

 POLYANDRIA.
 

---

262. **HYPERICUM.** Calix quinquepartitus; petala quinque; filamenta multa, basi connata in tres-aut-quinque-phalanges; capsula tri-aut-quinquelocularis, polysperma.
578. *H. QUADRANGULARE.* Floribus trigynis, caule quadrangulo herbaceo, foliis ovatis, pellucido-punctatis. *Linn. sp. pl.* 785, n. 13; *Fl. dan. tab.* 640. Hypericum caule quadrangulo, foliis ovatis, perforatis, punctatis. *Hall. hist.*, n. 1038. Hypericum quadrangulum. *Scop. fl. carn. sp.* 943; *Gouan, hort. monsp.* 402. Hypericum vulgare minus, caule quadrangulo. *Bauh. pin.* 279. Hypericum Ascyron dictum, caule quadrangulo. *Bauh. hist.* 3, fol. 382. Ascyrum. *Dodon. kruid-b.* 105; *Lobel, kruid-b.* 485; *Matthiol. in Diosc.* 315, *Dalech. hist.* 2, fol. 55. Belgicè : *Hertshoey*; gallicè : *Millepertuis quarrré.* In pratis, juxta rivulos, etc. Perennis; julio florens.
579. *H. PERFORATUM.* Floribus trigynis, caule ancipiti, herbaceo, foliis obtusis, pellucido-punctatis, petalis oblique truncatis. *Linn. sp. pl.* 785, n. 14; *Scop. fl. carn. sp.* 944; *Blakw. herb. tab.* 15; *Gouan, hort. monsp.* 402. Hypericum caule tereti, alato, ramosissimo, foliis ovatis, perforatis. *Hall. hist.*, n. 1037. Hypericum vulgare. *Bauh. pin.* 279; *Bauh. hist.* 3, fol. 381; *Tourn. hist.* 254; *Boerh. hort. lugd.* 241; *Moris. hist.* 2, fol. 469. Hypericum. *Dodon. kruid-b.* 101; *Lobel, kruid-b.*

483; *Matthiol. in Diosc.* 315; *Dalech. hist.* 2, fol. 53.

Belgicè : *St.-Jans-kruyd*; gallicè : *Millepertuis*.  
in pratis et pascuis. Perennis; julio florens.

580. *H. HUMIFUSUM*. Floribus trigynis, axillaribus, solitariis, caulibus ancipitibus, prostratis, filiformibus, foliis glabris. *Linn. sp. pl.* 785, n. 15; *Gouan, fl. monsp.* 277; *Fl. dan. tab.* 141.

*Hypericum* caule prostrato, foliis ovatis, calicibus serratis, punctatis. *Hall. hist.*, n. 1039.

*Hypericum* supinum tertium minimum. *Clus. hist. rar.* 181, p. 2; *Lobel, kruyd-b.* 485; *Bauh. hist.* 3, fol. 384.

*Hypericum* minus, vel supinum glabrum. *Bauh. pin.* 279; *Moris. hist.* 2, fol. 469; *Tourn. inst.* 255; *Boerh. hort. lugd.* 241.

*Hypericum* minus. *Dodon. kruyd-b.*, fol. 102.

Belgicè : *Kleyn St.-Jans-kruyd*; gallicè : *Millepertuis couché*.

In sylvis *Vorst, Heder, etc.* Perennis; augusto florens.

581. *H. HIRSUTUM*. Floribus trigynis, calicibus serrato-glandulosis, caule tereti, erecto, foliis ovatis, subpubescentibus. *Linn. sp. pl.* 786, n. 16; *Scop. fl. carn. sp.* 945; *Gouan, hort. monsp.* 402.

*Hypericum* foliis ovatis, hirsutis, calicibus lanceolatis, erratis, glanduligeris. *Hall. hist.*, n. 1043.

*Hypericum* villosum, erectum, caule rotundo. *Tourn. inst.* 255; *Boerh. hort. lugd.* 241.

*Hypericum Androsæmum* dictum. *Bauh. hist.* 3, fol. 382.

*Ruta sylvestris hypericoïdes*. *Dodon. kruyd-b.* 103. *Androsæmum*. *Lobel, kruyd-b.*, fol. 485.

Belgicè : *St.-Jans-ruyte*.

In sylvis *Heder, Vorst, etc.* Perennis; julio florens.

582. *H. PULCHRUM*. Floribus trigynis, calicibus serrato-glandulosis, caule tereti, foliis amplexicaulibus, cordatis, glabris. *Linn. sp. pl.* 786, n. 18; *Gouan, hort. monsp.* 403; *Fl. dan. tab.* 75.

*Hypericum* foliis amplexicaulibus cordatis, calicibus ovatis, serratis, glanduligeris. *Hall. hist.*, n. 1041.

*Hypericum minus erectum.* Bauh. pin. 279; Boerh. hort. lugd. 241; Tourn. inst. 255.

*Hypericum pulchrum* Tragi. Bauh. hist. 3, fol. 383.

*Hypericum minus*, glabrum, erectum, pulchrum. Moris. hist. 2, fol. 470.

Belgicè : Schoon St.-Jans-kruyd; gallicè : Millepertuis élégant.

In sylvâ Heder, Terhameren, etc. Augusto florens; perennis.



## CLASSIS DECIMA OCTAVA.

### SYNGENESIA.

#### POLYGAMIA AEQUALIS.

263. TRAGOPOGON. Receptaculum nudum, calix simplex, pappus plumosus.

583. *T. PRATENSE*. Calicibus corollæ radium æquantibus, foliis integris, strictis. *Linn. sp. pl.* 789, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 946; *Gouan, hort. monsp.* 404. Tragopogon foliis gramineis, carinatis, amplexicaulibus, caudatis, subcrispis, calice flori æquali. *Hall. hist.*, n. 8.

Tragopogon pratense luteum majus. *Bauh. pin.* 274.

Tragopogon flore luteo. *Bauh. hist.* 2, fol. 1058.

Tragopogon. *Dodon. kruid-b.* 408; *Lobel, kruid-boek*, 650.

*Barbula hirci. Matthiol. in Diosc.* 197.

Belgicè : *Boks-baerd*; gallicè : *Barbe de bouc*.

In pratis frequens. Biennis; julio florens.

264. SONCHUS. Receptaculum nudum; calix imbricatus, ventricosus; pappus capillaris.

584. *S. OLERACEUS*. Pedunculis tomentosis, calicibus glabris. *Linn. sp. pl.* 794, n. 4; *Fl. dan. tab.* 682;

*Gouan, hort. monsp.* 407; *Blakw. herb. tab.* 30.

*Sonchus* foliis amplexicaulibus, dentatis, integris, semipinnatis, calicibus lævibus. *Hall. hist.*, n. 21, 22.

*Hieracium oleraceum. Scop. fl. carn. sp.* 975.

*Sonchus aspera* (et lævis). *Dodon. kruid-b.* 1005; *Lobel, kruid-b.* 283; *Dalech. hist.* 1, fol. 483.

*Sonchus asper laciniatus* (et non laciniatus). *Bauh. pin.* 124; *Boerh. hort. lugd.* 85.

Belgicè : *Konyn-kruid*; gallicè : *Laitron*.

In hortis cultisque. Annua; augusto florens;

585. *S. ARVENSIS*. Pedunculis calicibusque hispidis, subumbellatis, foliis runcinatis, basi cordatis. *Linn. sp. pl.* 795, n. 3; *Gouan, hort. monsp.* 407; *Fl. dan. tab.* 606.

*Sonchus* foliis amplexicaulibus, semipinnatis, serratis, calicibus hispidis. *Hall. hist.*, n. 23.

*Hieratium arvense*. *Scop. fl. carn. sp.* 974.

*Hieratium sonchites majus*. *Bauh. pin.* 126.

*Sonchus repens*, multis *Hieratium majus*. *Bauh. hist.* 2, fol. 1017; *Tourn. inst.* 474; *Boerh. hort. lugd.* 84.

Belgicè : *Gansen-distel*; gallicè : *Làceron*.

In arvis communis. Perennis; julio florens.

265. **LACTUCA**. Receptaculum nudum; calix imbricatus, cylindricus, margine membranaceo; pappus simplex, stipitatus; semina lævia.

586. *L. SCARIOLA*. Foliis verticalibus carinâ aculeatis. *Linn. sp. pl.* 795, n. 2; *Gouan, hort. monsp.* 408.

*Lactuca* foliis semipinnatis, nervo spinoso. *Hall. hist.*, n. 14.

*Lactuca sylvestris* costâ spinosâ. *Bauh. pin.* 123.

*Lactuca sylvestris laciniata*. *Moris. hist.* 3, fol. 58, tab. 2, fig. 17.

*Lactuca sylvestris*. *Dodon. kruid-b.* 1009; *Matthiol. in Diosc.* 193; *Dalech. hist.* 1, fol. 460.

Belgicè : *Wilde Lattauw*; gallicè : *Scariole*.

In arvis *Etterbeek*, prope sylvam *Linthout*, etc. *Annua*; augusto florens.

587. *L. SATIVA*. Foliis rotundatis, caulinis cordatis, caule corymboso. *Linn. sp. pl.* 795, n. 4; *Blakw. herb. tab.* 88; *Gouan, hort. monsp.* 408; *Bauh. pin.* 122, 123; *Dodon. kruid-b.* 1007; *Lobel, kruidboek*, 291; *Bauh. hist.* 2, fol. 997—999; *Moris. hist.* 3, fol. 57, tab. 2, fig. 2; *Boerh. hort. lugd.* 82, n. 6—55.

Belgicè : *Lattauw*, *Salaet*; gallicè : *Laitue*.

In hortis colitur.

266. **PRENANTHES**. Receptaculum nudum; calix caliculatus; pappus capillaris, subsessilis; flosculi simplici serie.

588. *P. MURALIS*. Flosculis quinis, foliis runcinatis. *Linn.*

*sp. pl.* 797, *n.* 4; *Scop. fl. carn. sp.* 964; *Fl. dan. tab.* 509; *Gouan, hort. monsp.* 410.

*Prenanthes* foliis serratis, pinnatis, pinnâ supremâ triangulari, trilobâ. *Hall. hist.*, *n.* 18.

*Sonchus lævior vulgaris secundus.* *Clus. hist. rar.* 146, *p.* 2.

*Sonchus alter*, folio profundis laciniis sinuato. *Lobel, kruid-b.* 284.

*Sonchus lævis laciniatus muralis*, parvis floribus. *Bauh. pin.* 124.

*Lactuca sylvestris murorum*, luteo flore. *Bauh. hist.* 2, *fol.* 1004.

Belgicè : *Dauw-distel.*

Ad muros vetustos. Perennis; augusto florens.

267. *LEONTODON.* Receptaculum nudum; calix imbricatus, squamis interioribus parallelis, æqualibus, laxiusculis; pappus capillaris, stipitatus.

589. *L. OFFICINALE.* Foliis runcinatis, acutè dentatis, glabris; squamis calicinis exterioribus reflexis, integris, pappo stipitato. *Linn. sp. pl.* 798, *n.* 1; *Blakw. herb. tab.* 1; *Fl. dan. tab.* 574.

*Taraxacum* calicibus glabris, squamis imis reflexis. *Hall. hist.*, *n.* 56.

*Hedypnois Taraxacum.* *Scop. fl. carn. sp.* 957.

*Hedypnois.* *Dalech. hist.* 1, *fol.* 475; *Fusch. hist.* 680.

*Dens leonis angustiore folio.* *Bauh. pin.* 126.

*Dens leonis vulgi.* *Lobel, kruid-b.* 278; *Dodon. kruid-boek*, 992.

Belgicè : *Pisse-bloem*; gallicè : *Pisse-en-lit.*

In Pascuis ubiquè. Perennis; aprili florens.

590. *L. TARAXACON.* Pappo stipitato, squamis calicinis exterioribus erectis, appressis, integris, foliis lanceolatis, integerrimis vel denticulatis. *Linn. syst. veget.* 1175, *n.* 3.

*Dens leonis latiore et rotundiore folio.* *Tourn. inst.* 468; *Gouan, hort. monsp.* 410.

*Dens leonis latiore folio.* *Bauh. pin.* 126.

Belgicè : *Kanker-bloem*; gallicè : *Dent-de-lion.*

In pratis, etc. Perennis; maio florens. *Præcedenti rarior.*

591. *L. AUTUMNALE*. Pappo subsessili, caule ramoso, pedunculis squamosis, foliis lanceolatis, dentatis, integerrimis, glabris. *Linn. sp. pl.* 798, n. 3; *Scop. fl. carn. sp.* 981; *Fl. dan. tab.* 501.  
*Picris* caule nudo, brachiato, foliis glabris, semipinnatis. *Hall. hist.* n. 28.  
*Hieratium* folio *Chondrillæ*, caule vimineo, lævi. *Boerh. hort. lugd.* 86.  
*Hieratium* folio *Chondrillæ*, glabro, radice *Succisæ* simili. *Bauh. pin.* 127.  
*Hieratium* minus præmorsâ radice. *Lobel, kruid-b.* 286; *Bauh. hist.* 2, fol. 1031.  
*Hieratium* quartum. *Dodon. kruid-b.* 998.  
*Picris*. *Dalech. hist.* 1, fol. 472.  
 Belgicè : *Papen-kruid*.  
 In pratis *Anderlegt*, *Molebeek*, etc. Perennis; Augusto florens.
592. *L. HIRTUM*. Pappo sessili, calice toto erecto, foliis dentatis, hirtis, setis simplicissimis. *Linn. syst. veget.* 1175, n. 11; *Scop. fl. carn. sp.* 978; *Gouan, hort. monsp.* 411.  
*Rhagadiolus* foliis semipinnatis, asperrimis. *Hall. hist.* n. 7.  
*Dens leonis* foliis minimis, hirsutis, asperis. *Tourn. inst.* 469  
*Dens leonis*, asper, minor. *Boerh. hort. lugd.* 89.  
*Hieratium* *Dentis leonis* folio, hirsutie asperum. *Bauh. pin.* 127.  
*Hieratium* parvum, hirtum, caule aphylo. *Bauh. hist.* 2, fol. 1038.  
 Belgicè : *Kleyne Pisse-bloem*.  
 Ad *Molebeek*, *Berghem*, etc. Perennis, junio florens.
593. *L. HISPIDUM*. Calice toto erecto, pappo sessili, foliis dentatis, integerrimis, hispidis, pilis furcatis. *Linn. sp. pl.* 805, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 977; *Gouan, hort. monsp.* 411.  
*Picris* caule nudo, unifloro, foliis asperis, dentatis. *Hall. hist.* n. 25.  
*Hieratium* foliis et floribus *Dentis leonis* bulbosi. *Lobel, kruid-b.* 287.  
*Dens leonis* foliis hirsutis et asperis. *Tourn. inst.* 468.  
*Hieratium* montanum *Dentis leonis* folio, seu laciniatum, lanuginoso folio. *Bauh. pin.* 128.

Hieratium octavum folio Hedynois. *Clus. hist. rar.*

142, p. 2.

Belgicè : *Geële Morgen-sterre.*

In pratis *Anderlegt, Laken, etc.* Perennis ; julio florens.

268. HYOSERIS. Receptaculum nudum ; calix sub-æqualis ; pappus paleaceo-aristatus, capillari cinctus.

594. *H. MINIMA.* Caule diviso, nudo, pedunculis incrassatis. *Linn. sp. pl.* 809, n. 6 ; *Gouan, hort. monsp.* 416 ; *Fl. dan. tab.* 201.

Lapsana foliis ovatis, dentatis, caulibus nudis, sub flore tomentibus. *Hall. hist., n.* 4.

Hieratium minimum. *Clus. hist. rar.* 142, p. 2.

Hieratium minus folio subrotundo. *Bauh. pin.* 127.

Hieratium minus, Dentis leonis folio, oblongo, glabro. *Tourn. inst.* 470.

Hyoseris angustifolia. *Boerh. hort. lugd.* 93.

Prope *Stalle*, vulgò *in het Lang-veld* ; ad *Laken*, op den *Stuyvenberg*, etc. Annua ; augusto florens. *Rarior.*

269. HIERATIUM. Receptaculum nudum ; calix imbricatus, ovatus, interdum caliculatus ; pappus sessilis, capillaris.

595. *H. PILOSELLA.* Scapo nudo, unifloro, foliis integerrimis, ovatis, subtùs tomentosis, stolonibus repentibus. *Linn. sp. pl.* 800, n. 3 ; *Scop. fl. carn. sp.* 966 ; *Blakw. herb. tab.* 365 ; *Gouan, hort. monsp.* 412.

Hieratium caule unifloro, stolonibus reptantibus, foliis petiolatis, ovatis, longè pilosis, subtùs tomentosis. *Hall. hist., n.* 55.

Pilosella seu Auricula muris. *Dodon. kruid-b.* 90 ; *Lobel, kruid-b.* 564 ; *Matthiol. in Diosc.* 314.

Pilosella major, repens, hirsuta. *Bauh. pin.* 262.

Dens leonis qui Pilosella officinarum. *Tourn. inst.* 469.

Belgicè : *Muyse-oor* ; gallicè : *Oreille de Souris.*

In siccis ubiquè. Perennis ; maio florens.

596. *H. MURORUM.* Caule ramoso multifloro, foliis ra-



dicalibus ovatis, dentatis, caulino minori. *Linn. sp. pl.* 802, n. 15; *Scop. fl. carn. sp.* 970; *Gouan, hort. monsp.* 413.

Hieratium caule subnudo paucifloro, foliis ovato-lanceolatis, circa petiolum dentatis. *Hall. hist.* n. 46.

Hieratium murorum folio pilosissimo, *Bauh. pin.* 129; *Tourn. inst.* 471; *Boerh. hort. lugd.* 87.

Pulmonaria gallorum flore Hieratii. *Lobel, kruid-b.* 693.

Pilosella major quibusdam, aliis Pulmonaria flore luteo. *Bauh. hist.* 2, fol. 1033.

Corchorus. *Dalech. hist.* 1, fol. 476.

Belgicè : *Fransch Longer-kruid*; gallicè : *Pulmonaire française*.

In muris et apricis ubiquè. Biennis; julio florens.

597. *H. PALUDOSUM*. Caule paniculato, foliis amplexicaulibus, dentatis, glabris, calicibus hispidis. *Linn. sp. pl.* 803, n. 20; *Scop. fl. carn. sp.* 973.

Hieratium foliis glabris, dentatis, imis petiolatis, superioribus amplexicaulibus, calicibus hirsutis. *Hall. hist.*, n. 45.

Hieratium montanum, latifolium, glabrum, minus. *Bauh. pin.* 129; *Moris. hist.* 3, fol. 69, tab. 5, fig. 47; *Tourn. inst.* 471.

Belgicè : *Melk-wye*.

Juxta Sennam et fossas pratorum, etc. Biennis; julio florens.

598. *H. SABAUDUM*. Caule erecto, folioso, multifloro, foliis ovato-lanceolatis, dentatis, semiamplexicaulibus. *Linn. sp. pl.* 804, n. 25; *Gouan, hort. monsp.* 413; *Scop. fl. carn. sp.* 972; *Fl. dan. tab.* 872.

Hieratium foliis hirsutis, dentatis, inferioribus ellipticis, superioribus ovato-lanceolatis. *Hall. hist.*, n. 35.

Hieratium subaudum altissimum, foliis latis, brevibus, crebrius nascentibus. *Moris. hist.* 3, fol. 71.

Hieratium latifolium, hirsutum, fruticosum. *Bauh. pin.* 129; *Tourn. inst.* 472.

Belgicè : *Haese-kool*.

Inter fruteta ad *Laken*, vulgò *op den Stuyvenberg*, etc. Perennis; julio florens.

599. *H. VILLOSUM*. Caule ramoso, folioso, foliisque hirsutis, radicalibus lanceolato-ovatis, dentatis, caulinis

- amplexicaulibus, cordatis. *Linn. sp. pl.* 804, n. 22; *Jacq. fl. austr. tab.* 87.
- Hieratium foliis villosis, integerrimis, radicalibus ligulatis, caulinis ovatis, amplexicaulibus, calicibus villosis. *Hall. hist.*, n. 44.
- Hieratium quintum villosum. *Clus. hist. rar.* 141, p. 2.
- Hieratium alpinum latifolium villosum, magno flore. *Bauh. pin.* 128.
- Belgicè : *Wild Longer-kruyd.*
- Ad margines *Ganshoren*, etc., inter fruteta. Perennis; augusto florens.
600. *H. UMBELLATUM.* Caulc erecto, folioso, foliis linearibus, subdentatis, glabris, sparsis, floribus umbellatis. *Linn. sp. pl.* 804, n. 23; *Hall. hist.* n. 34; *Fl. dan. tab.* 680; *Gouan, hort. monsp.* 413.
- Hieratium magnum primum. *Dodon. kruyd-b.* 997.
- Hieratium alterum grandius. *Lobel, kruyd-b.* 289.
- Hieratii tertii genus alterum, angustifolium. *Clus. hist. rar.* 140, p. 2.
- Hieratium fruticosum angustifolium majus. *Bauh. pin.* 129.
- Hieratium subaudum. *Dalech. hist.* 1, fol. 481.
- Belgicè : *Havik-kruyd*; gallicè : *Epervière.*
- In sylvis *Linthout*, *Heder*, etc. Perennis; julio florens.
270. CREPIS. Receptaculum nudum; calix caliculatus, squamis deciduis; pappus plumosus stipitatus.
601. *C. BIENNIS.* Foliis runcinato-pinnatifidis, scabris, basi supernè dentatis, calicibus muricatis. *Linn. sp. pl.* 807, n. 12; *Gouan, hort. monsp.* 414.
- Crepis foliis subscabris, semipinnatis, pinnâ extremâ maximâ. *Hall. hist.*, n. 30.
- Hieratium Erucae folio, hirsutum. *Bauh. hist.* 2, fol. 1025.
- Hieratium Chondrillæ folio, hirsutum. *Tourn. inst.* 470.
- Hieratium maximum Chondrillæ folio, asperum. *Bauh. pin.* 127.
- Belgicè : *Groot Havik-kruyd*; gallicè : *Grande Epervière.*
- In pratis arvisque. Julio florens. *Caulis angulatus scaber, altitudine ferè humanâ*

602. *C. TECTORUM*. Foliis lanceolato-runcinatis, sessilibus, lævibus, inferioribus dentatis. *Linn. sp. pl.* 807, n. 11; *Scop. fl. carn. sp.* 954; *Fl. dan. tab.* 501. *Crepis* foliis pinnatis, supernè amplexicaulibus, hastatis. *Hall. hist.*, n. 31.

*Hieratium Chondrillæ folio*, hirsutum (et glabrum). *Bauh. pin.* 127.

*Hieratium quintum vel minimum*. *Dodon. kruyd-b.* 998.

*Hieratium luteum*, glabrum seu minus, hirsutum. *Raij. angl.* 3, fol. 165.

Belgicè : *Kleyn Havik-kruyd*; gallicè : *Petite Épervière*.

In arvis ubiquè. Annuæ; augusto florens.

271. *HYPOCHÆRIS*. Receptaculum paleaceum; calix subimbricatus; pappus plumosus, stipitatus.

603. *H. RADICATA*. Caule ramoso, nudo, lævi, foliis runcinatis, obtusis, scabris, pedunculis squamosis. *Linn. sp. pl.* 811, n. 6; *Gouan. hort. monsp.* 417; *Fl. dan. tab.* 150.

*Hieratium foliis semipinnatis*, hirsutis, caule nudo, brachiato. *Hall. hist.*, n. 3.

*Achyrophorus radicans*. *Scop. fl. carn. sp.* 987.

*Hieratium Dentis leonis folio*, obtuso, majus. *Bauh. pin.* 127; *Tourn. inst.* 470; *Moris. hist.* 3, fol. 66, tab. 4, fig. 27.

*Hieratium longius radicans*. *Lobel, kruyd-b.* 287; *Raij. hist.* 230.

*Hieratium tertium vel minus*. *Dodon. kruyd-b.* 997.

Belgicè : *Verkens-kruyd*; gallicè : *Porcelle*.

Ad margines *Schaerbeek*, *Strombeek*, etc. Perennis; julio florens.

604. *H. GLABRA*. Caule ramoso, nudo, foliis sinuato-dentatis, calicibus oblongis, imbricatis. *Linn. sp. pl.* 811, n. 5; *Gouan, hort. monsp.* 417; *Fl. dan. tab.* 242.

*Hypochæris foliis glabris*, semipinnatis. *Hall. hist.*, n. 3.

*Hieratium minus Dentis leonis folio oblongo*, glabro. *Bauh. pin.* 127; *Tourn. inst.* 471; *Boerh. hort. Lugd.* 87.

Hypochæris. *Tabern. icon. pl.* 604, *p.* 17

In arvis *Laken, Jette, etc.* Annuæ; augusto florens.

272. **LAPSANA.** Receptaculum nudum; calix caliculatus, squamis singulis interioribus canaliculatis.

605. **L. COMMUNIS.** Calicibus fructûs angulatis; pedunculis ramosissimis, tenuibus. *Linn. sp. pl.* 811, *n.* 1; *Scop. fl. carn. sp.* 988; *Fl. dan. tab.* 500.

Lampsana caule brachiato, foliis ovatis, longè petiolatis, petiolis pinnatis. *Hall. hist.*, *n.* 6.

Soncho affinis, Lampsana domestica. *Bauh. pinn.* 124.

Lampsana. *Dodon. kruid-b.* 1055; *Lobel, kruid-b.* 247; *Bauh. hist.* 2, *fol.* 1028; *Dalech. hist.* 1, *fol.* 456; *Tourn. inst.* 479.

Belgicè : *Wild-moes*; gallicè : *Lampsane*.

Sub sepibus ubiquè. Annuæ; junio florens.

273. **CICHORIUM.** Receptaculum subpaleaceum; calix caliculatus, pappus subquinqüedentatus obsoletè pilosus.

606. **C. INTYBUS.** Floribus geminis, sessilibus, foliis runcinatis. *Linn. syst. veget.* 1184, *n.* 1; *Scop. fl. carn. sp.* 991.

Cichorium foliis pinnatis, pinnis triangularibus, dentatis, floribus sessilibus. *Hall. hist.*, *n.* 1.

Cichorium sylvestre seu officinarum. *Bauh. pin.* 126; *Blakw. herb. tab.* 183; *Tourn. inst.* 479; *Moris. hist.* 3, *fol.* 55.

Intybum sylvestre. *Dodon. kruid-b.* 989, *n.* 1, 2.

Cichorium sylvestre (et sativum). *Lobel, kruid-b.* 274.

Belgicè : *Wilde Cicorye*; gallicè : *Chicorée sauvage*.

Ad margines agrorum, etc. Perennis; augusto florens.

607. **C. ENDIVIA.** Floribus solitariis, pedunculatis, foliis integris, crenatis. *Linn. syst. veget.* 1184, *n.* 2; *Gouan, fl. monsp.* 355.

Intybum sativum. *Dodon. kruid-b.* 988; *Lobel, kruid-boek*, 281.

Cichorium latifolium sive Endivia vulgaris. *Bauh. pin.* 125; *Tourn. inst.* 479; *Boerh. hort. lugd.* 91, *n.* 1—6.

Belgicè : *Endyvie*; gallicè : *Endive*!

In hortis colitur. Annuæ; julio florens. *Foliis crispis variat.*

274. **ARCTIUM.** Calix globosus, squamis apice hamis inflexis.

608. *A. LAPPA.* Foliis cordatis, inermibus, petiolatis. *Linn. sp.* 816, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 995; *Gouan, hort. monsp.* 420.

Bardana sive Lappa major. *Dodon. kruid-b.* 48.

Lappa major seu Arctium Dioscoridis. *Bauh. pin.* 198;

*Tourn. inst.* 450; *Moris. hist.* 3, fol. 146.

Personata sive Lappa major, vel Bardana. *Lobel, kruid-b.* 696, *Bauh. hist.* 3, fol. 570.

Belgicè : *Klis-wortel*; gallicè : *Bardane*.

In ruderalis ubique. Biennis; julio florens.

275. **SERRATULA.** Calix subcylindricus, imbricatus, squamis acutis muticis.

609. *S. ARVENSIS.* Foliis lanceolatis, dentatis, spinosis. *Linn. sp. pl.* 820; *Gouan, hort. monsp.* 421; *Fl. dan. tab.* 644.

Cirsium caule anguloso, ramoso; foliis semipinnatis, pinnis angulosis, spinosis, calicibus inermibus, cylindricis. *Hall. hist. n.* 171.

Cirsium arvense. *Scop. fl. carn. sp.* 1001.

Cirsium arvense Sonchi folio, radice repente; flore purpurascens. *Tourn. inst.* 448.

Carduus serpens lævicaulis. *Bauh. hist.* 3, fol. 59.

Carduus vulgatissimus viarum. *Moris. hist.* 3, fol. 156.

Carduus in avenâ proveniens. *Bauh. pin.* 377.

Carduus vincarum repens Sonchi folio. *Bauh. pin.* 378.

Juxta vias ubique. Perennis; julio florens.

276. **CARDUUS.** Calix ventricosus, imbricatus, squamis spinosis; receptaculum pilosum.

610. *C. LANCEOLATUS.* Foliis decurrentibus, pinnatifidis, hispidis, laciniis divaricatis, calicibus ovatis, spinosis villosis, caule piloso. *Linn. sp. pl.* 821, n. 3; *Gouan, hort. monsp.* 421.

*Cirsium* foliis semipinnatis, pinnis bilobatis, spinosis, capitulis congestis, tomentosis, conicis. *Hall. hist.*, n. 169.

*Cirsium lanceolatum*. *Scop. fl. carn. sp.* 1007.

*Carduus lanceolatus latifolius*. *Bauh. pin.* 385; *Moris. hist.* 3, fol. 153.

*Carduus lanceolatus sive sylvestris Dodonei*. *Bauh. hist.* 3, fol. 58.

*Carduus sylvestris primus*. *Dodon. kruyd-b.*, fol. 1159.

*Onopyxus Dodonei*. *Dalech. hist.* 2, fol. 350.

Belgicè : *Speen-distel*, gallicè : *Chardon sauvage*.

Ad margines ubique. Biennis; augusto florens.

611. *C. CRISPUS*. Foliis decurrentibus, sinuatis, margine spinosis; floribus aggregatis, terminalibus, squamis calicis inermibus, subaristatis, patulis. *Linn. sp. pl.* 821, n. 4; *Gouan, hort. monsp.* 422; *Fl. dan. tab.* 621.

*Carduus caule crispo*. *Bauh. hist.* 3, fol. 59; *Tourn. inst.* 440.

*Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris*. *Bauh. pin.* 385.

*Polyacanthos Theophrasti*. *Dalech. hist.* 2, fol. 352.

Belgicè : *Krul-distel*; gallicè : *Chardon crépu*.

Ad margines agrorum communis. Julio florens.

612. *C. ACANTHOIDES*. Foliis decurrentibus, sinuatis, margine spinosis, calicibus pedunculatis, solitariis, erectis, villosis. *Linn. sp. pl.* 821, n. 5; *Gouan, hort. monsp.* 422; *Jacq. fl. austr. tab.* 249; *Bauh. hist.* 3, fol. 59; *Tourn. inst.* 440.

*Carduus foliis ovatis, semipinnatis, subtus tomentosis, spinosis, calicibus molliter spinosis*. *Hall. hist.*, n. 115.

*Carduus spinosissimus vulgaris*. *Lobel, kruyd-b.* 23, p. 2.

*Carduus sylvestris tertius*. *Dodon. kruyd-b.*, fol. 1159.

*Carduus polyacanthos, capitulis longioribus et tenuioribus, foliis albicantibus*. *Moris. hist.* 3, fol. 153.

Belgicè : *Wilden Distel*; gallicè : *Chardon acanthin*. Prope *Dilbeek, Moortebeek, etc.* Annuæ; julio florens.

613. *C. PALUSTRIS*. Foliis decurrentibus, dentatis, margine spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inermibus. *Linn. sp. pl.* 822, n. 7; *Gouan, fl. monsp.* 327; *Bauh. pin.* 377, *prodr.* 156; *Boerh. hort. lugd.* 138.

*Cirsium caule erecto, subnudo, alato, foliis semipinnatis, spinosis, calicibus molliter spinosis. Hall. hist., n. 170.*

*Cirsium pulstre. Scop. fl. carn. sp. 1004.*

*Carduus spinosissimus, erectus, angustifolius, palustris. Moris. hist. 3, fol. 153, tab. 32, fig. 13.*

*Cirsium pratense polycephalon, vulgare. Tourn. inst. 448.*

Belgicè : *Water-distel*; gallicè : *Chardon des marais*.  
Ad ripas Sennæ prope *Curegem*, etc. Perennis; Augusto florens.

614. *C. MARIANUS*. Foliis amplexicaulibus, pinnatifidis, spinosis, calicibus aphyllis, spinis canaliculatis, duplicato-spinosis. *Linn. sp. pl. 823, n. 12; Gouan, hort. monsp. 422; Blakw. herb. tab. 79.*

*Silybum nervis foliorum albis. Hall. hist., n. 181.*

*Cirsium maculatum. Scop. fl. carn. sp. 1009.*

*Silybum, Carduus Mariæ et lacteus. Lobel, kruid-b. p. 2.*

*Carduus Mariæ seu lacteus. Dodon. kruid-b. 1130.*

*Carduus Mariæ. Dalech. hist. 2, fol. 353.*

*Carduus Marianus sive lacteis maculis notatus. Bauh. hist. 3, fol. 52.*

Belgicè : *Onzer-vrouwen-distel*; gallicè : *Chardon Marie*.

In versuris hortorum *Schaerbeek*, etc. Annuæ; junio florens. Non communis.

615. *C. ACAULIS*. Calice glabro. *Linn. syst. veget. 1189, n. 41; Jacq. pl. rar. tab. 18.*

*Cirsium floribus acaulis. Hall. hist., n. 178.*

*Cirsium acaulos. Scop. fl. carn. sp. 1010.*

*Carduus acaulis septentrionalium. Lobel, kruid-b. 8, p. 2.*

*Carlina minor purpureo flore. Clus. hist. rar. 156, p. 2.*

*Carlina acaulis minor, purpureo flore. Bauh. pin. 38.*

*Cirsium acaulos flore purpureo. Tourn. inst. 448.*

Belgicè : *Leege Distel*; gallicè : *Chardon nain*.

In sylvulâ *Laken*, vulgò *den Eysel*, etc. Perennis; Augusto florens.

277. *CNICUS*. Calix ovatus, imbricatus, squamis ramoso-spinosis, bracteis obvallatus; corollulæ æquales.

616. *C. OLERACEUS*. Foliis amplexicaulibus, pinnatifidis,

glabris, bracteis concavis, integris, subcoloratis.

*Linn. sp. pl.* 826, n. 1.

*Cirsium* foliis ciliatis, amplexicaulibus, inermibus, flores comprehendentibus. *Hall. hist.*, n. 173.

*Cirsium* oleraceum. *Scop. fl. carn. sp.* 998.

*Carduus pratensis* Tragi. *Lobel, kruid-b.* 13, p. 2; *Bauh. hist.* 3, fol. 42.

*Carduus pratensis latifolius.* *Bauh. pin.* 376.

*Cnicus pratensis Acanthi folio, flore flavescente.* *Tourn. inst.* 450.

Belgicè : *Bemd-distel*; gallicè : *Quenouille*.

Circa fluvios; in pratis humidis, etc. Perennis; maio florens.

278. ONOPORDON. Receptaculum favosum; calix ventricosus, squamæ mucronatæ.

617. *O. ACANTHIUM.* Calicibus squarrosis, squamis patentibus, foliis ovato-oblongis, sinuatis. *Linn. sp. pl.* 827, n. 1; *Gouan, hort. monsp.* 424.

*Onopordon* caule alato, foliis ovatis, dentatis, dentibus angulosis, aristatis. *Hall. hist.*, n. 159.

*Acanos Spina.* *Scop. fl. carn. sp.* 1013.

*Carduus tomentosus Acanthi folio, vulgaris.* *Tourn. inst.* 441.

*Acanthium.* *Lobel, kruid-b.* 2, p. 2; *Dodon. kruid-boek*, 1129.

*Acanthion Matthioli.* *Dalech. hist.* 2, fol. 326.

*Spina alba, tomentosa, latifolia, sylvestris.* *Bauh. pin.* 382.

*Carduus alatus, tomentosus, latifolius, vulgaris.* *Moris. hist.* 3, fol. 152.

Belgicè : *Weg-distel*; gallicè : *Chardon pedane*.

Ad *Shaerbeek* abundè. Biennis; julio florens.

279. CARLINA. Calix radiatus, squamis marginalibus longis, coloratis.

618. *C. VULGARIS.* Caule multifloro, corymboso, floribus terminalibus, calicum radio albo. *Linn. sp. pl.* 828, n. 4.

*Carlina* foliis radicalibus semipinnatis, pinnis angulosis, spinosis, caulinis ovato-lanceolatis, amplexicaulibus. *Hall. hist.*, n. 182.

*Carlina sylvestris vulgaris.* *Clus. hist. rar.* 156, p. 2.

*Carduus sylvestris secundus.* *Dodon. kruid-b.* 1158.



*Carduus vulgarissimus viarum. Lobel, kruid-b. 23, p. 2.*

*Cnicus sylvestris spinosior. Bauh. pin. 378.*

*Cactus vulgaris Matthioli. Dalech. hist. 2, fol. 320.*

*Belgicè : Dry-distel; gallicè : Carline vulgaire.*

*In Fossis mœniorum pone den dikken Toren, etc. Biennis; augusto florens.*

280. **BIDENS.** Receptaculum paleaceum; pappus aristis erectis scabris; calix imbricatus; corolla rariùs flosculo uno vel altero radiante instructa.

619. *B. TRIPARTITA.* Foliis trifidis, calicibus subfoliosis, seminibus erectis. *Linn. sp. pl. 831; Blakw. herb. tab. 519; Gouan, hort. monsp. 428; Scop. fl. carn. sp. 1090.*

*Bidens foliis petiolatis, tri-et-quinquelobatis, serratis, floribus circumvallatis. Hall. hist., n. 121.*

*Bidens foliis tripartito-divisis. Tourn. inst. 462; Boerh. hort. lugd. 122.*

*Cannabina aquatica, folio tripartitum diviso. Bauh. pin. 321.*

*Hepatorium aquatile. Dodon. kruid-b., fol. 941.*

*Belgicè : Water-boelkens-kruid; gallicè : Eupatoire bâtarde.*

*Ad ripas aquarum communis. Annua; junio florens.*

620. *B. CERNUA.* Foliis lanceolatis, amplexicaulibus, floribus cernuis, seminibus erectis. *Linn. sp. pl. 832; Scop. fl. carn. sp. 1089; Gouan, hort. monsp. 428.*

*Bidens foliis sessilibus, floribus nutantibus, circumvallatis. Hall. hist., n. 120.*

*Bidens folio non dissecto. Tourn. inst. 462; Boerh. hort. lugd. 122.*

*Cannabina aquatica, folio non diviso. Bauh. pin. 321.*

*Verbesina pulchriore flore luteo. Bauh. hist. 2, fol. 1074.*

*Eupatorium cannabinum femina, septentrionalium, stellato et odorato flore. Lobel, kruid-b. 625.*

*Belgicè : Boelkens-kruid wyfken; gallicè : Eupatoire femelle.*

*Juxta aquas. Annua; junio florens.*

281. **EUPATORIUM.** receptaculum nudum; pap-

pus plumosus; calix imbricatus, oblongus; stylus semibifidus, longus.

621. *E. CANNABINUM*. Foliis digitatis. *Linn. sp. pl.* 838, n. 10; *Scop. fl. carn. sp.* 1054; *Bauh. pin.* 320; *Blakw. herb. tab.* 110; *Tourn. inst.* 456.

*Eupatorium* foliis ovato-lanceolatis, tripteris. *Hall. hist.*, n. 136.

*Eupatorium* vulgare. *Dalech. hist.* 1, fol. 929.

*Cannabina* aquatica. *Lobel, kruyd-b.* 625.

*Hepatorium*. *Dodon. kruyd-b.* 35.

Belgicè : *Boelkens-kruyd*; gallicè : *Eupatoire*.

Ad ripas aquarum ubiquè. Perennis; angusto florens;

## POLYGAMIA SUPERFLUA.

282. *TANACETUM*. Receptaculum nudum; pappus nullus; calix imbricatus hemisphæricus; corollæ radii trifidæ, lineari-lingulatae.

622. *T. VULGARE*. Foliis bipinnatis, incisis, serratis. *Linn. sp. pl.* 844, n. 7; *Scop. fl. carn. sp.* 1031; *Blakw. herb. tab.* 464; *Gouan, hort. monsp.* 432.

*Tanacetum* foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, acutè dentatis. *Hall. hist.*, n. 132.

*Tanacetum* vulgare luteum. *Bauh. pin.* 132; *Tourn. inst.* 461.

*Tanacetum* Millefolii foliis. *Lobel, kruyd-b.* 913.

*Tanacetum*. *Dodon. kruyd-b.*, fol. 46.

*Tanacetum* sive *Athanasia*. *Dalech. hist.* 1, fol. 831.

Belgicè : *Worm-kruyd*; gallicè : *Tanaisie*.

In ruderatis ubiquè. Perennis; julio florens. *Foliis crispis* variat.

283. *ARTEMISIA*. Receptaculum subvillosum vel nudiusculum; pappus nudus; calix imbricatus squamis rotundatis, conniventibus; corollulæ radii nullæ.

623. *A. VULGARIS*. Foliis pinnatifidis, planis, incisis, subtus tomentosis, racemis simplicibus recurvatis, flo-

ribus radio quinquefloro. *Linn. sp. pl.* 848, n. 13; *Scop. fl. carn. sp.* 1033, *Blakw. herb. tab.* 431; *Gouan, hort. monsp.* 433; *Bauh. hist.* 3, fol. 184. *Artemisia foliis inferne tomentosis, pinnatis, pinnis acutè dentatis, spicâ paniculatâ, erectâ. Hall. hist., n.* 130.

*Artemisia vulgaris major. Bauh. pin.* 137; *Tourn. inst.* 460.

*Artemisia. Dodon. kruid-b.* 41; *Lobel, kruid-b.* 913; *Dalech. hist.* 1, fol. 826; *Matthiol. in Diosc.* 295; *Boerh. hort. lugd.* 127, 1—3.

Belgicè : *Byvoet*; gallicè : *Armoise*.

Ad margines ubiquè. Perennis; augusto florens.

624. *A. ABSYNTHIUM*. Foliis compositis, multifidis, floribus subglobosis, pendulis, receptaculo villosa. *Linn. sp. pl.* 848, n. 12; *Scop. fl. carn. sp.* 1035; *Gouan, hort. monsp.* 433.

*Absynthium foliis incanis, pinnatis, pinnis bilobatis, incis, lanceolatis, spicis heteromallis, floribus pendulis. Hall. hist., n.* 124.

*Absynthium vulgare. Dalech. hist.* 1, fol. 819; *Lobel, kruid-b.* 916; *Bauh. hist.* 3, fol. 168; *Moris. hist.* 3, fol. 7.

*Absynthium latifolium. Dodon. kruid-b. fol.* 25.

*Absynthium. Blakw. herb. tab.* 17.

Belgicè : *Alsem*; gallicè : *Absynthe*.

Ad margines hortorum *Schaerbeek* et *Ever*. Perennis; junio florens.

+ 625. *A. DRACUNCULUS*. Foliis lanceolatis, glabris, integerrimis. *Linn. sp. pl.* 849, n. 16; *Scop. fl. carn. sp.* 1032; *Gouan, hort. monsp.* 433; *Blakw. herb. tab.* 116.

*Dracunculus hortensis. Bauh. pin.* 98; *Bauh. hist.* 3, fol. 148.

*Draco herba. Dodon. kruid-b.* 1109; *Lobel, kruidboek*, 539; *Boerh. hort. lugd.* 127; *Moris. hist.* 3, fol. 33.

Belgicè : *Dragoen*; gallicè : *Estragon*.

Ad margines hortorum. *Schaerbeek*, etc. Perennis; julio florens.

284. *GNAPHALIUM*. Receptaculum nudum; pappus plumosus vel capillaris; calix imbricatus,

squamis marginalibus rotundatis, scariosis, coloratis.

626. *G. Dioicum*. Sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici, floribus dioïcis. *Linn. sp. pl.* 850, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 1044; *Gouan, hort. monsp.* 434.

Filago flagellis reptans, sexu distinctis, flosculis omnibus androgynis. *Hall. hist.*, n. 157.

Gnaphalium montanum (mas et femina). *Bauh. pin.* 263.

Gnaphalium montanum. *Lobel, kruyd-b.*, fol. 568.

Elichrysum montanum flore rotundiori. *Tourn. inst.* 453.

Pilosella minor. *Dodon. kruyd-b.* 91; *Clus. hist. rar.* 330.

Belgicè : *Katte-poot*; gallicè : *Pied-de-chat*.

Ad *Stalle, Vorst, Diegem* abundè. Perennis; junio florens.

627. *G. Sylvaticum*. Caule herbaceo, simplicissimo, erecto, floribus sparsis. *Linn. sp. pl.* 856, n. 31; *Scop. fl. carn. sp.* 1046, tab. 56; *Fl. dan. tab.* 254.

Filago foliis linearibus, alis spiciferis. *Hall. hist.*, n. 148.

Gnaphalium anglicum vel belgicum. *Lobel, kruyd-b.* 567.

Gnaphalium majus, angusto oblongo folio, alterum. *Bauh. pin.* 263.

Gnaphalium erectum. *Bauh. hist.* 3, fol. 160.

Belgicè : *Engels-Ruer-kruyd*; gallicè : *Perlière des bois*.

In sylvis *Heder, Lorbeek, etc.* Biennis; augusto florens.

628. *G. Uliginosum*. Caule herbaceo, ramoso, diffuso, floribus confertis, terminalibus. *Linn. sp. pl.* 856, n. 30; *Scop. fl. carn. sp.* 1049; *Fl. dan. tab.* 859.

Filago caule ramosissimo, diffuso, umbellâ sessili terminato. *Hall. hist.*, n. 15.

Gnaphalio vulgari similis. *Bauh. hist.* 3, fol. 159.

Elichrysum aquaticum, ramosum, minus, capitulis foliatis. *Tourn. inst.* 452.

Gnaphalium longifolium humile ramosum, capitulis nigris. *Raij. hist.* 295; *Boerh. hort. lugd.* 119.

Belgicè : *Nagel-kruyd*.

Ad *Curegem*, *Veewyde*, etc. Annuæ; julio florens.

629. *G. LUTEO-ALBUM*. Herbaceum, foliis semiamplexicaulibus, ensiformibus, repandis, obtusis, utrinquè pubescentibus, floribus conglomeratis. *Linn. sp. pl.* 851, n. 6; *Gouan, hort. monsp.* 434.

Filago foliis mollissimis, tomentosis, obtusis, umbellis convexis, electrinis. *Hall. hist.*, n. 147.

Chrysocome germanicum. *Lobel, kruyd-b.*, fol. 569.

Gnaphalium Plateau secundum. *Clus. hist. rar.* 329.

Gnaphalium majus, lato oblongo folio. *Moris. hist.* 3, fol. 88, tab. II, fig. 20.

Elichrysium sylvestre latifolium, capitulis conglobatis. *Bauh. pin.* 264; *Tourn. inst.* 452; *Boerh. hort. lugd.* 120.

Belgicè : *Gulde-bloem*.

Prope *Linkenbeek*, etc. Annuæ; augusto florens. *Rarior*.

285. *CONYZA*. Receptaculum nudum; pappus capillaris; calix imbricatus subrotundus, corollulæ radii trifidæ.

630. *C. SQUARROSA*. Foliis lanceolatis, acutis, caule herbaceo, corymboso, calicibus squarrosis. *Linn. sp. pl.* 861, n. 1, *Scop. fl. carn. sp.* 1053; *Gouan, hort. monsp.* 436; *Fl. dan. tab.* 622.

*Conyza* foliis ovato-lanceolatis, rariter serratis, floribus umbellatis. *Hall. hist.*, n. 135.

*Conyza* major vulgaris. *Bauh. pin.* 265; *Tourn. inst.* 454.

*Conyza* major latifolia. *Dodon. kruyd-b.*, fol. 67.

*Conyza* major. *Matthiol. in Diosc.* 299; *Dalech. hist.* 1, fol. 912.

Belgicè : *Mugge-kruyd*; gallicè : *Herbe aux mouchérons*.

Ad *Curegem*, *Veewyde*, etc. Biennis; augusto florens.

286. *ERIGERON*. Receptaculum nudum; pappus capillaris; corollulæ radii lineares angustissimæ.

631. *E. CANADENSE*. Foliis lanceolatis, ciliatis, caule floribusque paniculatis, hirtis. *Linn. sp. pl.* 863, n. 3;

- Scop. fl. carn. sp.* 1060; *Hall. hist.*, n. 84; *Gouan, hort. monsp.* 437.  
*Virga aurea annua. Tourn. inst.* 484; *Boerh. hort. lugd.* 97.  
*Conyza annua, acris, alba, elatior, Linariæ foliis. Moris. hist.* 3, fol. 115, tab. 20, fig. 29.  
 Belgicè : *Peper-kruyd.*  
 Ad margines ubiquè. Junio florens.

632. *E. ACRE.* Pedunculis alternis unifloris. *Linn. sp. pl.* 863, n. 4; *Gouan, hort. monsp.* 438.  
*Erigeron caule alternè ramoso, petiolis unifloris, semiflosculis pappum æquantibus. Hall. hist.*, n. 85.  
*Erigeron polymorphum. Scop. fl. carn. sp.* 1062; *Variet.* 5, 6.  
*Erigeron quartum. Dodon. kruyd-b.*, fol. 1001.  
*Conyza cærulea acris. Bauh. pin.* 265. *Moris. hist.* 3, fol. 115.  
*Aster arvensis cæruleus acris. Tourn. inst.* 481.  
 Prope molam *Ever, etc.* Annuæ; maio florens.

287. TUSSILAGO. Receptaculum nudum, pappus capillaris; calix squamæ æquales, discum æquantés, submembranaceæ.

633. *T. FARFARA.* Scapo imbricato, unifloro, foliis subcordatis, angulatis, denticulatis. *Linn. sp. pl.* 865, n. 3; *Scop. fl. carn. sp.* 1059; *Fl. dan. tab.* 595; *Blakw. herb. tab.* 204; *Gouan, hort. monsp.* 439.  
*Petasites scapo unifloro, flore radiato. Hall. hist.*, n. 143.  
*Tussilago. Dodon. kruyd-b.* 943; *Lobel, kruyd-b.* 696; *Bauh. hist.* 3, fol. 563; *Moris. hist.* 3, fol. 130; *Dalech. hist.* 1, fol. 918; *Matthiol. in Diosc.* 294.  
*Tussilago vulgaris. Bauh. pin.* 197; *Tourn. inst.* 487.  
 Belgicè : *Hoef-blad*; gallicè : *Pas d'âne.*  
 In argillosis humidis ubiquè. Perennis; initio martis florens.

634. *T. ALBA.* Thyrsus fastigiatus, flosculis femineis nudis, paucis. *Linn. sp. pl.* 866, n. 6; *Fl. dan. tab.* 524.  
*Petasites spicis laxis umbellatis, flosculis plerisque androgynis. Hall. hist.*, n. 139.  
*Petasites albus, anguloso folio. Bauh. hist.* 3, fol. 567; *Moris. hist.* 3, fol. 95.

*Petasites minor.* Bauh. pin. 197; Boerh. hort. lugd. 118.

Belgicè : *Pestilentie-wortel*; gallicè : *Herbe aux teigneux*.

Ad Laken, Anderlegt, etc. Perennis; fine martis florens.

635. *T. PETASITES.* Thyrsos ovato, flosculis femineis nudis, paucis. Linn. sp. pl. 866, n. 8; Scop. fl. carn. sp. 1058; Fl. dan. tab. 842.

*Petasites floribus dense spicatis, flosculis androgynis.* Hall. hist., n. 138.

*Petasites major vulgaris.* Bauh. pin. 197; Boerh. hort. lugd. 118.

*Petasites major.* Dalech. hist. 1, fol. 920.

*Petasites.* Dodon. kruyd-b. 945; Blakw. herb. tab. 222; Lobel, kruyd-b. 698.

Belgicè : *Dokke-blad*; gallicè : *Petasite*.

Juxta murum mœniorum, prope de Kleyne Spuy, etc. Perennis; fine martis florens.

288. *SENECIO.* Receptaculum nudum; pappus capillaris, longus; calix conicus, caliculatus, squamis apice spæcelatis.

636. *S. VULGARIS.* Corollis nudis, foliis pinnato-sin-natis, amplexicaulibus, floribus sparsis. Linn. sp. pl. 867, n. 4; Scop. fl. carn. sp. 1063; Blakw. herb. tab. 132; Gouan, hort. monsp. 439; Hall. hist., n. 58.

*Senecio minor vulgaris.* Bauh. pin. 131; Tourn. inst. 456.

*Senecio vulgaris sive Erigeron.* Bauh. hist. 2, fol. 1041.

*Erigeron minus.* Dodon. kruyd-b. 1001.

Belgicè : *Kruys-kruyd*; gallicè : *Senecion*.

In cultis ubique. Annua; aprili florens.

637. *S. VISCOSUS.* Corollis revolutis, foliis pinnatifidis, viscidis, squamis calicinis laxis, longitudinis perianthii. Linn. sp. pl. 868, n. 10; Gouan, hort. monsp. 439.

*Senecio foliis viscidis, pinnatis, pinnis semipinnatis, angulosis, calicibus hirsutis.* Hall. hist., n. 60.

*Jacobæa pannonica prima.* Clus. hist. rar. 21, p. 2; Tourn. inst. 486; Boerh. hort. lugd. 99.

*Erigeron tomentosum alterum.* *Lobel, kruid-b.* 270.  
*Senecio incanus pinguis.* *Bauh. pin.* 131.  
*Senecio hirsutus, viscidus, major, odoratus.* *Bauh. hist.* 2, *fol.* 1042.  
 Belgicè : *Lym-kruid*; gallicè : *Senecion visqueux*.  
*Prope Watermale, Boschfort, etc.* Annuæ; julio florens.

638. *S. JACOBÆA.* Corollis radiantibus, foliis pinnatolyratis, laciniis lacinulatis, caule erecto. *Linn. sp. pl.* 870, *n.* 19; *Scop. fl. carn. sp.* 1072; *Gouan, hort. monsp.* 440.

*Senecio foliis lineatis, pinnatis, pinnis dentatis, extremâ maximâ.* *Hall. hist., n.* 62.

*Jacobæa vulgaris laciniata.* *Bauh. pin.* 131; *Tourn. inst.* 485; *Moris, hist.* 3, *fol.* 108; *Boerh. hort. lugd.* 99.

*Jacobæa Senecio.* *Lobel, kruid-b., fol.* 271.

*Jacobæa.* *Dodon. kruid-b.* 1003; *Dalech. hist.* 1, *fol.* 487.

Belgicè : *St-Jacobs-kruid*; gallicè : *Jacobée*.

Ad margines pratorum, etc. Perennis; julio florens.

639. *S. NEMORENSIS.* Foliis lanceolatis, biserratis, subtus villosis, caule ramoso, corollis radiantibus, ternis quaternisque patentibus. *Linn. sp. pl.* 870, *n.* 22; *Gouan, hort. monsp.* 441; *Jacq. fl. austr. tab.* 184.

*Senecio foliis ovato-lanceolatis, serratis, subtus hirsutis, floribus umbellatis.* *Hall. hist., n.* 64.

*Virga aurea sive Solidago sarracenica latifolia serrata.* *Bauh. hist.* 2, *fol.* 1063.

Belgicè : *Wilde-keule*.

In sylvis omnibus. Perennis; augusto florens.

640. *S. DORIA.* Corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis lanceolatis, denticulatis, nudis, subdecurrentibus, superioribus sensim minoribus. *Linn. syst. veget.* 1229, *n.* 50; *Jacq. fl. austr. tab.* 185; *Gouan, hort. monsp.* 440.

*Jacobæa pratensis altissima, Limonii folio.* *Tourn. inst.* 485.

*Virga aurea major vel Doria.* *Bauh. pin.* 286.

*Alisma monspeliensium sive Doria.* *Bauh. hist.* 2, *fol.* 1064.

*Herba Doria.* *Dodon. kruid-b.* 206; *Lobel, kruid-b.* 366.



Doria Narbonensium. *Boerh. hort. lugd.* 98.

Belgicè : *Gulden-kruyd*; gallicè : *Herbe dorée*.

In sylvis *Linthout*, *Lorbeek*, etc. Perennis; julio florens.

289. **SOLIDAGO.** Receptaculum nudum, pappus capillaris; corollæ radii circiter quinque; calix squamæ imbricatæ conniventes.

641. *S. VIRGA-AUREA.* Caule erecto tereti, supernè ramoso, racemis erectis, foliis inferioribus ellipticis, serratis. *Linn. sp. pl.* 880, n. 9; *Blakw. herb. tab.* 169; *Gouan, hort. monsp.* 444; *Fl. dan. tab.* 663.

*Solidago* caule, anguloso, hirsuto foliis, ovato-lanceolatis, dentatis, racemis multifloris, spicatis. *Hall. hist.*, n. 69.

Doria virgaurea. *Scop. fl. carn. sp.* 1087.

Virga aurea vulgaris latifolia. *Bauh. hist.* 2, fol. 1062.

Virga aurea. *Dodon. kruyd-b.* 207; *Lobel, kruyd-b.* 367.

Belgicè : *Gulde-Roede*; gallicè : *Verge d'or*.

In sylvis communis. Perennis; angusto florens.

290. **INULA.** Receptaculum nudum, pappus capillaris; antheræ basi in duas setas desinentes.

642. *I. PULICARIA.* Foliis amplexicaulibus, undulatis, caule prostrato, floribus subglobosis, radio brevissimo. *Linn. sp. pl.* 882, n. 6; *Fl. dan. tab.* 613; *Blakw. herb. tab.* 103; *Gouan, hort. monsp.* 445. Aster foliis amplexicaulibus, undulatis, hirsutis, radiis brevissimis. *Hall. hist.*, n. 80.

Aster pulicarius. *Scop. fl. carn. sp.* 1080.

Conyza minima. *Dodon. kruyd-b.* 68; *Lobel, kruyd-boek*, 419; *Dalech, hist.* 1, fol. 913.

Conyza minor flore, globoso. *Bauh. pin.* 266.

Belgicè : *Vloey-kruyd*; gallicè : *Herbe aux puces*.

In humidis *Curegem*, *Veewyde*, etc. Annua; septembri florens.

+

643. *I. HIRTÆ.* Foliis sessilibus, lanceolatis, recurvis, subserrato-scabris, caule teretiusculo, subpiloso, floribus inferioribus altioribus. *Linn. syst. veget.* 1241 n. 20; *Jacq. fl. austr. tab.* 358.

*Aster foliis ovatis, venosis, scabris, hirsutis. Hall. hist. n. 75.*

*Aster luteus Salicis folio, hirsuto. Bauh. pin. 266.*

*Aster quintus. Clus. hist. rar. 14, p. 2; Moris. hist. 3, fol. 118.*

*Juxta viam à Dilbeek ad pagum Elegem ducentem. Junio floret. Rarior.*

644. *I. DYSENTERICA.* Foliis amplexicaulibus, cordato-oblongis, caule villosa, paniculato, squamis calicis setaceis. *Linn. sp. pl. 882, n. 5; Fl. dan. tab. 410; Gouan, hort. monsp. 445.*

*Aster foliis amplexicaulibus, undulatis, subtus tomentosis. Hall. hist., n. 79.*

*Aster dysentericus. Scop. fl. carn. sp. 1079.*

*Conyza media Asteris flore luteo, seu tertia Dioscoridis. Bauh. pin. 265.*

*Conyza media vulgaris. Clus. hist. rar. 21, p. 2.*

*Conyza media. Dodon. kruid-b. 67; Lobel, kruid-b. 419; Dalech. hist. 1, fol. 913.*

*Belgicè: Donder-Wortel, gallicè: Aunée commune.*

*Juxta rivulos communis. Perennis; julio floret.*

645. *I. SALICINA.* Foliis lanceolatis, recurvis, serrato-scabris, ramis angulatis, floribus inferioribus altioribus. *Linn. sp. pl. 882, n. 7; Fl. dan. tab. 786; Gouan, hort. monsp. 445.*

*Aster foliis glabris ciliatis, venosis. Hall. hist. n. 76.*

*Aster salicinus. Scop. fl. carn. sp. 1081.*

*Aster montanus luteus, Salicis folio glabro. Bauh. pin. 266; Tourn. inst. 483; Moris. hist. 3, fol. 118.*

*Aster quartus, austriacus secundus. Clus. hist. rar. 14, p. 2.*

*Prope Kleynen-Bygaerde, juxta plateam quâ Hallas itur. Perennis; junio florens.*

291. *BELLIS.* Receptaculum nudum, conicum; pappus nullus; calix hemisphæricus, squamis æqualibus.

646. *B. PERENNIS.* Scapo nudo. *Linn. sp. pl. 886, n. 1; Scop. fl. carn. sp. 1039; Blakw. herb. tab. 200; Hall. hist., n. 93; Gouan, hort. monsp. 447.*

*Bellis sylvestris (et hortensis). Dodon. kruid-b. 422; Lobel, kruid-b. 561; Bauh. pin. 261; Tourn. inst.*

491; *Bauh. hist.* 3, fol. 113; *Boerh. hort. lugd.* 108, n. 1—11.

Belgicè : *Maegde-lieven*; gallicè : *Parquerette*;  
In pascuis ubiquè. Vère floret.

292. *CHRYSANTHEMUM*. Receptaculum nudum, pappus nullus; calix hemisphæricus, imbricatus, squamis marginalibus membranaceis.

647. *C. LEUCANTHEMUM*. Foliis amplexicaulibus, oblongis, supernè serratis, infernè dentatis. *Linn. sp. pl.* 888, n. 3; *Blakw. herb. tab.* 42; *Gouan, hort. monsp.* 448.

*Matricaria* foliis radicalibus petiolatis, ovatis, crenatis, caulinis amplexicaulibus, dentatis. *Hall. hist.*, n. 98.

*Matricaria Leucanthemum*. *Scop. fl. carn. sp.* 1041.

*Leucanthemum vulgare*. *Tourn. inst.* 492; *Boerh. hort. lugd.* 107.

*Bellis major*. *Dodon. kruid-b.* 423; *Lobel, kruid-boek*, 563; *Bauh. hist.* 3, fol. 114.

*Bellis sylvestris major*, caule folioso. *Bauh. pin.* 261.

Belgicè : *St.-Jans-bloem*; gallicè : *Grande Marguerite*.  
In pratis *Laken*, etc. Perennis; junio florens.

648. *C. SEGETUM*. Foliis amplexicaulibus, supernè lacinatis, infernè dentato-serratis. *Linn. sp. pl.* 889, n. 9; *Clus. hist. rar.* 334; *Lobel, kruid-b.* 652; *Boerh. hort. lugd.* 106; *Bulliard, herb. franc. tab.* 339.

*Chrysanthemum segetum vulgare*, glaucum. *Moris. hist.* 3, fol. 15, tab. 4, fig. 1.

*Chrysanthemum folio minus secto*, glauco. *Bauh. hist.* 3, fol. 105; *Tourn. inst.* 493.

*Chrysanthemum*. *Dodon. kruid-b.*, fol. 419.

*Bellis lutea* foliis profundè incisis, major. *Bauh. pin.* 262.

Belgicè : *Gans-bloem*; gallicè : *Marguerite jaune*.

In arvis *Haren*, *Ever*, *Schaerbeek*, etc. Annua; junio florens.

293. *MATRICARIA*. Receptaculum nudum, pappus nullus; calix hemisphæricus, squamis marginalibus solidis, acutiusculis.

649. *M. PARTHENIUM*. Foliis compositis, planis, foliolis

ovatis, incis, pedunculis ramosis. *Linn. sp. pl.* 890, n. 1; *Gouan, hort. monsp.* 449; *Fl. dan. tab.* 674.  
*Matricaria foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, laciniis obtusis, floribus umbellatis. Hall. hist., n.* 100.  
*Matricaria vulgaris sive sativa. Bauh. pin.* 133; *Tourn. inst.* 493.

*Matricaria. Dodon. kruid-b.* 44; *Lobel, kruid-b.* 915; *Matthiol. in Diosc.* 308; *Dalech. hist.* 1, fol. 329; *Blakw. herb. tab.* 192.

Belgicè : *Moeder-kruid*; gallicè : *Matricaire*.

Ad margines *Vorst*, *Molebeek*, etc. Biennis; maio florens.

650. *CHAMOMILLA*. Receptaculis conicis, radiis patentibus, squamis calicis margine æqualibus. *Linn. sp. pl.* 891, n. 3; *Scop. fl. carn. sp.* 1042; *Blakw. herb. tab.* 298; *Gouan hort. monsp.* 450.

*Matricaria foliis capillaribus, duplicato-pinnatis, pinnis lanceolatis, bifidis trifidisque. Hall. hist., n.* 101.  
*Chamæmelum vulgare. Dodon. kruid-b.* 410; *Bauh. pin.* 135.

*Anthemis vulgarior sive Chamæmilla. Lobel, kruid-boek*, 937.

*Chamæmelum vulgare amarum. Bauh. hist.* 3, fol. 116.

Belgicè : *Veld-kamille*; gallicè : *Camomille*.

In arvis communis. Annuæ; junio florens.

294. *ANTHEMIS*. Receptaculum paleaceum, pappus nullus; calix hemisphæricus, subæqualis; flosculi radii plures quàm quinque.

651. *A. ARVENSIS*. Receptaculis conicis, paleis setaceis, seminibus coronato-marginatis. *Linn. sp. pl.* 894, n. 8; *Scop. fl. carn. sp.* 1091; *Gouan, hort. monsp.* 451.

*Chamæmelum foliis glabris, duplicato-pinnatis, nervo foliaceo, pinnulis lanceolatis, semine lævi. Hall. hist., n.* 103.

*Cotula non fœtida. Dodon. kruid-b.* 412; *Bauh. hist.* 3, fol. 120.

*Cotula inodora. Lobel, kruid-b.* 942.

*Chamæmelum inodorum. Bauh. pin.* 135; *Boerh. hort. lugd.* 109; *Tourn. inst.* 494.

Belgicè : *Koey-oog*; gallicè : *Camomille sauvage*.

In arvis ubiquè. Biennis; junio florens.

652. *A. CORULA*. Receptaculis conicis, paleis setaceis, seminibus nudis. *Linn. sp. pl.* 894, n. 9; *Scop. fl. carn. sp.* 1092; *Blakw. herb. tab.* 67; *Gouan, hort. monsp.* 451.

*Chamæmelum* foliis glabris, duplicato-pinnatis, nervo foliaceo, pinnulis lanceolatis, semine exasperato. *Hall. hist.*, n. 104.

*Chamæmelum* foetidum. *Bauh. pin.* 135; *Tourn. inst.* 494; *Boerh. hort. lugd.* 109; *Bauh. hist.* 3, fol. 120.

*Cotula* foetida officinarum. *Lobel, kruid-b.* 941.

*Cotula* sive *Camomilla* foetida. *Dodon. kruid-b.* 412.

Belgicè : *Padde-bloem*; gallicè : *Camomille puante*.

In arvis ubiquè. Annua; junio florens.

295. *ACHILLEA*. Receptaculum paleaceum, pappus nullus; calix ovatus, imbricatus; flosculi radii quatuor aut quinque.

653. *A. MILLEFOLIUM*. Foliis bipinnatis, glabris, pinnarum laciniis linearibus, dentatis. *Linn. sp. pl.* 899, n. 14; *Scop. fl. carn. sp.* 1095; *Fl. dan. tab.* 737.

*Achillea* foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, incisus et integris. *Hall. hist.*, n. 108.

*Millefolium* vulgare album. *Bauh. pin.* 140; *Tourn. inst.* 496; *Moris. hist.* 3, fol. 38; *Blakw. herb. tab.* 18; *Boerh. hort. lugd.* 112.

*Millefolium* terrestre vulgare. *Lobel, kruid-b.* 911.

*Millefolium*. *Dodon. kruid-b.*, fol. 137.

Belgicè : *Gerwe*; gallicè : *Millefeuille*.

Ad margines *Schaerbeek*, etc. Perennis; junio florens.

654. *A. PTARMICA*. Foliis lineari-lanceolatis, amplexicaulibus, serratis. *Linn. sp. pl.* 898, n. 12; *Fl. dan. tab.* 643; *Gouan, hort. monsp.* 453.

*Achillea* foliis linearibus, lanceolatis, acutissimè serratis. *Hall. hist.*, n. 117.

*Ptarmica* vulgaris. *Clus. hist. rar.* 12, p. 2; *Blakw. herb. tab.* 276.

*Ptarmica* seu *Pyrethrum* sylvestre. *Dodon. kruid-b.* 1111.

*Pyrethrum* sylvestre. *Lobel, kruid-b.* 539.

*Dracunculus* pratensis serrato folio. *Bauh. pin.* 98.

Belgicè : *Zeever-wortel*; gallicè : *Ptarmique*.

Ad ripas Sennæ prope *Randsvoort*, etc. Perennis; augusto florens.

## POLYGAMIA FRUSTRANEA.

296. **CENTAUREA.** Receptaculum setosum, pappus plumosus vel capillaris; corollulæ radii infundibuliformes, longiores, irregulares.
655. **C. NIGRA.** Calicis squamulis ovatis, ciliatis; ciliis capillaribus, foliis lyrato-angulatis, floribus flosculosis. *Linn. sp. pl.* 911, n. 9; *Gouan, hort. monsp.* 458.  
*Jacea* foliis radicalibus semipinnatis, caulinis ovato-lanceolatis. *Hall. hist.*, n. 184.  
*Jacea nigra* laciniata. *Bauh. pin.* 271; *Tourn. inst.* 443.  
*Jacea austriaca* sexta. *Clus. hist. rar.* 7, p. 2; *Moris. hist.* 3, fol. 139.  
*Jacea nigra.* *Dodon. kruid-b.* 176; *Lobel, kruid-b.* 641; *Raj. hist.* 325.  
 Belgicè : *Vloke-bloem*; gallicè : *Jacée noire*.  
 In pratis omnibus. Biennis; julio florens.
656. **C. CYANUS.** Calicibus serratis, foliis linearibus, integerrimis, infimis dentatis. *Linn. sp. pl.* 911, n. 12; *Scop. fl. carn. sp.* 1023; *Gouan, hort. monsp.* 458.  
*Cyanus* foliis imis ellipticis, dentatis, superioribus linearibus, semiflosculis latissimis. *Hall. hist.*, n. 191.  
*Cyanus vulgaris.* *Lobel, kruid-b.* 647; *Dodon. kruid-boek*, 398; *Blakw. herb. tab.* 270.  
*Cyanus segetum.* *Bauh. pin.* 273; *Tourn. inst.* 446; *Boerh. hort. lugd.* 145, n. 7—21.  
 Belgicè : *Koren-bloem*; gallicè : *Bleuet*.  
 Inter segetes nimis communis. Annuæ; junio florens.
657. **SCABIOSA.** Calicibus ciliatis, foliis pinnatifidis, laciniis lanceolatis. *Linn. sp. pl.* 913, n. 21; *Scop. fl. carn. sp.* 1026; *Gouan, hort. monsp.* 459.  
*Cyanus* foliis pinnatis, pinnis dentatis, obtusis, squamis calicinis triangularibus. *Hall. hist.*, n. 186.  
*Jacea vulgaris* laciniata, flore purpureo. *Tourn. inst.* 443.  
*Scabiosa major* squamatis capitulis. *Bauh. pin.* 269.  
*Scabiosa major.* *Dalech. hist.* 2, fol. 931.  
 Belgicè : *Groot Schurft-kruid*; gallicè : *Grande Jacée*.

Ad *Schaerbeek*, vulgò *in d'Esch-straet*. Perennis; julio florens.

658. *C. JACEA*. Calicibus scariosis, laceris, foliis lanceolatis, radicalibus sinuato-dentatis, ramis angulatis. *Linn. sp. pl.* 914, n. 26; *Fl. dan. tab.* 519; *Gouan, hort. monsp.* 459.

*Rhaponticum foliis tomentosis, radicalibus semipinnatis, caulinis lanceolatis. Hall. hist., n.* 360.

*Rhaponticum Jacea. Scop. fl. carn. sp.* 1017.

*Jacea nigra pratensis latifolia. Bauh. pin.* 271; *Tourn. inst.* 443; *Moris. hist.* 3, fol. 139.

*Jacea nigra vulgaris capitata et squamata. Bauh. hist.* 3, fol. 27.

Belgicè : *Wild Schurft-kruyd*; gallicè : *Jacée*.

In pratis *Molebeek*, etc. Perennis; julio florens.

659. *C. CALCITRAPA*. Calicibus subduplicato-spinosis, sessilibus, foliis pinnatifidis, linearibus, dentatis, caule piloso. *Linn. sp. pl.* 917, n. 40; *Gouan, hort. monsp.* 460.

*Calcitrapa foliis hirsutis, pinnatis, pinnis dentatis, floribus in alis sessilibus. Hall. hist., n.* 194.

*Rhaponticum Calcitrapa. Scop. fl. carn. sp.* 1019.

*Carduus muricatus vulgò Calcitrapa. Clus. hist. rar.* 7, p. 2.

*Carduus stellatus. Dodon. kruid-b.* 1149; *Lobel, kruidboek*, 15, p. 2.

*Carduus stellatus sive Calcitrapa. Bauh. hist.* 3, fol. 89; *Tourn. inst.* 440.

*Jacea stellata, folio Papaveris erratici. Boerh. hort. lugd.* 140.

Belgicè : *Sterre-Distel*; gallicè : *Chardon étoilé*.

Ad *Elmet*, prope *Mon-Plaisir*, nec alibi. Biennis; julio florens.

#### POLYGAMIA NECESSARIA:

297. *FILAGO*. Receptaculum nudum, pappus nullus; calix imbricatus, flosculi feminei inter squamas calicis locati.

660. *F. ARVENSIS*. Caule paniculato, floribus conicis, lateralibus. *Linn. syst. veget.* 1278, n. 2; *Gouan, hort. monsp.* 465.

*Filago* caule erecto, ramosissimo, foliis mollissimis, tomentosis, florum acervis sessilibus, in spicas continuatis. *Hall. hist.*, n. 154.

*Gnaphalium arvense*. *Scop. fl. carn. sp.* 1051.

*Gnaphalium majus*, angusto oblongo folio. *Bauh. pin.* 263.

*Filago minor*. *Dodon. kruyd-b.* 89; *Lobel, kruyd-b.* 566.

Belgicè: *Kleyn Ruer-kruyd*; gallicè: *Herbe à coton*.  
In arvis inter segetes. Annuæ; junio florens.

661. *F. GERMANICA*. Paniculâ dichotomâ, floribus rotundatis, axillaribus, hirsutis, foliis acutis. *Linn. syst. veget.* 1278, n. 3.

*Filago* caule dichotomo, corymbo sphærico, in angulo sessili. *Hall. hist.*, n. 153.

*Gnaphalium germanicum*: *Scop. fl. carn. sp.* 1050; *Bauh. hist.* 3, fol. 158.

*Gnaphalium vulgare capitulis rotundis sessilibus*, ad angulos floridum. *Moris. hist.* 3, fol. 92.

*Filago* seu *Impia*. *Dodon. kruyd-b.* 89.

*Filago impia Dodonei*. *Tourn. inst.* 454.

*Gnaphalium vulgare*. *Lobel, kruyd-b.* 566.

Belgicè: *Ruer-kruyd*; gallicè: *Velvette*.

Ad *Neér-Heembeek*, etc. Julio floret; Annuæ.

662. *F. MONTANA*. Caule subdichotomo, erecto, floribus conicis, terminalibus axillaribusque. *Linn. syst. veget.* 1278, n. 6; *Gouan, hort. morsp.* 464.

*Filago* caule dichotomo, floribus spicatis, glomeratis. *Hall. hist.*, n. 115.

*Gnaphalium minimum*. *Lobel, kruyd-b.* 566; *Bauh. hist.* 3, fol. 159; *Raij. hist.* 296.

*Gnaphalium minus repens*. *Bauh. pin.* 263.

Belgicè: *Kleyn Gulde-bloem*.

In sylvis prope *Vorst*, etc. Fine julii florens; perennis. *Non communis*.





## CLASSIS DECIMA NONA.

## CRYPTOGAMIA.

## FILICES.

298. **EQUISETUM.** Clava ovato-oblonga, multivalvis; fructificationes peltatæ, intus dehiscentes.

663. *E. SYLVATICUM.* Frondibus compositis, spicâ terminali flaccidâ. *Linn. sp. pl.* 1061, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 1252.

*Equisetum* foliis repetito-ramosis, vaginis laxissimis. *Hall. hist.*, n. 1680.

*Equisetum sylvaticum* tenuissimis setis. *Bauh. pin.* 16; *Tourn. inst.* 533.

*Equisetum* sive *Hippuris* tenuissima non aspera. *Bauh. hist.* 3, fol. 730; *Moris. hist.* 3, fol. 621.

Belgicè: *Bosch-Peêrds-steêrt*; gallicè: *Prêle des bois*.

In pratis sylvaticis communis.

664. *E. ARVENSE.* Scapo fructificante nudo, fronde sterili, verticillato, ramoso, decumbente. *Linn. sp. pl.* 1061, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 1253; *Gouan, hort. monsp.* 522.

*Equisetum* caule florifero nudo, sterili, verticillato, radiorum duodecim. *Hall. hist.*, n. 1676.

*Equisetum arvense* longioribus setis. *Bauh. pin.* 16; *Moris. hist.* 3, fol. 621; *Tourn. inst.* 532.

*Equisetum minus.* *Dodon. kruid-b.* 98; *Fusch. hist.* 323.

*Equisetum tertium* Matthioli. *Dalech. hist.* 1, fol. 938.

*Hippuris minor.* *Lobel, kruid-b.* 969.

Belgicè: *Katte-steêrt*; gallicè: *Queue-de-chat*.

In arvis pratisque *Ganshoren, Jette, etc.*

665. *E. PALUSTRE.* Caulc angulato, frondibus simplicibus. *Linn. sp. pl.* 1061, n. 3; *Scop. fl. carn. sp.* 1254; *Gouan, hort. monsp.* 522; *Lobel, kruid-b.* 970;

- Equisetum caule sulcato, ramis multifloris, foliis indivisis.* *Hall. hist., n. 1677.*  
*Equisetum palustre brevioribus setis.* *Bauh. pin. 15.*  
*Equisetum minus.* *Moris. hist. 3, fol. 621.*  
 Belgicè : *Water-Peérds-steért*; gallicè : *Petite Prêle.*  
 In fossis et paludibus communis.
666. *E. FLUVIATILE.* Caule striato, frondibus subsimpli-  
 cibus. *Linn. sp. pl. 1062, n. 4; Scop. fl. carn. sp. 1255; Blakw. herb. tab. 217; Gouan, hort. monsp. 523.*  
*Equisetum caule florifero nudo, sterili, verticillato; radiorum quadraginta.* *Hall. hist., n. 1675.*  
*Equisetum palustre, longioribus setis.* *Bauh. pin. 15; Tourn. inst. 533.*  
*Equisetum majus aquaticum.* *Bauh. hist. 3, fol. 728; Moris. hist. 3, fol. 621.*  
*Equisetum majus.* *Dodon. kruyd-b., fol. 98.*  
*Hippuris.* *Lobel, kruyd-b., fol. 968.*  
 Belgicè : *Peérds-steért*; gallicè : *Queue-de-cheval.*  
 Juxta rivos in locis sylvosis.
667. *E. LIMOSUM.* Caule subnudo lævi. *Linn. syst. veget. 1288, n. 5.*  
*Equisetum nudum lævius nostras.* *Raij. angl. 3, fol. 131, tab. 5, fig. 2.*  
*Equisetum junceum.* *Boerh. hort. lugd., fol. 107, p. 2.*  
*Equisetum foliis nudum, non ramosum sive junceum.* *Bauh. pin. 16; Moris. hist. 3, fol. 621.*  
 Belgicè : *Verkens-steért*; gallicè : *Prêle nue.*  
 In stagnis et paludibus torfosis. *Pro varietate precedentis habent Haller, Gmelin, etc.*
668. *E. HIEMALE.* Caule nudo, scabro, basi subramoso. *Linn. sp. pl. 1062, n. 6; Gouan, hort. monsp. 523.*  
*Equisetum caule subnudo, asperrimo, vaginis caulinis indivisis, ramis foliatis.* *Hall. hist., n. 1679.*  
*Equisetum nudum, minus, variegatum.* *Tourn. inst. 533.*  
*Equisetum foliis nudum, ramosum.* *Bauh. pin. 16; Moris. hist. 3, fol. 621.*  
*Equisetum primum.* *Tabern. icon. pl. 698, p. 2.*  
*Equisetum tertium Matthioli.* *Boerh. hort. lugd. 107, p. 2.*  
 Belgicè : *Hermoes*; gallicè : *Prêle d'hiver.*  
 Ad *Laken*, vulgò *op den Dries*. Non communis.

299. **OPHIOGLOSSUM.** Spica disticha articulata, articulis transversim dehiscentibus, subglobosis.

669. *O. VULGATUM.* Fronde ovata, scapo unifloro. *Linn. sp. pl.* 1062, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 1256; *Boerh. hort. lugd.* 27; *Tourn. inst.* 548; *Bauh. pin.* 354; *Moris. hist.* 3 fol. 595, tab. 5, fig. 1; *Fl. dan. tab.* 147; *Blakw. herb. tab.* 416.

Ophioglossum folio unico, ovato-lanceolato, obtuso. *Hall. hist.*, n. 1685.

Ophioglossum. *Dodon. kruid-b.* 201; *Lobel, kruid-boek*, 985; *Bauh. hist.* 3, fol. 708; *Matthiol. in Diosc.* 211.

Lingua serpentis. *Dalech. hist.* 1, fol. 915.

Belgicè : *Adders-tonge*; gallicè : *Langue de serpent*.

In pratis *Vorst*, *Anderlegt*, etc. Mense junio. *Rarior*.

300. **PTERIS.** Fructificationes in lineam digestæ, subtùs cingentem frondis marginem.

670. *P. AQUILINA.* Frondibus supradecompositis, pinnis pinnatis, pinnulis lanceolatis, infimis pinnatifidis, superioribus minoribus. *Linn. syst. veget.* 1299, n. 38; *Scop. fl. carn. sp.* 1269.

Filix foliis triplicato-pinnatis, pinnis nervosis, integerrimis, ultimis lanceolatis. *Hall. hist.*, n. 1688.

Filix femina. *Blakw. herb. tab.* 325; *Fusch. hist.* 596; *Tabern. pl. icon.* 471, p. 2.

Filix ramosa major, pinnulis obtusis, non dentata. *Bauh. pin.* 357.

Belgicè : *Groot-Varen-kruid*; gallicè : *Grande Fou-gère*.

In sylvis prope *Carloo*, *Terkameren*, etc.

301. **ASPLENIUM.** Fructificationes in lineis rectis subparallelis in paginâ inferiori frondis congestæ.

671. *A. SCOLOPENDRIUM.* Frondibus simplicibus, cordato-lingulatis, integerrimis, stipitibus hirsutis. *Linn. sp. pl.* 1079, n. 3; *Scop. fl. carn. sp.* 1261; *Gouan, hort. monsp.* 525.

Asplenium petiolis hirsutis, folio longè lineari-lan-

ceolato, integerrimo, posticè cordato. *Hall. hist.*, n. 1695.

Lingua cervina officinarum. *Bauh. pin.* 353; *Blakw. herb. tab.* 138.

Phyllitis seu Lingua cervina officinarum. *Lobel, kruyd-boek*, 981 (*folio dissecto*).

Phyllitis vulgaris. *Clus. hist. rar.* 213, p. 2.

Phyllitis. *Matthiol. in Diosc.* 290; *Dodon. kruyd-b.* 763, (*et folio dissecto*).

Belgicè : *Herts-tonge*; gallicè : *Scolopendre*.

In nemoribus humidis, inque puteis inter lapidum commissuras. *Non communis*.

672. *A. CETERACH*. Frondibus pinnatifidis, lacinjiis alternis, confluentibus, obtusis. *Linn. sp. pl.* 1080, n. 7; *Scop. fl. carn. sp.* 1272; *Blakw. herb. tab.* 216; *Gouan, hort. monsp.* 526.

Asplenium sive Ceterach. *Bauh. hist.* 3, fol. 749; *Tourn. inst.* 544; *Moris. hist.* 3, fol. 561, tab. 2, fig. 1; *Boerh. hort. lugd.* 25.

Asplenium. *Dodon. kruyd-b.* 765; *Lobel, kruyd-b.* 983.

Belgicè : *Steenwaren*; gallicè : *Doradille*.

Supra muros villæ, prope D. *Vanderborcht* ad *Uccle*.

673. *A. TRICHOMANOÏDES*. Frondibus pinnatis, pinnis subrotundis, crenatis. *Linn. sp. pl.* 1080, n. 12; *Blakw. herb. tab.* 370; *Fl. dan. tab.* 119.

Asplenium Trichomanes. *Scop. fl. carn. sp.* 1263; *Gouan, hort. monsp.* 526.

Asplenium foliis pinnatis, pinnis ovatis, crenatis. *Hall. hist.*, n. 1693.

Trichomanes sive Polytrichum officinarum. *Bauh. pin.* 356; *Tourn. inst.* 549.

Trichomanes sive Polytrichum. *Bauh. hist.* 3, fol. 754.

Trichomanes. *Dodon. kruyd-b.* 769; *Lobel, kruyd-b.* 986; *Fusch. hist.* 796; *Matthiol. in Diosc.* 382; *Daléch. hist.* 2, fol. 109.

Belgicè : *Rooide Muer-Ruyt*; gallicè : *Polytric*.

Ad *Bootendael*, ad arborum radices; supra muros vetustos, etc.

674. *A. RUTA-MURARIA*. Frondibus alternatim decompositis, foliolis cuneiformibus, crenulatis. *Linn. sp. pl.* 1081, n. 15; *Scop. fl. carn. sp.* 1265; *Gouan, hort. monsp.* 526; *Fl. dan. tab.* 190.

Asplenium fronde laxè ramosâ, ramis secundis tri-

foliis, superioribus semi-trilobis, rhomboïdeis, circumseratis. *Hall. hist.*, n. 1691.

*Ruta muraria*. *Dodon. kruid-b.* 769; *Bauh. pin.* 356; *Bauh. hist.* 3, fol. 753; *Tourn. inst.* 541; *Boerh. hort. lugd.* 26.

*Salvia vitæ*. *Lobel, kruid-b.* 988; *Dalech. hist.* 2, fol. 110.

Belgicè : *Steenruyte*; gallicè : *Sauvevie*.

Ad muros vetustos communis.

Anno 1804 crescentem inveni plantulam ad murum ecclesiæ Alseberg, omnino characterem habentem *Asplenii alternifolii*. *Jacq. Miscell. austr.* 51, tab. 5, fig. 2. Sed cum ab eo tempore nonquam reperi, non audeo pro specie proponere.

675. *A. ADIANTHUM-NIGRUM*. Frondibus subtripinnatis, foliolis alternis, pinnulis lanceolatis, inciso-serratis. *Linn. sp. pl.* 1081, n. 14; *Scop. fl. carn. sp.* 1264; *Fl. dan. tab.* 250; *Blakw. herb. tab.* 220; *Gouan, hort. monsp.* 526.

*Asplenium* foliis triangularibus, pinnis pinnatis, pinnulis semipinnatis, lobis ovatis, serratis. *Hall. hist.*, n. 1692.

*Dryopteris nigra*. *Dodon. kruid-b.*, fol. 763.

*Adiantum nigrum* Plinii. *Lobel, kruid-b.* 988.

*Adiantum* foliis longioribus, pulverulentis, pediculo nigro. *Bauh. pin.* 355.

Belgicè : *Swart Eyken-Varen*; gallicè : *Capillaire*.

In umbrosis densis, prope *Ouderghem, Bootendal, etc.*

302. *OSMUNDA*. Spica ramosa, fructificationibus subglobosis, sessilibus, transversè deliscentibus.

676. *O. REGALIS* fronde bipinnata, racemo terminali, supradecomposito. *Linn. syst. veget.* 1292, n. 13; *Fl. dan. tab.* 217; *Blakw. herb. tab.* 324.

*Osmunda vulgaris et palustris*. *Tourn. inst.* 547.

*Filix ramosa non dentata florida*. *Bauh. pin.* 357.

*Filix floribus insignis*. *Bauh. hist.* 3, fol. 736.

*Osmunda seu Filix florida*. *Lobel, kruid-b.* 992.

*Filix palustris*. *Dodon. kruid-b.*, fol. 759.

Belgicè : *Water-varen*; gallicè : *Fougère fleurie*.

In sylvâ Soniæ, prope *den Dry Borren*.

677. *O. SPICANT*. Frondibus sterilibus pinnatifidis, fruc-

tificantibus, pinnatis, angustioribus, laciniis integerrimis, confluentibus. *Linn. syst. veget.* 1293; *n.* 15, *sp. pl.* 1166; *n.* 16; *Fl. dan. tab.* 99.

*Strutiopteris spicant.* *Scop. fl. carn. sp.* 1258.

*Strutiopteris.* *Hall. hist.*, *n.* 1687.

*Lonchitis altera neotericorum.* *Clus. hist.*, 213, *p.* 21

*Lonchitis altera.* *Lobel, kruid-b.* 994.

*Lonchitis aspera.* *Dodon. kruid-b.* 766.

*Lonchitis minor.* *Bauh. pin.* 359.

België : *Gragt-varen.*

In sylvis *Berghem, Vorst, etc.* Non communis.

### 303. POLYPODIUM. Fructificationes per partem inferiorem frondis in globulos dispositæ.

678. *P. VULGARE.* Frondibus pinnatifidis, laciniis oblongis, subserratis, obtusis, radice squamatâ. *Linn. sp. pl.* 1085, *n.* 13; *Scop. fl. carn. sp.* 1266; *Blakw. herb. tab.* 215; *Gouan, hort. monsp.* 527; *Bauh. pin.* 359; *Tourn. inst.* 540.

*Polypodium foliis pinnatis, lanceolatis, radice squamatâ.* *Hall. hist.*, *n.* 1696.

*Polypodium (majus et minus).* *Dodon. kruid-b.* 761; *Lobel, kruid-b.* 992; *Bauh. hist.* 3, *fol.* 746; *Moris. hist.* 3, *fol.* 562; *Matthiol. in Diosc.* 410; *Dalech. hist.* 2, *fol.* 125.

België : *Boom-varen*; gallicè : *Polypode.*

Ad radices arborum; ad truncos, etc. Communis.

679. *P. FILIX-MAS.* Frondibus bipinnatis, pinnulis obtusis, crenulatis, stipite paleaceo. *Linn. sp. pl.* 1090, *n.* 37; *Scop. fl. carn. sp.* 1270; *Blakw. herb. tab.* 323; *Gouan, hort. monsp.* 528.

*Polypodium pinnis pinnatis, obtusis, dentatis.* *Hall. hist.*, *n.* 1701.

*Filix mas.* *Dodon. kruid-b.* 758; *Lobel, kruid-b.* 990; *Matthiol. in Diosc.* 409; *Dalech. hist.* 2, *fol.* 119; *Fusch. hist.* 594.

*Filix non ramosa dentata.* *Bauh. pin.* 358; *Tourn. hist.* 536.

België : *Varen-manneken*; gallicè : *Fougère mâle.*

Ad *Berghem, Vorst, Etterbeek, etc.* In sylvis et sepibus.

680. *P. FILIX-FEMINA.* Frondibus bipinnatis, pinnulis lanceolatis, pinnatifidis, acutis. *Linn. sp. pl.* 1090

- n.* 38; *Scop. fl. carn. sp.* 1268; *Blakw. herb. tab.* 325; *Gouan, hort. monsp.* 528.
- Polypodium pinnis pinnatis, pinnulis lanceolatis, semipinnatis, lobis acutè bisectis. Hall. hist., n.* 1704.
- Filix-femina. Dodon. kruid-b.* 758; *Lobel, kruid-b.* 990; *Matthiol. in Diosc.* 410; *Dalech. hist.* 2, fol. 119.
- Belgicè : *Varen-wyfsken*; gallicè : *Fougère femelle*.  
In sylvis *Linthout, Heder, Lorbeek, etc.*
681. *P. ACULEATUM.* Frondibus bipinnatis, pinnulis lunulatis, ciliato-dentatis, stipite strigoso. *Linn. sp. pl.* 1090, *n.* 39; *Scop. fl. carn. sp.* 1269; *Gouan, hort. monsp.* 528.
- Polypodium pinnis pinnatis, ciliatis, serratis, appendiculatis. Hall. hist., n.* 1712.
- Filix mas non ramosa, pinnulis latis, articulatis, spinosis. Moris. hist.* 3, fol. 580, tab. 3, fig. 15.
- Filix aculeata major. Bauh. pin.* 358, *prodr.* 151.
- Lonchitis aculeata major. Tourn. inst.* 538.
- Belgicè : *Scherpe Varen*; gallicè : *Fougère aiguë*.  
Ad *Jette*, sub sepibus; in sylva *Linthout*, versùs *Oudergem, etc.*
682. *P. FRAGILE.* Frondibus bipinnatis, pinnis remotis, pinnulis subrotundis, incisis. *Linn. sp. pl.* 1091, *n.* 44; *Scop. fl. carn. sp.* 1273; *Gouan, hort. monsp.* 528.
- Polypodium pinnis pinnatis, laxè divisis, pinnulis semipinnatis, lobulis subrotundis, dentatis. Hall. hist., n.* 1707.
- Filix pumila saxatilis, secunda. Clus. hist. rar.* 212, p. 2.
- Adiantum album folio Filicis, Bauh. hist.* 3, fol. 741.
- Dryopteris candida. Dodon. kruid-b.* 762.
- Adiantum album Plinii. Lobel, kruid-b.* 988.
- Belgicè : *Wit Eyken-varen*; gallicè : *Capillaire blanc*.  
Ad *Berghem*, vulgò in *de Bosch-straet*. *Caules basi rubent.*

---

MUSCI.

304. *LYCOPodium.* Capsulæ reniformes, bivalves, polyspermæ, elasticæ.
683. *L. CLAVATUM.* Foliis sparsis, filamentosis, spicis te-

- retibus, pedunculis geminis. *Linn. sp. pl.* 1101, n. 4;  
*Scop. fl. carn. sp.* 1278; *Blakw. herb. tab.* 535.
- Lycopodium* ramis prolixis, spicis petiolatis, gemillis;  
 foliis linearibus, pilo aristatis. *Hall. hist.*, n. 1722.
- Muscus squamosus repens vulgaris*. *Tourn. inst.* 553.
- Muscus terrestris clavatus*. *Bauh. pin.* 360.
- Muscus terrestris*. *Dodon. kruid-b.*, fol. 771.
- Muscus clavatus*. *Lobel, kruid-b.* 281, p. 2.
- Belgicè : *Wolfs-klauw*; gallicè : *Mousse-à-massue*.  
 Prope *Linkenbeek*, etc. Rarior.
684. *L. DENTICULATUM*. Foliis bifariis, superficialibus  
 imbricatis, surculis repentibus, capsulis sparsis.  
*Linn. sp. pl.* 1106, n. 23; *Gouan, hort. monsp.*  
 530.
- Lycopodium* caule plano, foliis supernè quaternis,  
 infernè binis, spicis obscure petiolatis. *Hall. hist.*,  
 n. 1718.
- Lycopodioides imbricatum repens*. *Dillen, hist. musc.*  
 462, tab. 66, fig. 1, A.
- Muscus denticulatus minor*. *Bauh. pin.* 360.
- Muscus terrestris denticulatus alter*. *Lobel, kruid-*  
*boek*, 280, p. 2.
- Muscus terrestris lusitanicus*. *Clus. hist. rar.* 249, p. 2;  
*Bauh. hist.* 3, fol. 765.
- Muscus terrestris minor alter*. *Dodon. kruid-b.* 772.
- Belgicè : *Kleyne Wolfs-klauw*.  
 In aridissimo monte non procul ab *het Rood-kruys*,  
 inter *Beersel* et *Alseberg*.
305. *SPHAGNUM*. Flos *masculus* clavatus, anthe-  
 ris planis; capsulæ in eâdem plantâ opercula-  
 tæ, sessiles, sine calyptrâ integrâ, ore lævi.
685. *S. PALUSTRE*. Ramis deflexis. *Linn. sp. pl.* 1106,  
 n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 1284; *Fl. dan. tab.* 474;  
*Gouan, hort. monsp.* 530.
- Sphagnum* cauliferum, ramis teretibus, pendulis. *Hall.*  
*hist.*, n. 1724.
- Sphagnum palustre molle*, deflexum, squamis cym-  
 biformibus. *Dillen, hist. musc. tab.* 32, fig. 1.
- Muscus palustris in ericetis nascens*. *Vaill. bot. par.*,  
 fol. 139, tab. 23, fig. 3.
- Belgicè : *Water-mos*.



In aquis mœniorum, paludosisque sylvaticis. Communis.

306. PHASCUM. Capsula ovata, calyptrâ munita, cum rudimento operculi persistente.

686. *P. CUSPIDATUM*. Caulescens, foliis ovatis, cuspidatis, patulis, summis erectis, conniventibus. *Linn. syst. veget.* 1323, n. 5; *Fl. dan. tab.* 249; *Schreb. de phasc.*, fol. 8, tab. 1, fig. 1, 2.

Sphagnum acaulon, foliis ovato-lanceolatis, pilo aristatis. *Hall. hist.*, n. 1726.

Sphagnum acaulon bulbiforme majus. *Dillen, hist. musc.* 251, tab. 32, fig. 11.

Muscus trichodes, acaulos minor, latifolius. *Vaill. bot. par.*, tab. 27, fig. 2.

In agris, hortis, juxta fossas, etc.

307. POLYTRICHUM. *Gemma* orbicularis, terminalis, capsula in aliâ plantâ, calyptrâ minuta, conica, æqualis.

687. *P. COMMUNE*. Surculo simplici prolifero, foliis lineari-lanceolatis, serrulatis, capsulis oblongis, tetraëdris, calyptris villosis. *Linn. sp. pl.* 1109, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 1289; *Blakw. herb. tab.* 375; *Gouan, hort. monsp.* 531.

Polytrichum aureum majus. *Bauh. pin.* 356.

Polytrichum Apuleji, majus quibusdam. *Bauh. hist.* 3, fol. 760.

Muscus capillaris major. *Dodon. kroyd-b.* 775.

Muscus coronatus major, pileolo villosa aureo. *Moris. hist.* 3, fol. 630.

Polytrichum vulgare, capsulis quadrangularibus, lucæ foliis serratis. *Dillen. hist. musc.* 420, tab. 45, fig. 1.

Belgicè : *Gulden Wederdood*; gallicè : *Perce-mousse*.

In uliginosis sylvaticis communis.

688. *P. JUNIPERINUM*. Surculo simplici prolifero, foliis lineari-lanceolatis, integerrimis, mucronatis, capsulis oblongis, tetraëdris, calyptris villosis. *Linn. syst. veget.* 1326, n. 3; *Fl. dan. tab.* 295.

Polytrichum quadrangulare, juniperi foliis breviori-

- bus et rigidioribus. *Dillen. hist. musc.* 424, *tab.* 54, *fig.* 2; *Hall. hist.*, n. 1835, *variet.* 3.
- Polytrichum aureum medium. *Bauh. pin.* 356.
- Muscus coronatus medius (et humilis). *Moris. hist.* 3, *fol.* 630, *tab.* 7, *fig.* 6, 8.
- Muscus capillaris minor. *Dodon. kruid-b.* 775.
- Belgicè : *Wederdood.*
- In locis sylvestribus vulgaris.
689. *P. PILIFERUM.* Surculo simplici, foliis lanceolatis, integerrimis, apice piliferis, capsulis oblongis, tetraëdricis, calyptris villosis. *Linn. syst. veget.* 1326, n. 4.
- Polytrichum quadrangulare minus, juniperi foliis pilosis. *Dillen. hist. musc.* 426, *tab.* 54, *fig.* 3.
- Polytrichum pilosum. *Necker, method. musc.* 123.
- Muscus medicus, foliis juniperinis, glaucis, non serratis, in longum et canescentem pilum desinentibus, capitulo tetragono, calyptrâ tomentosâ rubrâ. *Michel. gen. et sp.* 109, n. 2.
- Muscus capillaceus, stellatus, prolifer. *Vaill. bot. paris. tab.* 23, *fig.* 7.
- Muscus aureus capillaris minor. *Boerh. hort. lugd.* 22.
- Polytrichum aureum minus. *Bauh. pin.* 357.
- Belgicè : *Kleynen Wederdood.*
- In sylvâ Soniæ, prope den Dry-Borren, etc.
690. *P. UNDULATUM.* Surculo simplici, foliis lanceolatis, serratis, undulatis, capsulis cylindricis, acumine operculi longè producto, calyptris dimidiatis, glabris. *Linn. syst. veget.* 1326, n. 8.
- Bryum undulatum. *Linn. sp. pl.* 1117, n. 10; *Scop. fl. carn. sp.* 1301; *Fl. dan. tab.* 477; *Hedwig. crypt.* 2, *fol.* 46, *tab.* 16, 17.
- Bryum foliis lanceolatis, serratis, capsulis cylindricis inclinatis, aristatis. *Hall. hist.*, n. 1823.
- Muscus capillaceus minor, capitulo longiore falcato. *Vaill. bot. paris. tab.* 26, *fig.* 17.
- In sylvis *Vorst, Heder, etc.*
308. MNIMUM. *Gemma* orbicularis, rariùs capitata. Capsulæ ut plurimum in aliâ plantâ, calyptrâ munitæ.
691. *M. PELLUCIDUM.* Surculo simplici, foliis ovatis,

capsulis cylindricis. *Linn. sp. pl.* 1110, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 1293; *Fl. dan. tab.* 300; *Hedw. fund. musc. tab.* 7, fig. 32.

*Muscus coronatus minimus*, capillaceis foliis, capitulis oblongis. *Vaill. bot. par.* 130, tab. 24, fig. 7.

*Mnium caule simplicissimo*, foliis ovato-lanceolatis, setâ fungiferâ foliosâ. *Hall. hist.*, n. 1853, tab. 46, fig. 8.

*Mnium Serpilli foliis tenuibus pellucidis*. *Dillen. hist. musc.* 232, tab. 31, fig. 2.

In sylvis ad truncos putridos.

692. *M. PALUSTRE*. Surculo ramoso, dichotomo, foliis subulatis, acutis, carinatis, capsulis oblongis, operculis conicis. *Linn. sp. pl.* 1110, n. 3; *Scop. fl. carn. sp.* 1295.

*Mnium majus*, ramis longioribus bifurcatis. *Dillen, hist. musc.* 233, tab. 31, fig. 3.

*Muscus capillaceus*, palustris, flagellis longioribus bifurcatis. *Vaill. bot. par.* 135, tab. 24, fig. 1.

*Muscus palustris*, flagellis erectis, luteolis, rarò divisis, capitulis oblongis *Adianthi*. *Moris. hist.* 3, fol. 629, tab. 6, fig. 9.

In aquis mœniorum propè portam canalis, etc.

693. *M. CAPILLARE*. Capsulis pendulis, foliis ovatis, setiferis, carinatis, pedunculis longissimis. *Linn. syst. veget.* 1329, n. 23.

*Bryum capillare*. *Scop. fl. carn. sp.* 1311; *Linn. sp. pl.* 1121, n. 29; *Gouan, hort. monsp.* 531.

*Bryum foliis latiusculis*, congestis, capsulis longis nudentibus. *Dillen, hist. musc.* 398, tab. 50, fig. 67.

*Muscus capillaris*, foliis latiusculis, congestis, capitulis longis reflexis. *Moris. hist.* 3, fol. 629, tab. 6, fig. 19.

In muris humidis umbrosis, etc.

694. *M. GLAUCUM*. Surculo ramoso, foliis ovatis, acutis, imbricatis, capsulis oblongis, operculis acuminate, recurvis. *Linn. syst. veget.* 1328, n. 9.

*Bryum glaucum*. *Linn. sp. pl.* 1118, n. 11; *Scop. fl. carn. sp.* 1309.

*Bryum albidum*, glaucum, fragile, majus, foliis erectis, setis brevibus. *Dillen, hist. musc.* 362, tab. 46, fig. 20.

*Muscus trichodes*, montanus, albidus, fragilis. *Moris. hist.* 3, fol. 630, tab. 6, fig. 22; *Boerh. hort. lugd.*, fol. 22.

*Muscus erectus, capillaceus, densissimus, glauco folio. Vaill. bot. par. 131, tab. 26, fig. 13.*

*Hypnum caulibus erectis, teretibus, foliis imbricatis, fragilibus, capsulis imbricatis, aristatis. Hall. hist., n. 1785.*

*In montosis sylvæ Vorst, propè het Vosse-gat, etc.*

695. *M. CUSPIDATUM.* Capsulis nutantibus, pedunculis aggregatis, foliis ovatis, acutis, serratis. *Linn. syst. veget. 1330, n. 26.*

*Mnium foliis ovato-lanceolatis, confertis, capsulis nutantibus, obtusis. Hall. hist., n. 1841.*

*Muscus stellatus polycephalus, foliis subrotundis, tenuissimè serratis. Michel, gen. et sp. 110, n. 19.*

*Mnium serpillifolium. Scop. fl. carn. sp. 1296; variet. 2.*

*Bryum pendulum, foliis variis, pellucidis, capsulis ovatis. Dillen, hist. musc. 413, tab. 53, fig. 79.*

*Muscus palustris, foliis subrotundis. Vaill. bot. par. tab. 26, fig. 18.*

*In sylvarum locis aquosis communis.*

696. *M. UNDULATUM.* Capsulis nutantibus, pedunculis aggregatis, foliis oblongis, undulatis, serrulatis. *Linn. syst. veget. 1330, n. 30.*

*Mnium serpillifolium. Scop. fl. carn. sp. 1296, variet. 3.*

*Mnium foliis cordatis, ellipticis, setis aggregatis, capsulis ovatis, obtusis, pendulis. Hall. hist., n. 1844.*

*Bryum dendroïdes, polycephalon, Phillitidis folio undulato, pellucido, capsulis ovatis, pendulis. Dillen, hist. musc. 410, tab. 53, fig. 76.*

*Muscus roseus, polycephalus, Linariæ foliis undulatis. Michel, gen. et sp. 108, tab. 59, fig. 5.*

*In sylvis ad truncos arborum juxta rivos, etc.*

697. *M. PUNCTATUM.* Capsulis cernuis, pedunculis aggregatis, foliis obovatis, integerrimis, obtusis, punctatis. *Linn. syst. veget. 1330, n. 25.*

*Mnium foliis ovatis, integerrimis, capsulis pendulis, ovatis, aristatis. Hall. hist., n. 1845.*

*Mnium serpillifolium. Scop. fl. carn. sp. 1296, variet. 1.*

*Bryum pendulum, Serpilli folio rotundiore, pellucido, capsulis ovatis. Dillen, hist. musc. 416, tab. 53, fig. 81.*

*Muscus polytrichoïdes palustris, major, serpilli latioris folio, pellucido. Moris. hist. 3, fol. 627, tab. 6, fig. 39—40.*

In umbrosis humidis, ad truncos putridos, etc.

309. **BRIUM.** *Gemmæ sæpè axillares, nunc in eâdem, nunc in aliâ plantâ, cum capsulis calyptrâ munitis, pedunculo terminali ex tuberculo exeunti insidentibus.*

698. **B. EXTINCTORIUM.** Surculo simplici, foliis lanceolatis, capsulis cylindricis, calyptris campanulatis, margine integris, capsulas superantibus. *Linn. syst. veget. 1332, n. 7; Hedwig, crypt. 2, fol. 49, tab. 18.*

*Bryum caule brevissimo, calyptrâ cylindricâ, longe aristatâ. Hall. hist., n. 1829.*

*Bryum Calyptrâ extinctorii formâ, minus. Dillen. hist. musc. 349, tab. 45, fig. 8.*

*Muscus coronatus, humilis, tenuifolius, pileolo magno, acuto, infrâ aperto, extinctorium referente. Moris. hist. 3, fol. 630, tab. 7, fig. 12; Boerh. hort. lugd. 21.*

Propè *Elsen*, ad marginem viæ quâ *Boondael* itur.

699. **B. MURALE.** Surculo brevissimo, subdiviso, foliis ovatis, acutis, apice piliferis, capsulis oblongis, operculis conicis, acutis. *Linn. sp. pl. 1117, n. 8; Scop. fl. carn. sp. 1299.*

*Bryum cauliculis brevissimis, foliis ovato-lanceolatis, patulis, pilo terminatis, capsulis aristatis. Hall. hist., n. 1825.*

*Bryum tegulare humile, pilosum et incanum. Dillen, hist. musc. 355, tab. 45, fig. 14.*

*Muscus capillaris minor, capitulis erectis, vulgatissimus. Michel. gen. et sp. pl. 108, tab. 59, fig. 7.*

*Muscus omnium vulgatissimus. Vaill. bot. par. tab. 24, fig. 14—15, tab. 25, fig. 4.*

In tectis et muris antiquis ubiquè.

700. **B. PYRIFORME.** Foliis explanatis, oblongis, acutis, capsulis pyriformibus. *Linn. sp. pl. 1116, n. 4; Scop. fl. carn. sp. 1300; Fl. dan. tab. 537, fig. 1.*

*Bryum caule brevissimo, foliis ovato-lanceolatis, capsulis erectis, ovatis, operculo brevi. Hall. hist., n. 1832.*

*Bryum serpillifolium, pellucidum, capsulis pyriformibus. Dillen, hist. musc. 345, tab. 44, fig. 6.*

*Muscus capillaceus, minimus, capitulis pyriformibus, turgidis. Vaill. bot. par. 129, tab. 29, fig. 6.*

*Muscus coronatus, humilis, stellaris, foliis latiusculis, capitulis pyriformibus, erectis, turgidiusculis. Moris. hist. 3, fol. 631, tab. 7, fig. 16.*

Ad margines pratorum *Anderlegt, Curegem, etc.*  
Non communis.

701. *B. TRUNCATULUM.* Foliis explanatis, mucronatis, capsulis truncatis. *Hedw. crypt. 1, fol. 13, tab. 5; Scop. fl. carn. sp. 1298.*

*Bryum foliis ovato-lanceolatis, capsulis erectis, ovatis, aristatis. Hall. hist., n. 1833.*

*Bryum exiguum, creberrimis capsulis rufis. Dillen, hist. musc. 347, tab. 45, fig. 7.*

*Muscus capillaceus omnium minimus. Vaill. bot. par. tab. 26, fig. 2.*

*Muscus coronatus minimus, foliis et capitulis oblongis, in pediculis brevissimis. Moris. hist. 3, fol. 631, tab. 7, fig. 18; Boerh. hort. lugd., fol. 22.*

Ad *Ever, Haren, etc.*, in muris hortorum; juxta fossas, etc.

702. *B. VIRIDULUM.* Capsulis ovatis, rectis, foliis lanceolatis, acuminatis, imbricato-patulis. *Linn. sp. pl. 1119, n. 19; Scop. fl. carn. sp. 1297.*

*Bryum foliis capillaribus, capsulis ovatis, aristatis. Hall. hist., n. 1809.*

*Bryum capillaceum, breve, pallide et læte virens, capsulis ovatis. Dillen, hist. musc. 380, tab. 48, fig. 43.*

*Muscus capillaceus, omnium minimus, foliolis longioribus et angustioribus. Vaill. bot. par. 130, tab. 29, fig. 5.*

Ad radices arborum in herbosis humidis.

703. *B. SUBULATUM.* Surculo brevissimo, simplici, foliis ovatis, obtusiusculis, capsulis cylindricis, operculo acuto. *Linn. syst. veget. 1333, n. 17; Hedw. fund. musc. frond. 2, tab. 8, fig. 38—40; Scop. fl. carn. sp. 1304.*

*Bryum cauliculo brevissimo, foliis lanceolatis, capsulis longissimis, operculo prælongo. Hall. hist., n. 1827.*

*Bryum capsulis longis subulatis. Dillen, hist. musc. 350, tab. 45, fig. 10.*

Muscus capillaris, cauliculis longissimis et acutissimis. *Moris. hist.* 3, fol. 631, tab. 7, fig. 13.

In muris et aggeribus humentibus.

704. *B. RURALE*. Surculo ramoso, foliis reflexis, obovatis, obtusis, apice piliferis; capsulis cylindricis, operculis conicis, acutis. *Linn. syst. veget.* 1335, n. 36; *Hedw. fund. musc. frond.* 1, tab. 6, fig. 28, 32; *Scop. fl. carn. sp.* 1308.

*Bryum rurale*, unguiculatum, hirsutum, clatius et ramosius. *Dillen, hist. musc.* 352, tab. 45, fig. 12.

*Hypnum* caulibus erectis, foliis lanceolatis, pilo fluitante terminatis, capsulis erectis, longè rostratis. *Hall. hist.*, n. 1789.

Muscus erectus, hirsutus, capitulis longis, acutis, unguiculis avicularum similibus, vulgatissimus. *Moris. hist.* 3, fol. 628, tab. 6, fig. 12.

In tectis stramineis rusticorum, muris, campis, etc.

705. *B. TECTORUM*. Capsulis subsessilibus, calyptris villosis, conicis, setis brevissimis, axillaribus. *Linn. syst. veget.* 1335, n. 34; *Hedw. crypt.* 4, tab. 37.

*Bryum* setis brevissimis, alaribus, calyptris villosis, conicis. *Hall. hist.*, n. 1799, variet. 1.

*Polytrichum Bryi* ruralis facie, capsulis sessilibus, conicis. *Dillen, hist. musc.* 431, tab. 55, fig. 9.

Muscus humilis tectorum subfuscus, capitulis brevibus, pileolis erectis, pedunculis curtis. *Moris. hist.* 3, fol. 629, tab. 6, fig. 13.

In humentibus umbrosis ad truncos arborum.

310. *HYPNUM*. *Gemmæ* ut plurimum in aliâ plantâ; capsulæ pedunculo laterali ex perichaetio prodeuntî insidentes.

706. *H. SCIUROIDES*. Surculo subramoso, foliis imbricatis, ovato-lanceolatis, apice piliferis, capsulis oblongis, operculo conico. *Linn. syst. veget.* 1339, n. 11; *Scop. fl. carn. sp.* 1334.

*Hypnum* caulibus teretibus, ramosis, foliis appressis, pilo aristatis, operculis conicis. *Hall. hist.*, n. 1749.

*Hypnum* arboreum sciuroïdes. *Dillen, hist. musc.* 319, tab. 41, fig. 54.

Muscus repens, serici modo lucens, viticulis longioribus, erectis. *Moris. hist.* 3, fol. 620, tab. 5, fig. 27.

*Muscus arboreus, splendens, myosuroides. Vaill. bot. par., tab. 27, fig. 12.*

Ad arborum truncos communis.

707. *H. SERICEUM*. Surculo ramoso, repente, foliis oblongis, setâ terminatis, capsulis erectis, cylindricis, operculis acuminatis, recurvis. *Linn. syst. veget. 1340, n. 17; Scop. fl. carn. sp. 1335; Gouan, fl. monsp. 451.*

Hypnum vulgare sericeum, recurvum, capsulis erectis, cuspidatis. *Dillen, hist. musc. 323, tab. 42, fig. 59.*

Hypnum ramis teretibus, foliis pilo præpilatis, capsulis cylindricis, erectis, aristatis. *Hall. hist., n. 1750.*

*Muscus arboreus, splendens, sericeus. Vaill. bot. par. 132, tab. 27, fig. 3.*

In pratis campisque humidis; ad radices arborum, etc.

708. *H. TRIQUETRUM*. Surculis vagis, recurvis, foliis ovatis, recurvatis, patulis. *Linn. syst. veget. 1342, n. 39; Scop. fl. carn. sp. 1329; Hedw. fund. musc. frond. 1, tab. 7.*

Hypnum vulgare triangulum, maximum et pallidum. *Dillen, hist. musc. 293, tab. 38, fig. 28.*

Hypnum foliis hispidis, ovato-lanceolatis, aristatis. *Hall. hist., n. 1729.*

*Muscus squamosus major sive vulgaris. Tourn. inst. 553.*

*Muscus terrestris vulgaris. Lobel, kruyd-b. 279, p. 2.*

*Muscus palustris. Dodon. kruyd-b. 771.*

*Muscus terrestris et hortensis. Bauh. hist. 3, fol. 764.*

Belgicè : *Aerd-mos*; gallicè : *Mousse de terre.*

In sylvis pratisque macris communis.

709. *H. FILICINUM*. Surculo simpliciter pinnato, foliis oblongis, acuminatis, reflexis, secundis, capsulis subcylindricis, operculis convexis. *Linn. syst. veget. 1343, n. 44; Scop. fl. carn. sp. 1321; Gouan, fl. monsp. 450.*

Hypnum caulibus pinnatis, pinnis distantibus, alternè longioribus, ex apice confertis, foliis circinnatis. *Hall. hist., n. 1766.*

Hypnum repens filicinum crispum. *Dillen, hist. musc. 282, tab. 36, fig. 19.*

*Muscus filicinus palustris. Vaill. bot. par. 138, tab. 29, fig. 9.*



In sylva *Vorst*, etc., circa scaturigines et aquæductus:

710. *H. PROLIFERUM*. Surculis proliferis, plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. *Linn. sp. pl.* 1125, n. 15; *Gouan. fl. monsp.* 450.

Hypnum caule suberecto, flexuoso, ramis teretibus, pinnatis, pinnulis pinnatis, operculis aristatis. *Hall. hist.*, n. 1765.

Hypnum filicinum Tamarisci foliis majoribus, splendentibus. *Dillen, hist. musc.* 274, tab. 35, fig. 13.

Muscus filicinus major. *Bauh. pin.* 360; *Tourn. inst.* 556, tab. 326, fig. C; *Vaill. bot. par.*, tab. 29, fig. 1; *Moris., hist.* 3, fol. 625, tab. 5, fig. 20.

In pratis sylvosus humidisque communis.

711. *H. PARIETINUM*. Surculis plano-pinnatis, continuatis, pedunculis aggregatis. *Linn. syst. veget.* 1343, n. 47; *Hedw. fund. musc. frond.* 2, tab. 4, fig. 4.

Hypnum ramis teretibus, pinnatis, pinnulis pinnatis, foliis adpressis. *Hall. hist.*, n. 1764.

Hypnum filicinum Tamarisci foliis minoribus, non splendentibus. *Dillen, hist. musc.* 276, tab. 35, fig. 14.

Muscus filicinus minor. *Bauh. prodr.* 151; *Moris. hist.* 3, fol. 625, tab. 23, fig. 9; *Vaill. bot. par.* 140, tab. 23, fig. 9.

Hypnum proliferum. *Scop. fl. carn. sp.* 1332.

In sylvis ad arborum truncos; ad muros humidos, etc.

712. *H. PURUM*. Surculis pinnato-sparsis, subulatis, foliis ovalis, obtusis, subulatis. *Linn. syst. veget.* 1345, n. 67; *Scop. fl. carn. sp.* 1326; *Fl. dan. tab.* 706, fig. 2.

Hypnum ramis teretibus, foliis ovato-lanceolatis, setis prælongis, capsulis inclinatis, aristatis. *Hall. hist.*, n. 1743.

Hypnum cupressiforme vulgare, foliis obtusis. *Dillen, hist. musc.* 309, tab. 40, fig. 45.

Muscus squamosus, cupressiformis. *Vaill. bot. par.* 138, tab. 28, fig. 3; *Tourn. inst.* 554; *Bauh. pin.* 361, *prodr.* 152.

In pascuis, sylvis, etc. Communis.

713. *H. CUSPIDATUM*. Surculis pinnato-ramosis, apice longè cuspidatis, foliis oblongo-acuminatis, capsulis cylindricis, operculis conicis. *Linn. syst. veget.* 1345, n. 71.

Hypnum foliis ovato-lanceolatis, ramis teretibus, supremis conicis, acuminatis. *Hall. hist.*, n. 1741.

Hypnum palustre, extremitatibus cuspidatis et pungentibus. *Dillen, hist. musc.* 300, tab. 39, fig. 34.

Muscus squamosus palustris, foliis flagellibusque rigidiusculis, incurvis. *Vaill. bot. par.* 138, tab. 23, fig. 11.

In locis paludosis. Communis.

ALGÆ.

311. JUNGERMANNIA. *Scyphuli* vesiculiferi; *squamulæ* gemmiferæ laterales aut *capitula* pulverulenta; *capsula* pedunculata, nuda, quadrivalvis, seminibus subrotundis.

714. *J. EPIPHYLLA*. Acaulis, folio frondi innato. *Linn. sp. pl.* 1135, n. 23; *Scop. fl. carn. sp.* 1351; *Fl. dan. tab.* 359.

Jungermannia fronde foliaceâ, obtusè lobatâ, ex medio florifera *Hall. hist.*, n. 1883.

Marsilea major, atro-virens, floribus albicantibus, è foliorum medio egredientibus. *Michel, gen. et sp. tab.* 74, fig. 1.

Lichenastrum capitulis rotundis, è foliorum medio enascentibus. *Dillen. hist. musc.* 508, tab. 74, fig. 41.

Lichen caulifer petræus, cauliculo calceato. *Moris. hist.* 3, fol. 623.

Lichen petræus cauliculo calceato. *Bauh. pin.* 362  
Juxta rivulos in locis opacis communis.

312. MARCHANTIA. *Capsula* sessilis campanulata; *gemma* peltata, pedunculata.

715. *M. POLYMORPHA*. Surculis obtuse-lobatis, capsulis sternatim decemfidis. *Linn. syst. veget.* 1353, n. 1; *Gouan, fl. monsp.* 453.

Marchantia capitulo stellato, radiis teretibus. *Michel, gen. et sp.* 2, tab. 1, fig. 1—2.

Marchantia stellata. *Scop. fl. carn. sp.* 1354.

Lichen petræus latifolius (et Lichen petræus stellatus). *Bauh. pin.* 362,

Lichen seu Hepatica fontana. *Bauh. hist.* 3, fol. 758  
 Lichen primus et secundus. *Lobel, kruid-b.* 282,  
 p. 2, *Boerh. hort. lugd.* 17, n. 11—12.

Hepatica petræa. *Dodon. kruid-b.*, fol. 773.

Belgicè : *Steen-lever-kruid* ; gallicè : *hépatique des fontaines*.

In umbrosis frigidis, juxta rivulos, etc.

716. *M. UMBELLATA*. Capsulis multilobis, pedunculo tetraëdro. *Linn. syst. veget.* 1353, n. 2; *Dillen., hist. musc. tab.* 76, fig. 6, *C. D.*, et *tab.* 77, fig. 7, *D.*; *Scop. fl. carn. sp.* 1355.

*Marchantia capitulo non dissecto. Michel, gen. et sp.* 2, *tab.* 1, fig. 5.

Lichen petræus umbellatus. *Bauh. pin.* 362.

Lichen tertius. *Lobel, kruid-b.* 282, p. 2; *Boerh. hort. lugd.* 17, n. 13.

Belgicè : *Water-lever-kruid*.

Circa fontes et rivulos sylvarum, etc. Communis.

717. *M. CONICA*. Surculis dichotomis, sinuatis, capsulâ conicâ, subtus subquineloculari. *Linn. syst. veget.* 1354, n. 9; *Scop. fl. carn. sp.* 1358; *Gouan, fl. monsp.* 453; *Fl. dan. tab.* 274.

*Marchantia verrucis asperis, capitulis conicis. Hall. hist.*, n. 1889.

Hepatica vulgaris major, sive officinarum Italiæ. *Michel, gen. et sp.* 3, *tab.* 2, fig. 1.

Lichen petræus, caliculo pileolum sustinente, *Bauh. pin.* 362.

Lichen vulgaris major pileatus, verrucosus, *Dillen., hist. musc.* 516, *tab.* 75, fig. 1.

Hepatica reticulata et verrucosa, *Vaill. bot. par.* 97, *tab.* 33, fig. 8.

Ad *Berghem*, vulgò in het *Broek*, et alibi juxta aquas in locis opacis.

313. LICHEN. *Gemmæ*, vel pulverem subtilissimum inorganicum referentes, vel receptaculis elevatis, nitidis, farinæ, crustæ, vel frondis immixtis contentæ.

718. *L. JOLITHUS*, sanguineus, saxis innascens, violas olens. *Linn. syst. veget.* 1356, n. 3.

- Lichen crustaceus, Iridis odore, ruberrimus. *Hall. hist.*, n. 2090.
- Byssus Jolithus. *Linn. sp. pl.* 1169, n. 8; *Fl. dan. tab.* 889, fig. 1.
- Byssus germanica, minima, saxatilis, violæ odorem spirans. *Michel, gen. et sp.* 210, tab. 89, fig. 3.
- Ad muros antiquos humidos, in locis frigidis et opacis.
719. *L. FLAVUS*. Pulverulentus flavus, lignis adnascens. *Linn. syst. veget.* 1356, n. 4.
- Lichen crustâ tenuissimâ flavâ *Hall. hist.*, n. 2089.
- Lichen crustaceus, arboribus adnascens, tenuissimus, pulverulentus, pallidè luteus, seu ochroleucus. *Michel, gen. et sp.* 100, n. 70.
- Byssus pulverulenta, flava, lignis adnascens. *Dillen, hist. musc.* 3, tab. 1, fig. 4.
- Byssus candelaris. *Linn. sp. pl.* 1169, n. 9; *Scop. fl. carn. sp.* 1446.
- In arborum corticibus; parietibus, tectis antiquis, etc.
720. *L. INCANUS*. Pulverulentus, incanus, globulis rotundatis. *Linn. syst. veget.* 1356, n. 6; *syst. nat.* 3, fol. 721.
- Lichen farinosus mollis, albicans; globis difformibus. *Hall. hist.*, n. 2094.
- Lichen pulverulentus, albus, globulis rotundatis. *Schreb. spicil.* 139.
- Lichen farinaceus albicans. *Neck. meth. musc.* 112.
- Byssus incana. *Linn. sp. pl.* 1169, n. 11; *Scop. fl. carn. sp.* 1443; *Dillen, hist. musc.* 3, tab. 1, fig. 3.
- Belgicè : *Stof*.
- Juxta vias publicas, ad latera fossarum, etc. Communis.
721. *L. BOTRYOÏDES*. Pulverulentus viridis. *Linn. syst. veget.* 1356, n. 7; *syst. nat.* 3, fol. 721.
- Lichen farinosus viridis. *Neck. meth. musc.* 112.
- Lichen byssinus. *Scop. fl. carn. sp.* 1373, variet. 6.
- Byssus botryoïdes saturatè virens. *Raij. angl.* 3, fol. 5, 6; *Dillen, hist. musc.* 3, tab. 1, fig. 5.
- Byssus botryoïdes. *Fl. dan. tab.* 840, fig. 3.
- Belgicè : *Groensel*.
- Ad cortices arborum in solo humido et umbroso.
722. *L. ALBUS*. Pulverulento-crustaceus, albissimus. *Linn. syst. veget.* 1356; n. 14, *syst. nat.* 3, fol. 721.
- Lichen farinaceus, mollis, albus, globulis sphæricis. *Hall. hist.*, n. 2093.

Lichen crustaceus, saxatilis, farinaceus, albus, globulis minutissimis undiquè refertus. *Michel, gen.* 99, n. 56.

Byssus lactea. *Linn. sp. pl.* 1169, n. 12; *Scop. fl. carn. sp.* 1444; *Fl. dan.*, tab. 840, fig. 4.

Byssus candidissima, calcis instar muscos vestiens. *Dillen, hist. musc.* 2, tab. 1, fig. 2.

Juxta fossulas, vias, etc., in solo humido glareoso.

723. *L. FAGINEUS*. Leprosus, albus, tuberculis albis farinaceis. *Linn. sp. pl.* 1141, n. 10; *Scop. fl. carn. sp.* 1371.

Lichen verrucosus, crustaceus, albus, orbiculis villosis, concoloribus. *Hall. hist.*, n. 2086.

Lichen crustaceus, arboribus adnascens, farinaceus, albus, superficie in acetabulis pulverulentis veluti efflorescente. *Michel, gen. et sp.* 99, n. 54, tab. 53, fig. 1.

Lichnoïdes candidum et farinaceum, scutellis ferè planis. *Dillen, hist., musc.* 131, tab. 18, fig. 11.

Ad truncos arborum præcipuè Fagorum.

724. *L. CANDELARIUS*. Crustaceus luteus, junior pulverulentus, scutellatus, ætate subfoliaceus, tuberculatus. *Linn. syst. veget.* 1361, n. 79; *Scop. fl. carn. sp.* 1378.

Lichen fronde laciniatâ, rotunde lobatâ, flavâ, concolore. *Hall. hist.*, n. 2023.

Lichen crustaceus saxatilis, crustâ tenuiore luteâ. *Michel, gen. et sp.* 97, n. 28.

Lichenoïdes crustosum, orbiculis et scutellis flavis. *Dillen, hist. musc.* 136; tab. 18, fig. 18.

Ad truncos Quercûs, etc.

725. *L. PARIETINUS*. Imbricatus, foliolis crispis, fulvis, concoloribus. *Linn. syst. veget.* 1368, n. 159; *Scop. fl. carn. sp.* 1400.

Lichen fronde rugosâ, rotundè lobatâ, flavâ, concolore. *Hall. hist.*, n. 2021.

Lichenoïdes vulgare sinuosum, foliis et scutellis luteis. *Dillen, hist. musc.* 180, tab. 24, fig. 76, C.

Musco-fungus lichenoïdes, minor, vulgatissimus, flavus. *Moris. hist.* 3, fol. 634, tab. 7, fig. 7.

Ad muros, ligna, truncos arborum, etc.

726. *L. CILIARIS*. Foliaceus, erectiusculus, laciniis linearibus ciliatis; scutellis pedunculatis, crenatis. *Linn.*

*syst. veget.* 1369, n. 178; *Scop. fl. carn. sp.* 1388;

*Fl. dan. tab.* 711.

Lichen corniculatus, planus, ramulis capillaribus, scutellis petiolatis. *Hall. hist.*, n. 1980.

Lichen cinereus, arboreus, marginibus pilosis, major. *Vaill. bot. par.* 115, tab. 20, fig. 4.

Lichenoides hispidum majus et rigidius, scutellis nigris. *Dillen, hist. musc.* 150, tab. 20, fig. 45.

Musco-fungus arboreus, cinereus, scutellatus, marginibus pilosis. *Moris. hist.* 3, fol. 634, tab. 7, fig. 6.

Ad truncos arborum senescentium, etc.

727. *L. PULMONARIUS*. Foliaceus, laciniatus, repens, sæpè reticulato-lacunosus, subtùs fusco-tomentosus, peltis marginalibus. *Linn. syst. veget.* 1370, n. 183, *Scop. fl. carn. sp.* 1392; *Blakw. herb. tab.* 353.

Lichen lacunatus, infernè gibbosus, reticulato-farinosus, scutellis lateralibus. *Hall. hist.*, n. 1986.

Lichen arboreus sive Pulmonaria arborea. *Bauh. hist.* 3, fol. 759.

Muscus pulmonarius. *Lobel, kruyd-b.* 284, p. 2; *Bauh. pin.* 361.

Pulmonaria. *Dodon. kruyd-b.* 774; *Fusch. hist.* 631.

Belgicè: *Longer-kruyd*; gallicè: *Pulmonaire de Chêne*.

Ad truncos Quercûs, etc.; in sylvis Berghem, Soniæ, etc.

728. *L. FRAXINEUS*. Foliaceus, erectus, oblongus, lanceolatus, sublaciniatus, lacunosus, glaber, scutellis subpedunculatis. *Linn. syst. veget.* 1370, n. 193; *Scop. fl. carn. sp.* 1383.

Lichen utrinquè lacunatus, fronde latissimâ, scutellis creberrimis. *Hall. hist.*, n. 1985.

Lichen pulmonarius, cinereus, mollior, in amplas lacinias divisus. *Tourn. inst.* 549, tab. 325, fig. A, B.

Lichen pulmonarius rufescens, durior, in amplas lacinias divisus. *Michel. gen. et sp.* 74, tab. 36, fig. 1.

Ad truncos Quercûs, etc. In *Fraxino* rarior.

729. *L. PRUNASTRI*. Foliaceus, erectiusculus, lacunosus, subtùs tomentosus, albus. *Linn. syst. veget.* 1371, n. 195; *Scop. fl. carn. sp.* 1384; *Gouan, fl. monsp.* 454.

Lichen complanatus, utrinquè lacunosus, undiquè farinosus. *Hall. hist.*, n. 1984.

Lichen pulmonarius, mollior, dichotomus, supernè cinereus. *Michel. gen. et sp.* 75, tab. 36, fig. 3.

- Lichen cinereus vulgatissimus, Cornua Damæ referens: *Vaill. bot. par.* 115, *tab.* 20, *fig.* 7, 11, 12.
- Lichenoides cornutum, bronchiale, molle, subtus incanum. *Dillen, hist. musc.* 160, *tab.* 21, *fig.* 54, 55.
- Ad truncos Fagorum, etc., etc.
730. *L. CANINUS*. Coriaceus, repens, lobatus, obtusus, planus, subtus venosus, villosus, peltâ marginali adscendente. *Linn. syst. veget.* 1373, *n.* 232; *Scop. fl. carn.* 1389; *Blakw. herb. tab.* 336.
- Lichen fronde subrotundo-lobatâ, infernè reticulatâ, peltis convexo-concavis. *Hall. hist.*, *n.* 1988.
- Lichen pulmonarius saxatilis digitatus. *Vaill. bot. par.* 116, *tab.* 21, *fig.* 16.
- Lichen maritimus. *Lobel, kroyd-b.* 283, *p.* 2.
- Musco-fungus terrestris, latifolius, cinereus, Hepaticæ facie. *Moris. hist.* 3, *fol.* 632, *tab.* 7, *fig.* 1.
- Belgicè : *Honds-mos*; gallicè : *Mousse des chiens*.
- In sylvis, ad margines scrobiculorum communis.
731. *L. PIXIDATUS*. Scyphifer, simplex, crenulatus tuberculis fuscis. *Linn. syst. veget.* 1375, *n.* 261; *Gouan, fl. monsp.* 455.
- Lichen squamosus. *Scop. fl. carn. sp.* 1381, *variet.* 8, 9.
- Lichen prolifer. *Syst. nat.* 4, *fol.* 552; *Vaill. bot. par.* 115, *tab.*, 21, *fig.* 5, 9.
- Lichen pixidatus major. *Tourn. inst.* 549, *tab.* 325, *fig.* D; *Michel. gen. et sp.* 82, *tab.* 41, *fig.* 2, 4.
- Coralloïdes scyphiforme tuberculis fuscis. *Dillen. hist. musc.*, *tab.* 14, *fig.* 6, B, C, D.
- Lichen scyphiger, fungis infundibulorum fuscis. *Hall. hist.*, *n.* 1919.
- In sylvis prope *Vorst*. Ad radices arborum.
732. *L. FIMBRIATUS*. Scyphifer, simplex, denticulatus, stipite cylindrico. *Linn. syst. veget.* 1375, *n.* 262; *Gouan, fl. monsp.* 455.
- Lichen scyphiger, infundibulis serratis. *Hall. hist.*, *n.* 1915, 1916.
- Lichen squamosus. *Scop. fl. carn.* 1381, *variet.* 7.
- Muscus pixidatus minor. *Michel. gen. et sp.* 83, *tab.* 14, *fig.* 45; *Vaill. bot. par.* *tab.* 21, *fig.* 6; *Tourn. inst.* 549; *Boerh. hort. lugd.* 18.
- Coralloïdes scyphiforme, gracile, marginibus serratis. *Dillen, hist. musc.* 84, *tab.* 14, *fig.* 8, 9.
- In sylvis *Vorst*, *Heder*, etc. Præcedenti communior.

733. *L. SIMPLEX*. Scyphifer simplicissimus, scyphulis conicis, integerrimis. *Linn. syst. veget.* 1375, n. 258.

Lichen scypho infundibuliformi simpliei. *Hall. hist.*, n. 1912.

Lichen squamosus. *Scop. fl. carn. sp.* 1381, variet. 6.

Muscus terrestris pixidatus alabastriculos imitans. *Labell, kruyd-b.* 300, p. 2.

Muscus pixoides saxatilis. *Bauh. pin.* 361.

Musco-fungus pixidatus saxatilis. *Moris. hist.* 3, fol. 632.

Belgicè : *Pottekens-mos*.

Inveni in sylvâ Soniæ, cùm per *Stokkel* ad *Ter-vueren* irem. *Rarior*.

734. *L. UNCIALIS*. Fruticulosus, perforatus, ramulis brevissimis acutis. *Linn. syst. veget.* 1376, n. 277.

Lichen fruticosus, lævis, perforatus, cauliculis palmatis, brevissimis. *Hall. hist.*, n. 1960, 1961.

Coralloïdes perforatum, minus, molle et tenue. *Dillen, hist. musc.* 99, tab. 16, fig. 21, 22.

Lichen squamosus. *Scop. fl. carn. sp.* 1381, variet. 18.

Coralloïdes aspera, corniculis tenuioribus, bifurcatis. *Vaill. bot. par. tab.* 7, fig. 7.

Musco-fungus montanus, corniculatus, minor. *Moris. hist.* 3, fol. 632.

Muscus corniculatus. *Bauh. hist.* 3, fol. 767.

In sylvis prope *Vorst*, *Linkenbeek*, etc.

314. *CONFERVA*. Fibræ simplices aut ramosæ intra quas *Gemmæ* globulosæ.

735. *C. RIVULARIS*. Filamentis simplicissimis, longissimis. *Linn. syst. veget.* 1392, n. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 1455; *Hall. hist.*, n. 2115; *Fl. dan. tab.* 881; *Gouan, fl. monsp.* 459.

Conferva fluviatilis sericea, vulgaris et fluitans. *Dillen, hist. musc.* 12, tab. 2, fig. 2.

Byssus palustris confervoïdes non ramosa, viridis, sericum referens, filamentis longis, tenuissimis. *Michel, gen. et sp.* 210, tab. 89, fig. 7.

In aquis fluentibus.

736. *C. BULLOSA*. Filamentis æqualibus, ramosis, bullas aëreas includentibus. *Linn. syst. veget.* 1393, n. 17; *Scop. fl. carn. sp.* 1437; *Gouan, fl. monsp.* 460.



Conferva pilis tenerrimis, vellere gossypiaceo. *Hall. hist.*, n. 2120.

Conferva palustris bombycina. *Dillen, hist. musc.* 18, tab. 3, fig. 11.

Alga bombycina. *Bauh. pin.* 363.

Belgicè : *Blaeskens-mos*; gallicè : *Fervale à bulles*.  
In aquis stagnantibus communis.

737. *C. CANALICULARIS*. Filamentis æqualibus, basin versus ramosioribus. *Linn. syst. veget.* 1393, n. 18.

Conferva filamentis tenuibus, ramosis, intricatis, fuscis. *Hall. hist.*, n. 2118.

Conferva rivulorum capillacea, ramulis densissimè congestis. *Dillen, hist. musc.* 21, tab. 4, fig. 15.

Conferva densissimè congesta, filamentis basin versus ramosioribus. *Neck. meth. musc.* 5.

Alga in tubulis aquam fontanam ducentibus. *Bauh. pinn.* 364.

In aquis Sennæ; in rivis, etc.

738. *C. GELATINOSA*. Filis ramosis, moniliformibus, articulis globosis, gelatinosis. *Linn. syst. veget.* 1394, n. 37.

Conferva gelatinosa, globulis punctatis, concatenulatis. *Hall. hist.*, n. 2124.

Conferva fontana, nodosa, spermatis ranarum instar lubrica. *Dillen, hist. musc.* 36, 37, tab. 7, fig. 42, 43; *ejusd.* 38, 39, tab. 7, fig. 44—46.

Corallina pinguis, ramosa, viridis. *Vaill. bot. par.* 40, tab. 7, fig. 6.

In aquis limpidissimis.

739. *C. RETICULATA*. Filamentis æqualibus, reticulato-coadunatis. *Linn. syst. veget.* 1394, n. 32; *Dillen, hist. musc.* 20, tab. 4, fig. 14; *Hall. hist.*, n. 2119.

Conferva reticulata crispa. *Moris. hist.* 3, fol. 644, tab. 4, fig. 4.

In fossâ juxta arcem D. *Walkiers*, ad *Elmet*, etc., natantem vidi.

315. BYSSUS. Fibræ simplices, uniformes; lanuginosæ.

740. *B. SEPTICA*. Capillacea; mollissima, parallela, fragilissima, pallida. *Linn. syst. veget.* 1395, n. 1.

Byssus latissima, filtrum seu pannum laneum simu-

- lans, filamentis tenuissimis non ramosis. *Michel, gen. et sp.* 211, n. 10.
- Byssus cellaris. *Scop. fl. carn. sp.* 1450.
- Byssus tenerrima, murina, doliaris. *Dillen, hist. musc.* 9, tab. 1, fig. 12.
- In fossis, cellis, etc. *Lanugo alba, dein aurea, denique fulva.*
741. *B. FLOS-AQUÆ.* Filamentis plumosis, natantibus. *Linn. syst. veget.* 1396, n. 2; *Scop. fl. carn. sp.* 1443.
- Conferva crustacea, tenerrima, subviridis. *Hall. hist.*, n. 2113.
- Byssus latissima, papyri instar super aquam expansa. *Dillen, hist. musc.* 2, tab. 1, fig. 1.
- In aquis quietis, primâ æstate.
742. *B. PHOSPHOREA.* Lanuginosa, violacea, lignis adnascens. *Linn. syst. veget.* 1396, n. 4; *Dillen, hist. musc.* 4, tab. 1, fig. 6.
- Byssus pulverulenta, violacea, lignis adnascens. *Raij. synops.* 56.
- Byssus cærulea. *De Lamark, fl. franc.* 1, fol. 103.
- In ligno putrescente, præsertim *Tiliæ* et *Salicis*.
743. *B. VELUTINA.* Capillacea, viridis, filamentis ramosis. *Linn. syst. veget.* 1396, n. 5; *Scop. fl. carn. sp.* 1448; *Hall. hist.*, n. 2101.
- Byssus tenerrima viridis, velutum referens. *Dillen. hist. musc.* 7, tab. 1, fig. 14.
- Byssus terrestris viridis, herbacea et mollissima, filamentis ramosis et non ramosis. *Michel, gen. et sp.* 210, tab. 89, fig. 5.
- In solo argilloso et muris antiquis, ubi aër humidus suffocatur.

## FUNGI.

## 316. AGARICUS. Fungus subtus lamellosus.

744. *A. CÆSAREUS.* Pileo convexo, aureo, carne ochroleucâ, lamellis medio latioribus, minoribus medio brevissimis, stipite volvâ et annulo cincto. *Linn. syst. veget.* 1397, n. 1; *Bull. herb. franc. tab.* 120; *Scop. fl. carn. sp.* 1466.

Fungus plantis, orbicularis, aureus. *Michel, gen. et sp.* 186, *tab.* 77, *fig.* 1.

Fungus ovinus. *Sterbeek, theatr. fung. tab.* 4, *fig.* D, E, F.

Genus 17 esculentorum fungorum. *Clus. hist. rar.* 272, *p.* 2.

Belgicè : *Keyserling* ; gallicè : *Champignon doré*.

Prope *Berghem* inveni mense septembri. *Rarior*.

745. *A. MUSCARIUS*. Pileo sanguineo, verrucis, lamellis stipiteque albis, hoc basi globoso, volvâ et annulo cincto. *Linn. syst. veget.* 1397, *n.* 2; *Scop. fl. carn. sp.* 1459; *Schæff. fung. icon. tab.* 27; *Michel, gen. et sp.* 188, *tab.* 78, *fig.* 2.

Mel muscarum venenosum, etc. *Sterbeek, theatr. fung. tab.* 22, *fig.* A, B, C.

Fungorum perniciosorum genus 12, *sp.* 4. *Clus. hist. rar.* 281, *p.* 2.

*Amanita* petiolo annulato, sanguineus, lamellis albis. *Hall. hist.*, *n.* 2373.

Fungus muscas interficiens. *Tourn. inst.* 559:

Belgicè : *Vliegen-Swam* ; gallicè : *Tue-mouche*.

In sylvis *Linthout, Vorst, etc.* Fine septembris.

746. *A. MACULATUS*. Pileo badio vel livido, verrucis albis inæquali, lamellis stipiteque albis, hoc volvâ et annulo cincto. *Linn. syst. veget.* 1397, *n.* 4; *Schæff. fung. icon. tab.* 90.

*Agaricus* pustulatus. *Scop. fl. carn. sp.* 1461.

Fungus inversus, perniciosus, pustulatus. *Sterbeek, theatr. fung. tab.* 21 *fig.* D.

Fungus venenatus viscidus. *Sterbeek, theatr. tab.* 20, *fig.* K.

*Stercus diaboli*. *Sterbeek, theatr. tab.* 19, *fig.* A, A.

*Amanita* petiolo procero, fistuloso, annulato, pileolo plano, striato, verrucoso, sordido, lamellis albis.

*Hall. hist.*, *n.* 2397.

In sylvis communis. Mense julio.

747. *A. VERNUS*. Totus albus, pileo plano, humidiculo, medio impresso, lamellis numerosis, divisis, stipite farcto, bulboso, valvâ et annulo cincto. *Linn. syst. veget.* 1397, *n.* 8; *Bull. herb. franc. tab.* 108.

*Agaricus* albellus ( et *Cocolla* ). *Scop. fl. carn. sp.* 1462 et 1485.

Fungus è volvâ erumpens, totus candidus, pileo ad

oras striato, pediculo cylindrico, annulo ampliore cincto. *Michel, gen. et sp.* 185.

*Agaricus amplissimâ valvâ exceptus, pileo orbiculari, in margine striato, petiolo cylindrico, annulo latiore cincto. Gleditsch. fung., fol.* 84.

Ad *Elsen*, prope *D. Torfs*, juxta prata. Mense septembri. *Rara*.

748. *A. PISTILLARIS*. Pileo spadiceo-flavente, margine undulato-plicato, stipite annulato, concolore, clavato, farcto, lamellis dilutè lateritiis, confertis. *Linn. syst. veget.* 1399, n. 22.

*Agaricus putridus. Scop. fl. carn. sp.* 1468.

Fungus ex uno pede multiplex, pileo desuper ex spadiceo-flavescente, ad oram non nihil undulato, subtùs albo, pediculo subobscurò, et veluti bulboso. *Michel. gen. et sp.* 199, tab. 81, fig. 2.

In umbrosis, ad truncos putrescentes. Octobri mense.

749. *A. CAMPESTRIS*. Pileo convexo, canescente, maculis piloso-squamosis, lamellis inæqualibus, (adulti) rufescentibus, stipite annulato, albido, recti. *Linn. syst. veget.* 1399, n. 25; *Scop. fl. carn. sp.* 1478; *Schæff. fung. icon. tab.* 310, 311.

Fungus campestris, supernè albus, infernè rubens.

*Michel. gen. et sp.* 174, n. 8; *Bauh. hist.* 3, fol. 824.

Fungus campestris. *Sterbeek, theat. fung. tab.* 1, fig. F.

Fungus parvus colubrinus. *Sterb. theatr. tab.* 16, fig. F.

Fungorum esculentorum genus 9, sp. 1. *Clus. hist. rar.* 268, p. 2.

Belgicè : *Veld-Kampernoelie*; gallicè : *Champignon des champs*.

In pratis campisque. Mense maio et julio.

750. *A. PRATENSIS*. Pileo convexo albido vel ex thalassino delutè cinerco, striato, lamellis sordidè carncis, stipite annulato, albido, basi inflexâ fuscescente. *Linn. syst. veget.* 1399, n. 26; *Scop. fl. carn. sp.* 1467; *Schæff. fung. icon. tab.* 96.

*Amanita petiolo annulato, pileo campaniformi, albido, laminis roseis. Hall. hist., n.* 2443.

Fungus pratensis. *Sterb. theatr. fung. tab.* 1, fig. C, D.

Belgicè : *Wye-Kampernoelie*; gallicè : *Champignon des prés*.

In pratis et campis. Julio et septembri mense.

751. *A. Squamosus*. Pileo convexo, umbonato, fulvo, squamis erectis aspero, margine undulato, lamellis triplici ordine digestis, stipite infra annulum squamoso. *Linn. syst. veget.* 1399, n. 30; *Bulliard, herb. franc. tab.* 266.  
*Amanita* petiolo procero, squamoso, annulato, pileo conico, squamoso, subspadiceo, laminis albis. *Hall. hist.*, n. 2366.  
 Fungus pileo lato, micis furfuraceis, aspero. *Vaill. bot. par.* 74, n. 1—2.  
*Agaricus flammeus*. *Schæff. fung. icon. tab.* 409.  
 In umbrosis sylvaticis. Mense augusto
752. *A. INTEGER*. Solitarius, pileo viscido purpureo, lamellis integris, æqualibus, stipiteque albidis. *Linn. syst. veget.* 1401, n. 36.  
*Agaricus Russula*. *Scop. fl. carn. sp.* 1502, variet. 2.  
 Fungus esculentus, pileo supernè rubro, internè albo, etc. *Michel. gen. et sp.* 155, n. 3.  
 Fungus ventricosus purpureus roscidus. *Sterb. theat. fung. tab.* 6, fig. D, D.  
 In sylvis communis. Junio et julio mense.
753. *A. VIRESCENS*. Pileo vario vel lurido viscido, lamellis æqualibus, stipiteque tereti, farcto, albidis. *Linn. syst. veget.* 1401, n. 41; *Scop. fl. carn.* 1507.  
 Fungus esculentus, pileo pulvinato, viridis, internè cum pediculo albo. *Michel. gen. et sp.* 152.  
 Fungi virides. *Sterb. theat. fung. tab.* 5, fig. C, D, E.  
 Belgicè : *Groene Kampernoelie*; gallicè : *Champignon verd*.  
 In dumetis *Berghem*, etc. Julio et augusto mense.
754. *A. GEORGII*. Solitarius, pileo flavo convexo, lamellis albis. *Linn. syst. veget.* 1402.  
 Fungus divi Georgii. *Sterbeek, theat. fung. tab.* 1, fig. G, G.  
 Fungi divi Georgii, coloris subalbidi, cum paucâ flavitie, esculenti et pratenses. *Bauh. hist.* 3, fol. 824.  
*Amanita* pileo flavo, oris striatis et lanuginosis, lamellis albis. *Hall. hist.*, n. 2367.  
 Genus 3, esculentorum fungorum. *Clus. hist. rar.* 254, p. 2.  
 Belgicè : *St-Jooris-Swam*.  
 Ad margines inter fruteta. Aprilis fine.
755. *A. GILVUS*. Pileo lutescente, lamellis crassis, ochro-

Ieucis, stipite albo, tereti, internè incrassato *Linn. syst. veget.* 1402, n. 50; *Schæff. fung. icon. tab.* 221.

*Pradellus parvus, sulfureus, perniciosus. Sterbeek, theatr. fung. tab.* 23, fig. C.

In sylvulâ prope D. de Poederlé, ad Laken. Mense augusto.

756. *A. TRUNCATUS*. Pileo obscure lateritio, lamellis rubellis, vel sordidè albis, stipite brevi, crasso, farcto, albido, internè fuscescente. *Linn. syst. veget.* 1402, n. 51; *Schæff. fung. icon. tab.* 251.

Fungorum esculentorum genus 15, sp. 2. *Clus. hist. rar.* 271, p. 2.

In sylvis ad arborum radices. Augusto mense.

757. *A. FASCICULARIS*. Pileo luteo, lamellis cinereis, margine flavicantibus, stipite flavo, lineari, elongato. *Linn. syst. veget.* 1407, n. 99.

Fungi buxei fasciculosi. *Sterb. theatr. fung. tab.* 25, fig. E.

*Agaricus flavidus. Schæff. fung. icon. tab.* 35, 49.

Fungi plures ex uno pede è primorum radicibus enati. *Vaill. bot. par.* 68, n. 51.

Belgicè : *Geële Bundel-Swam.*

Ad Ganshoren, vulgò op den Savelberg. Mense septembri.

758. *A. COCHLEARIFORMIS*. Siccus, albidus, pilei margine undulatim striato, lamellis crassis, ramosis, stipite obliquo, brevi, crasso. *Linn. syst. veget.* 1409, n. 116; *Schæff. fung. icon. tab.* 225.

Fungus parvus, tenax, albus. *Sterbeek, theatr. fung. tab.* 16, fig. I.

Belgicè : *Witte Schelp-Swam.*

Ad Ganshoren, prope Moonens, in herbosis. Julio mense.

759. *A. AGGREGATUS*. Gregarius, pileo dimidiato, fusco, margine lobato, lamellis rufescentibus, ramosis, subdecurrentibus, stipite laterali, crasso, farcto, fuscescenti-albo. *Linn. syst. veget.* 1411, n. 138; *Schæff. fung. icon. tab.* 305, 306.

Semi-fungus. *Sterbeek, theatr. fung. tab.* 8, fig. E.

Fungus qui semi-fungus pallidus. *Boerh. hort. lugd.* 12.

Belgicè : *Verkens-Swam.*

In sylvis Berghem, ad radices arborum. Junio mense,

760. *A. LACTIFLUUS*. Suaveolens, dulcis, succum vix acrem fundens, pileo fuscescente, firmo, lamellis fragilibus, flavicantibus vel carneis, stipite farcto, tereti, spongioso, *Linn. syst. veget.* 1412, n. 152; *Schæff. fung. icon. tab.* 5.

*Agaricus testaceus. Scop. fl. carn. sp.* 1558.

*Fungus quasi malus, etc. Sterbeek, theatr. fung. tab.* 8, fig. F, G.

Genus 15 esculentorum fungorum, sp. 1. *Clus. hist. rar.* 271, p. 2.

Belgicè : *Roo de Swynling*.

In sylvis *Berghem, etc.* Junio mense. *Rara*.

761. *A. PIPERATUS*. Succum acrem fundens, pileo lævi, fragili, vertice (senescentis) excavato, margine deflexo, lamellis inæqualibus, stipite farcto, utrinquè angustato. *Linn. syst. veget.* 1413, n. 157; *Schæff. fung. icon. tab.* 83; *Scop. fl. carn. sp.* 1550.

*Agaricus piperatus albus, lacteo succo turgens. Bauh. hist.* 3, fol. 825; *Michel. gen. et sp.* 141; *Boerh. hort. lugd.* 11.

*Fungus albus acris. Bauh. pin.* 371; *Sterbeek, theatr. fung. tab.* 8, fig. B, C, D.

Genus 8 esculentorum fungorum, sp. 1—3. *Clus. hist. rar.* 267, p. 2.

Belgicè : *Peperling*; gallicè : *Champignon poivré*.

In sylvis. Augusto et septembri mense.

762. *A. UMBILICATUS*. Pileo flavo, vertice umbilicato, lamellis concoloribus, subdecurrentibus, stipite albo, farcto, sursum ampliato. *Linn. syst. veget.* 1414, n. 167; *Schæff. fung. icon. tab.* 207.

*Fungus croceus magnus. Sterbeek, theatr. fung. tab.* 4, fig. C.

*Fungus luteus pallidus. Bauh. hist.* 3, fol. 828.

Genus 12 esculentorum fungorum. *Clus. hist. rar.* 269, p. 2.

Belgicè : *Geële Kämpernoelie*.

In sylvis *Heder, Vorst, etc.* Julio mense.

763. *A. COCCINEUS*. Pileo lævi, sicco, coccineo, truncati-conico, vertice mamillari, margine repandolacero, lamellis aurantiacis, stipite flavicante, farcto, tereti. *Bulliard, herb. franc. tab.* 50; *Schæff. fung. icon. tab.* 302; *Jacq. miscell. austr.* 2, fol. 106.

*Agaricus conicus. Scop. fl. carn. sp.* 1525.

*Fungus parvus coccineus. Vaill. bot. par. 66, n. 38.*  
*In sylvâ Vorst. Mense julio. Non communis.*

764. *A. MAJALIS.* Suaveolens, pileo convexo, sicco, dilutè coriaceo, stipite concolore, deorsum incrassato, lamellis membranaceis, subdecurrentibus, utrinque acuminatis. *Linn. syst. veget. 1420, n. 229; Bulliard, herb. franc. tab. 142.*

*Agaricus albellus. Schæff. fung. icon. tab. 78.*

*Agaricus esculentus, nemorosus, albus, pediculo longo, crasso, radice tuberosâ. Michel, gen. et sp. 170, n. 1; 171, n. 6.*

*Fungus pratensis. Sterb. theatr. fung. tab. 1, fig. E*

*Belgiè: Kampernoelie; gallicè: Mousseron.*

*Ad margines, in pratis, etc. Mense maio.*

765. *A. PINETI* Cespitosus, pileo depresso-convexo, umbonato, glaberrimo, subniveo, lamellis subconcoloribus, inæqualibus, stipite gracili, lineari, obscuro. *Linn. syst. veget. 1420, n. 235.*

*Fungus pratensis. Sterb. theatr. fung. tab. 1, fig. B.*

*Fungus orbicularis exalbidus pratensis. Bauh. pin. 370.*

*Ad margines arenosos, prope Oudergem. Fine julii.*

766. *A. ESCULENTUS.* Pileo convexo, terreo, stipite gracili, fistuloso, sordidè ochraceo, lamellis albis. *Linn. syst. veget. 1420, n. 236; Jacq. miscell. austr. 2, fol. 103, tab. 14, fig. 4.*

*In nemoribus. Mense maio.*

767. *A. CLAVUS.* Pileo planiusculo, umbonato, luteo, margine striato vel plicato, lamellis sordidè albis, stipite lineari, tereti, farcto, infernè torto. *Linn. syst. veget. 1420, n. 237; Schæff. fung. icon. tab. 59.*  
*Amanita minimus, oris adtractis, flavus, lamellis albis. Hall. hist., n. 2370.*

*Fungus minimus, aurantius, mamillaris. Vaill. bot. par. tab. 11, fig. 19, 20.*

*In nemoribus. Mense julio et octobri.*

768. *A. TRICHOPOUS.* Albus, pileo campanulato, substriato, stipite procero, setaceo, caudato, albo. *Linn. syst. veget. 1423, n. 264; Scop. fl. carn. sp. 1493.*

*Fungus minimus, candidus, pileolo hemisphærico, pediculo altiori, capillaceo. Michel, gen. et sp. 147, n. 35.*



*Agaricus exiguus* albus, pileolo hemisphærico, petiolo setaceo, longissimo. *Gleditsch, fung.* 120.

In fissuras corticis Ulmi in de Warande, etc. Sub finem mensis octobris. *Non major semine cannabis.*

769. *A. UMBELLIFERUS.* Minutus, albus, pellucidus, pileo hemisphærico, margine plicato, lamellis distantibus, stipite filiformi. *Linn. syst. veget.* 1423, n. 267; *Scop. fl. carn. sp.* 1571.

Fungus minimus. totus albus, pileo hemisphærico, utrinque striato, lamellis rarioribus. *Michel, gen. et sp.* 166, tab. 80, fig. 11.

*Amanita* albus, tener, pileolo campanulato, striato. *Hall. hist.*; n. 2346.

Ad Berghem in foliis putridis, etc. Mense septembri. *Præcedenti paulò major.*

770. *A. ROTULA.* Albidus, pileo convexo, umbonato, extrorsum striato, lamellis latiusculis, distantibus, annulo peculiari annexis. *Linn. syst. veget.* 1424, n. 280. *Scop. fl. carn. sp.* 1569.

Fungus fimetarius parvus, cæspitosus, fugax, albidus, subtus lamellis raris, ad tubum quemdam coeuntibus, eidemque junctis, cui inseritur pedunculus albus. *Michel, gen. et sp.* 195, tab. 79, fig. 7.

Lapis molaris gracilis. *Sterb. theatr. fung. tab.* 24, fig. A.

Genus 3 noxiorum fungorum. *Clus. hist. rar.* 277, p. 2.

Ad lignum Quercus putrescens. Mense julio.

771. *A. SPADICEO-GRISEUS.* Pileo pallido, umbone magis flavo, margine tenuissimè striato, griseo, lamellis (senescentis) nigrescentibus, stipite elongato, albido, fistuloso, sursum graciliori. *Linn. syst. veget.* 1425, n. 289.

*Agaricus* lignorum. *Scop. fl. carn. sp.* 1482.

Fungus parvus ex uno pede multiplex, pileolo griseo et ubivis striato, infernè nigricante, pediculo albo, fistuloso. *Michel, gen. et sp.* 195.

Fungi magni fasciculosi, *Sterb. theatr. fung. tab.* 25, fig. F.

Genus 22 perniciosorum fungorum, sp. 5. *Clus. hist. rar.* 285, p. 2.

In quisquiliis sordibusque. Junio et septembri mense.

772. *A. FASCICULATUS.* Fuscescendo diffuens, pilco con-

vexo, lævi, luteo, lamellis numerosis, angustis, olivaceis, stipite flexuoso, fistuloso, flavo. *Linn. syst. veget.* 1425, n. 292.

Genus 22 noxiorum fungorum, sp. 2 et 4. *Clus. hist. rar.* 285, p. 2.

Fungi fasciculosi rufi coloris. *Sterb. theatr. fung. tab.* 25, fig. D, G.

Belgicè : *Stoks-wam.*

In ligno putrescente. Mense octobri.

773. *A. VAILLANTII*. Gregarius, pileo striato, cinereo, concavo, tandem campanulato, spadiceo; lamellis latiusculis, serrulatis, stipite lineari, tereti, albo. *Linn. syst. veget.* 1427, n. 307.

Fungus multiplex, ovatus, cinereus. *Vaill. bot. par. tab.* 12, fig. 10, 11.

Agaricus ovatus. *Scop. fl. carn. sp.* 1479.

Fungus ex uno pede multiplex, pileo cucullato, è glauco argenteo splendente, infernè lamellis amplioribus, nigris, pediculo fistuloso, candido. *Michel, gen. et sp.* 200.

In fossis desiccatis, etc. Septembri mense.

774. *A. DOMESTICUS*. Pileo primùm ovato, floccis fuscis, asperis, margine undulato, lacero, lamellis æqualibus, latiusculis, numerosis, stipite niveo. *Linn. syst. veget.* 1472, n. 311.

Agaricus fimetarius. *Scop. fl. carn. sp.* 1484.

Fungus ex uno pede multiplex, pileo galericulato, ruffo-fulvo, vertice lævi, reliquâ parte striato, lamellis nigricantibus, pediculo albo, fistuloso. *Michel, gen. et sp.* 195.

Fungi cani fasciculosi. *Sterb. theatr. fung. tab.* 25, fig. A.

Belgicè : *Gryse Bundel-Swam.*

In ligno putrescente, etc. Fine septembris.

775. *A. STERCORARIUS*. Pileo convexo, diaphano, cineraceo-nigro, margine lacero, revoluta, lamellis canis, stipite subobliquo, angusto, infernè incrassato. *Linn. syst. veget.* 1428, n. 315; *Scop. fl. carn. sp.* 1483.

Genus 16 noxiorum fungorum, sp. 3. *Clus. hist. rar.* 282, p. 2.

Fungus comatus. *Sterbeek, theatr. fung. tab.* 22, fig. I, K, L.

Fungus oris laceris et in lacinias divisus. *Bauh. pin.* 373.

Fungus in fimo equino natus, desuper cervini diluti coloris, subtus altius lamellatus et fuscus, pediculo tenui, fistuloso ac supernà pilei parte concolore. *Michel, gen. et sp.* 156.

Belgicè : *Mest-Swam.*

In fimetis, stabulis, etc. Mense junio et octobri.

776. *A. DIGITALIS*. Pileo semi-ovato, crenulato, livido-canescente, extrorsum confertissimè striato, vertice glabro, ferrugineo, lamellis triplicis longitudinis, atris, stipite adscendente, elongato, pallidissimo. *Linn. syst. veget.* 1428, n. 318.

Fungus digitalis. *Sterb. theat. fung. tab. 24, fig. I.*

Fungus venenatus primus. *Dodon. kruyd-b.* 784; *Lobel. kruyd-b.* 306, p. 2.

Belgicè : *Duyvels-Brood.*

In cellis, etc., in ligno putrescente. Mense octobri.

777. *A. PERENNIS*. Subacaulis, suberoso-coriaceus, pallidè ochraceus, lamellis pallidioribus. *Linn. syst. veget.* 1428, n. 324.

In Ulmo putrescente, prope villam *Heymans* ad *Läken*.

### 317. MERULIUS. Fungus subtus venosus.

778. *M. UMBONATUS*. Pileo umbonato, cinereo, stipite concolori, tereti, venis albis. *Linn. syst. veget.* 1430, n. 2.

*Agaricus muscoïdes. Jacq. miscell. austr. 2, fol. 109, tab. 16, fig. 1.*

In sylvis prope *Vorst*. Octobri mense. *Rara.*

779. *M. CANTHARELLUS*. Vitellinus, suaveolens, pileo (senescentis) excavato, margine undulato, lobato, venis subcrispis, decurrentibus, stipite tereti, farcto, sursum dilatato. *Linn. syst. veget.* 1430, n. 12; *Scop. fl. carn.* 1581.

*Merulius flavus, oris contortis et laceris. Hall. hist., n. 2326.*

*Auricula leporis lutea (et alba). Sterbeek, theat. fung. tab. 4, fig. B, tab. 15, fig. B.*

Fungus nemorum magnus et tortus. *Lobel, kruyd-b.* 307, p. 2.

Belgicè : *Haesen-Oor* ; gallicè : *Chanterelle*.

In sylvis omnibus. Mense maio et septembri.

780. *M. QUERCINUS*. Acaulis, suberoso - coriaceus, planus, villosus, semi-orbicularis, annulis diversi coloris pictus, venis confertis, cartilagineis, anastomosantibus, albidis vel fusciscentibus. *Linn. syst. veget.* 1431, n. 27.

*Agaricus quercinus*. *Linn. sp. pl.* 1176, n. 25; *Schæff. icon. fung. tab.* 57, 231; *Bull. herb. franc. tab.* 362, 442, fig. 1; *Scop. fl. carn. sp.* 1578.

Belgicè : *Eyke-Swam*.

In sylvis ad truncos *Quercûs*, etc. Perennis.

318. *HYDNUM*. Fungus subtus echinatus, fibris subulatis.

781. *H. REPANDUM*. Stipitatum, pileo convexo, rufo, subtus albido, stipite basi incrassato. *Linn. syst. veget.* 1438, n. 5; *Scop. fl. carn. sp.* 1599.

*Erinaceus esculentus*, pallide luteus. *Michel. gen. et sp.* 132, tab. 72.

*Echinus petiolatus*, subrufus, petiolo lævi. *Hall. hist.*, n. 2325.

*Hydnum flavidum*. *Schæff. fung. icon. tab.* 318.

Fungus *erinaceus*. *Vaill. bot. par.* 58.

In sylvis *Terhameren*, *Heder*, etc. Mense octobri.

319. *BOLETUS*. Fungus subtus porosus.

782. *B. VISCIDUS*. Pileo pulvinato viscido, poris teretibus convexis, immersis, distinctis, stipite lacerato. *Linn. syst. veget.* 1432, n. 5.

*Polyporus carne secedente*, petiolo terreo, infernè aurantio. *Hall. hist.* n. 2307.

Fungus *bufonius*, etc. *Sterbeek, theatr. fung. tab.* 17, fig. F; *tab.* 18, fig. A; *tab.* 20, fig. M.

Genus 20 noxiorum fungorum, sp. 4. *Clus. hist. rar.* 285, p. 2.

Belgicè : *Padden-Hoed*.

In sylvis communis. Mense septembri.

783. *B. LUTEUS*. Pileo pulvinato, viscido, porisque rundatis, convexis, flavissimis, stipite annulato. *Linn. syst. veget.* 1432, n. 7; *Scop. fl. carn. sp.* 1587; *Schæff. fung. icon. tab.* 114, 115.

*Polyporus carne secedente, petiolatus, annulatus. Hall. hist., n. 2301.*

*Fungus ranarum major. Sterb. theatr. fung. tab. 17, fig. M.*

Belgicè : *Geél Padde-Brood.*

In sylvis *Berghem*, etc. Mense octobri.

784. *B. BOVINUS*. Stipitatus, pileo pulvinato, glabro, marginato, poris acutis, compositis, porulis angulatis, brevioribus. *Linn. syst. veget. 1432, n. 8; Scop. fl. carn. sp. 1586.*

*Suillus esculentus*. crassus, supernè fulvus, infernè initio albidus. *Michel. gen. et sp. 127, tab. 68, 69.*

*Fungus albus*, etc. *Sterbeek, theatr. fung. tab. 3, fig. A, B.*

*Polyporus carne secedente, petiolatus, fulvus, infernè virescens. Hall. hist., n. 2302.*

Belgicè : *Osse-brood.*

Ad *Ganshoren*, prope arcem comitis, etc. Junio mense.

785. *B. MUTABILIS*. Pileo pulvinato, fusco. tubis flavescentibus vel rubris, stipite incrassato, brevi, fuscescente vel rubello. *Linn. syst. veget. 1432, n. 9; Schaff. fung. icon. tab. 108, 133—135.*

Genus 19 noxiorum fungorum, sp. 5. *Clus. hist. rar. 183, p. 2.*

*Panis bufonius. Sterb. theatr. fung. tab. 17, fig. G, N, O.*

Belgicè : *Padden-Brood.*

In sylvâ *Lorbeek*, etc. Mense septembri.

786. *B. LAPIDUM*. Carnosus, pileo convexo, suprâ fusco, subtus flavo, carne albâ, stipite solido, subrugoso, exalbido. *Linn. syst. veget. 1434, n. 93.*

*Fungus tertius bufonius*, etc. *Sterb. theatr. tab. 17, fig. I, L.*

Genus 19 noxiorum fungorum, sp. 4. *Clus. hist. rar. 283, p. 2.*

Belgicè : *Vorsche-Swam.*

Ad *Berghem*, vulgò in *de Bosch-straet*, etc. Mense octobri.

787. *B. SQUAMOSUS*. Pileo flavescente squamoso, poris difformibus, oblonge-flexuosis, niveis, stipite laterali. *Linn. syst. veget. 1434, n. 24; Bulliard. herb. franc. 344, tab. 19 et 312.*

*Boletus flabelliformis*. Scop. fl. carn. sp. 1590.

Belgiçè : *Verkens-Brood*.

Ad truncos putrescentes. Perennis.

788. *B. INFUNDIBULIFORMIS*. Fulvens, stipite in pileum infundibuliformen dilatato, poris dilatatis, brevibus. Linn. syst. veget. 1434, n. 25; Michel. gen. et sp. tab. 7, fig. 4, 8, 10.

Ad Ganshoren, in ambulacro ab arce comitis ad prata ducente. Mense septembri. Rarior.

789. *B. OBLIQUATUS*. Exsiccabilis, badius, nitidus, coriaceo-suberosus, pileo obliquo, fluctuante, tubis albo-ferrugineis, stipite laterali. Linn. syst. veget. 1435, n. 29; Bull. herb. franc. 335, tab. 7 et 459.

Ad Berghem, vulgò in de Bosch-stræet, in trunco Salicis. Perennis.

*Specimen meum à datâ descriptione parum recedit: stipes enim brevis, pro maximâ parte niger, in centro pilei inseritur et in eo obliquè decurrit; diameter pilei quinque pollicum, circumscriptio oblonga, superficies ut suprà dicitur, centro concavo, poris minutissimis, albis. Multiplex est et substantiâ omninò lignèa.*

790. *B. SUBEROSUS*. Acaulis, pulvinatus, albus, lævis, poris acutis, difformibus. Linn. syst. veget. 1436, n. 40; Bull. herb. franc. tab. 491.

Belgiçè : *Wolfs Brood*.

In Betulis et Quercubus putrescentibus. Perennis.

791. *B. IGNIARIUS*. Acaulis, pulvinatus, lævis, poris tenuissimis. Linn. syst. veget. 1436, n. 43; Scop. fl. carn. sp. 1594.

*Polyporus sessilis, convexo-planus, durissimus, cinereus, infernè albidus. Hall. hist. n. 2288, 2289.*

*Agaricus pedis equini facie. Tourn. inst. 562.*

*Fungus in caudicibus nascens, unguis equini figurâ.*

*Bauh. pin. 372.*

Belgiçè : *Vonk-Swam*.

Ad truncos Salicum communis. Perennis.

792. *B. VERSICOLOR*. Acaulis, fasciis discoloribus, poris albis. Linn. syst. veget. 1437, n. 50; Scop. fl. carn. 1592.

*Agaricus varii coloris, squamosus. Tourn. inst. 562.*

*Fungus Cerasorum coloris varii. Bauh. hist. 3, fol. 834.*

*Fungus mesentericus. Sterb. theatr. fung. tab. 27, fig. K.*

Belgicé : *Schelp-Swam.*

In ligno *Quercus putrescente. Perennis.*

793. *B. MEDULLA-PANIS. Crustaceus, albus, difformis, effusus. Linn. syst. veget. 1438, n. 75; Jacq. miscell. austr. 1, fol. 141, tab. 11.*

*Polyporus crustaceus, effusus, farinosus. Hall. hist. n. 2272,*

*Agaricum terrestre, Medullam-panem referens. Michel, gen. et sp. 121, tab. 63, fig. 2.*

Belgicé : *Kruym-Swam.*

In sylvâ *Diligem, in Tiliâ putrescente.*

320. *CLAVARIA. Fungus elongatus, subsolidus, in omni superficie fructificans.*

794. *C. PISTILLARIS. Clavæformis, simplicissima, glabra, solida. Linn. syst. veget. 1442, n. 1; Scop. fl. carn. sp. 1622.*

*Clavaria indivisa, flavescens, plicata. Hall. hist. 2204.*

*Clavaria major lutea. Michel, gen. et sp. 208, tab. 87, fig. 1.*

*Clavaria alba pistilliforma. Vaill. bot. par. 39, tab. 8, fig. 5.*

Belgicé : *Kleper.*

In sylvâ *Vorst, prope het Vosse-Gat. Mense octobri.*

795. *C. CORNU-CERVI. Ochracea, ramis apicem versus sensim attenuatis, acutiusculis, teretibus. Linn. syst. veget. 1444, n. 28; Schæff. fung. icon. tab. 273.*

*Fungus corallinus asper. Sterb. theatr. fung. tab. 11, fig. B.*

Belgicé : *Herts-horen.*

In sylvis ad arborum radices. Septembri mense. *Rara.*

796. *C. CORALLOIDES. Ramis confertis, ramosissimis, inæqualibus. Linn. syst. veget. 1444, n. 21; Scop. fl. carn. sp. 1625.*

*Clavaria caule crassissimo, ramis innumeris, cespitosis, breviter dentatis. Hall. hist., n. 2201.*

*Barba caprina (major et minor). Sterbeek, theatr. fung. tab. 11, fig. A, C, D.*

*Coralloides flava et albida. Tourn. inst. 564, tab. 332, fig. B.*

Genus 19 esculentorum fungorum, sp. 1. *Clus. hist. rar.* 274, p. 2.

België : *Geytenbaerd.*

In sylvis, prope *Rode, Linkenbeek, etc.* Mense septembri.

321. *TREMELLA.* Fungus gelatinosus, uniformis, diaphanus, seminibus latitantibus.

797. *T. RUFA.* Longitudinaliter dimidiato-infundibuliformis. *Linn. syst. veget.* 1446, n. 14; *Jacq. miscell. austr.* 1, fol. 143, tab. 14.

Inveni in clauastro prati, prope *Curegem.* Initio mensis martii.

798. *T. MESENERICA.* Subrotunda, sessilis, plicato-undulata, aurea. *Linn. syst. veget.* 1447, n. 21.

*Tremella Mesenteriformis.* *Jacq. miscell. austr.* 1, fol. 142, tab. 13.

Fungus membranaceus, parvus, aureus. *Sterb. theat. fung. tab.* 26, fig. E.

Agaricum gelatinosum, membranaceum, aureum, sinuatum et crispum. *Michel, gen. et sp.* 124.

België : *Goud-vel.*

Ramulis humi jacentibus adnascitur. Fine autumnii.

799. *T. ADNATA.* Rotunda, imbricata, livida. *Linn. syst. veget.* 1446, n. 9.

In hortis, etc., in ligno putrescente. Per pluvias conspiciua.

300. *T. NOSTOC.* Plicata, undulata. *Linn. syst. veget.* 1447, n. 22; *Scop. fl. carn. sp.* 1420; *Bull. herb. franc. tab.* 184.

*Tremella terrestris, sinuosa, pinguis et fugax.* *Dillen, hist. musc. tab.* 10, fig. 14.

*Linkia terrestris, gelatinosa, membranacea, vulgarissima, ex pallide et virescente fulva.* *Michel, gen. et sp.* 126, tab. 67, fig. I.

Lichen gelatinosus, plicatus, undulatus, laciniis crispatis, granulosus. *Hall. hist.*, n. 2041.

In pratis interque muscos, post pluvias.

301. *T. JUNIPERINA.* Plicata, sessilis, adscendens, flavida. *Linn. syst. veget.* 1447, n. 25; *Scop. fl. carn. sp.* 1421; *Bull. herb. franc. tab.* 306.



Agaricum gelatinosum, flavo-rubrum, supernè tuberculosum. *Hall. hist.*, n. 2260.

Belgicè : *Boom-Lym.*

In Junipero communi, Sabinà, etc., primo vere.

802. *T. PERSISTENS*. Membranacea, plicata, rubra. *Linn. syst. veget.* 1447, n. 23; *Bull. herb. franc. tab.* 304.

*Valsa miniata Scop. fl. carn. sp.* 1418.

*Sphæria convexa*, miniata, hirsuta. *Hall. hist.*, n. 2189.

*Lichenoides tuberculosum*, amæne, purpureum. *Dillen, hist. musc.* 127; *tab.* 18, *fig.* 6.

*Nostoc granulosus*, coccineus arboribus innascens. *Vaill. bot. par.* 144.

In hortis in cantheriis stipitibusque. Hieme conspicua.

322. *PHALLUS*. fungus subtùs lævis, suprà cellulis reticulatus.

803. *P. IMPUDICUS*. Pileo conico, margine crenulato, vertice perforato, stipite basi volvato. *Linn. syst. veget.* 1449, n. 5; *Scop. fl. carn. sp.* 1605.

Fungus penis virilis erecti facie. *Lobel, kruid-b.* 309, p. 2.

Fungus priapejus. *Sterbeek, theatr. fung. tab.* 30, (*præter N. O.*)

*Phallus batavicus*. *Dalech. hist.* 2, *fol.* 286.

Ova demonum. *Dodon. kruid-b.* 785.

Belgicè : *Duyvels-Eyeren.*

In sylvis. Mense octobri.

804. *P. ESCULENTUS*. Pileo ovato margine adnato, rugis undulatis, undiquè anastomosantibus, stipite tenuiori. *Linn. syst. veget.* 1449, n. 9; *Scop. fl. carn.* 1604; *Schæff. fung. icon. tab.* 298, 300.

Genus 1 esculentorum fungorum. *Clus. hist. rar.* 264, p. 2.

Fungi favaginosi. *Lobel, kruid-b.* 308, p. 2.

Fungi rugosi, etc. *Sterbeek, theatr. fung. tab.* 10.

Belgicè : *Morellen*; gallicè : *Morille.*

Ad margines; in sylvis, etc. Initio maii.

323. *HELVELLA*. Fungus pileo inflato, difformi, concavo, lævi, semina supernè elasticè protrudente.

805. *H. REVOLUTA*. Stipite fistuloso, compressiusculo,

- pileo plano, depresso, margine revoluto, integerrimo. *Linn. syst. veget.* 1449, n. 3.  
 Fungus gelatinus flavus. *Vaill. bot. par. tab.* 13, fig. 7—9.  
 Peziza tubæformis. *De Poederlé, bot. belg.* 311.  
 In sylvis, ad truncos putridos. Fine octobris.
324. PEZIZA. Fungus sæpè concavus sine capsulis aut seminibus nudo oculo conspicuis.
806. *P. COCHLEATA*. Ceracea, sessilis, subcochleata; suprà è fusco-nigra, subtùs alba, venis costato-ramosis. *Jacq. Miscell. austr.* 2, fol. 112; *tab.* 17, fig. 1; *Schæff. fung. icon. tab.* 155.  
 Peziza bracteata, sordidè lutea, subvillosa. *Hall. hist.*, n. 2223.  
 Fungoïdes Auriculam Judæ referens, intùs rufescens, extùs candicans et quasi farinosum. *Vaill. bot. par. tab.* 11, fig. 8.  
 In locis umbrosis ad terram. Mense februario.
807. *P. COCCINEA*. Turbinato-campanulata, intùs coccinea, extùs alba, margine integro. *Schæff. fung. icon. tab.* 48; *Bull. herb. franc. tab.* 474.  
 Elvella flammea (et coccinea). *Scop. fl. carn. sp.* 1613, 1615.  
 Fungoïdes pixidatum, intùs coccineum, extùs albidum. *Michel. gen. et sp.* 205, *tab.* 86, fig. 5.  
 Concha marina colore coccineo, etc. *Sterbeek, theatr. fung. tab.* 26, fig. C, D.  
 Genus 24 noxiorum fungorum, sp. 1, 2. *Clus. hist. rar.* 287, p. 2.  
 In locis ab arboribus obsessis. Mense octobri.
808. *P. ACETABULUM*. Cyatiformis, sessilis, exterius angulata, venis ramosis. *Linn. syst. veget.* 1459, n. 130; *Schæff. fung. icon. tab.* 156.  
 Fungoïdes fuscum, acetabuliforme, externè ramicatum. *Vaill. bot. par.* 57, *tab.* 13, fig. 1.  
 Fungoïdes maximum vasis fusorii formâ. *Michel, gen. et sp.* 206, *tab.* 86, fig. 1.  
 Ad fragmenta lignorum humi jacentia. Primo vere.
809. *P. AURICULA*. Rugosa, auriformis, concava. *Linn. syst. veget.* 1459, n. 134.

- Elvella sambucina*. Scop. *fl. carn. sp.* 1612.  
*Tremella Auricula*. Blakw. *herb. tab.* 334.  
 Genus 1 noxiorum fungorum. Clus. *hist. rar.* 276, p. 2.  
*Fungus Sambuci* vel *Auricula Judæ*. Sterbeek, *theatr. fung. tab.* 27, fig. H.  
*Agaricus Auriculæ formâ*. Boerh. *hort. lugd.* 14.  
 Belgicè : *Judas-Oor*; gallicè : *Oreille de Judas*.  
 In trunco Sambuci, Opuli, Corylo, etc., putrescente.
810. *P. CALICIFORMIS*. Stipitata, convexa, intus fuscescens, exterius cinerascens. Linn. *syst. veget.* 1452, n. 21; Hedwig, *crypt.* 3, fol. 78, tab. 22, fig. B.  
 In sylvâ Linthout. Mense julio. Rara.
325. LYCOPERDON. Fungus; fila seminifera cum thecæ parietibus internis connexa.
811. *L. PROTEUS*. Subrotundum, substipitatum, lacero-dehiscens, carne albâ, seminibus atris. Linn. *syst. veget.* 1463, n. 4.  
*Lycoperdon polymorphum*. Scop. *fl. carn. sp.* 1631, variet. 1—3, 5—6.  
*Lycoperdon vulgare multiplex*. Tourn. *inst.* 563.  
*Fungus orbicularis* (et semi-orbicularis). Dodon. *kruyd-boek*, 787.  
*Lupi crepitus*. Lobel, *kruyd-b.* 310, p. 2; Sterbeek, *theatr. fung. tab.* 28.  
 Genus 26 noxiorum fungorum, sp. 3. Clus. *hist. rar.* 288, p. 2.  
 Belgicè : *Wolfs-Vest*; gallicè : *Vesse de Loup*.  
 In sylvis, Septembri mense.
812. *L. BOVISTA*. Globosum, lacero-dehiscens, stipite validissimo, clavato, ventricosum, carne albâ, seminibus atris. Linn. *syst. veget.* 1464, n. 15.  
*Lycoperdon polymorphum*. Scop. *fl. carn. sp.* 1631, variet. 4.  
*Lycoperdon turbinatum*, candidum, asperum, basi oblongâ, crassissimâ, crispâ. Gleditch, *fung.* 143, L.  
 Belgicè : *Wyven-Vest*; gallicè : *Boviste*.  
 In sylvis. Fine septembris. Præcedenti longè rarior.

### 326. RETICULARIA. Fungus subrotundus, thecâ

rigidâ seminibus inter fila reticulata dispersis repletâ.

813. *R. LYCOGALA*. Albida, seminibus fuscis. *Linn. syst. veget.* 1471, n. 6.

Mucor Lycogalâ. *Scop. fl. carn. sp.* 1645.

Lycoperdon variolosum. *Wieg. obs. bot.* 824.

Lycogala sessile, fulvum. *Hall. hist.* 2142.

Lycogala globosum, grani pisi magnitudine, æris re-cocti colore. *Michel, gen. et sp. tab.* 95, fig. 2.

In ramis arborum moribundis.

814. *R. USTILAGO*. Acaulis, fusco-nigricans. *Linn. syst. veget.* 1472, n. 14.

Reticularia segetum. *Bulliard, herb. franc. tab.* 472, fig. 2.

Ustilago. *Dodon. kruid-b.* 865; *Lobel, kruid-b.* 45; *Dalech. hist.* 1, fol. 150.

Belgicè : Korn-brand; gallicè Brûlure.

In spicis Triticæ, Avenæ, Hordei, etc. Mense junio et julio.

327. *ÆCIDIDIUM*. Fungus; thecâ membranaceâ utrinquè glabrâ, seminibus nudis non cohærentibus plenâ.

815. *Æ. CANCELLATUM*. Thecis latere fissis, apice integris. *Linn. syst. veget.* 1472, n. 3.

Lycoperdon cancellatum. *Jacq. fl. austr. tab.* 12; *Fl. dan. tab.* 704.

Belgicè : Yser-Roest.

Verrucæ crocæ, foliis Pyri innascentes.

816. *Æ. TUSSILAGINIS*. Cespitosum, thecis subprominentibus, flavis, seminibus aurantiis. *Linn. syst. veget.* 1473, n. 8.

Lycoperdon Epiphyllum. *Linn. syst. nat.* 2, fol. 726.

In dorso foliorum Tussilaginis. Mense maio.

328. *STEMONITIS*. Fungus cortice fugaci vel membranaceo; thecæ fila seminifera, reticulato-compacta, elasticè sese expandentia.

817. *S. FURFURACEA*. Stipite filiformi, capitulo subglo-

boso, fusco, glabro, seminibus viridibus. *Linn. syst. veget.* 1468, n. 13.

*Mucor furfuraceus.* *Linn. syst. pl.* 4, fol. 623.

*Trichia flava*, petiolata, capitulo sphærico. *Hall. hist.*, n. 2162.

*Mucor Mucedo.* *Scop. fl. carn. sp.* 1644. *Variet.* 5.  
In corticibus arborum lignisque putridis.

329. **MUCOR.** Fungus fugax, capitula rorida, primò diaphana, demùm opaca, stipitibus simplicibus vel ramosis affixa.

318. *M. MINIMUS.* Minimus, albus, capitulo nutante. *Linn. syst. veget.* 1485, n. 2.

*Mucor Mucedo.* *Scop. fl. carn. sp.* 1644. *Variet.* 1 et 4.

*Mucor vulgaris*, capitulo lucido, per maturitatem nigro, pediculo griseo. *Michel. gen. et sp.* 215, tab. 95, fig. 1.

Belgicè : *Vermuftheyd.*

In pane mucido, etc.

319. *M. MUCEDO.* Stipitatus, capsulâ globosâ. *Linn. syst. veget.* 1486, n. 12; *Michel. gen. et sp. tab.* 95, fig. 4; *Scop. fl. carn. sp.* 1644. *Variet.* 2, 3; *Sterb. theat. fung. tab.* 31.

*Mucor petiolatus*, cinereus. *Hall. hist.*, n. 2147

*Mucor capitulo sphærico*, petiolo setaceo, longissimo. *Gleditch. fung.* 161, n. 4.

Belgicè : *Schimmel*; gallicè : *Moisissure.*

In putrescentibus variis.

330. **MONILIA.** Fila moniliformia, in capitulum congregata.

320. *M. CESPITOSA.* Stipite ramoso, spicis ternatis. *Linn. syst. veget.* 1487, n. 2.

*Mucor cespitosus.* *Michel. gen. et sp. tab.* 91, fig. 3, 4.

In foliis et fructibus putrescentibus.

321. *M. CRUSTACEA.* Stipitata, spicis digitatis. *Linn. syst. veget.* 1487, n. 1.

*Mucor crustaceus.* *Linn. sp. pl.* 1352; *Fl. dan. tab.* 897, fig. 1.

*Mucor aspergillus.* *Scop. fl. carn. sp.* 1642.


In cibis et variis corruptis.

322. *M. GLAUCA*. Cana, villosa, stipite setaceo brevi, capitulo globoso. *Linn. syst. veget.* 1487, n. 7.  
*Mucor glaucus*. *Linn. sp. pl.* 1352; *Bull. herb. franc. tab.* 504, *fig.* 10.  
*Aspergillus capitatus*, capitulo glauco, seminibus rotundis. *Michel. gen. et sp.* 212, *tab.* 91, *fig.* 1,  
 In cibis et fructibus corruptis.
- 

## IN TEXTU OMISSA.

- 202<sup>do</sup>. *LYSIMACHIA NEMORUM*. Foliis ovatis, acutis, floribus solitariis, caule procumbente. *Linn. syst. veget.* 332, n. 12; *Fl. dan. tab.* 174.  
*Lysimachia humifusa*, folio rotundiore, acuminato, flore luteo. *Tourn. inst.* 142.  
*Anagallis lutea*. *Lobel, kruid-b.* 550; *Tabern. icon. pl.* 388, p. 2; *Dalech. hist.* 2, fol. 132.  
*Anagallis*. *Clus. hist. rar.* 182, p. 2.  
*Anagallis lutea nemorum*. *Bauh. pin.* 252; *Moris. hist.* 2, fol. 569, *tab.* 26, *fig.* 5.  
 Belgicè: *Geél Guychel-Heyl*; gallicè: *Mouron jaune*.  
 In humidis sylvarum. Julio florens; perennis.

FINIS.



# INDEX GENERUM,

CUM SPECIEBUS SUBJECTIS.

## A.

<i>Acer campestre</i> ,	165
Pseudo-Platanus,	ibid.
<i>Achillea Millefolium</i> ,	288
Ptarmica,	ibid.
<i>Acorus Calamus</i> ,	155
<i>Adoxa moschatellina</i> ,	171
<i>Æcidium cancellatum</i> ,	335
Tussilaginis,	ibid.
<i>Ægopodium Podagraria</i> ,	146
<i>Æsculus Hippocastanum</i> ,	162
<i>Æthusa Cynapium</i> ,	143
<i>Agaricus aggregatus</i> ,	321
Cæsareus,	317
Campestris,	319
Clavus,	323
Cochleariformis,	321
Coccineus,	322
Digitalis,	326
Domesticus,	325
Esculentus,	323
Fascicularis,	321
Fasciculatus,	324
Georgii,	320
Gilvus,	ibid.
Integer,	ibid.
Lactifluus,	322
Maculatus,	318
Majalis,	323
Muscarius,	318
Perennis,	326
Piperatus,	322
Pistillaris,	319
Pineti,	323
Pratensis,	319
Rotula,	324
Spadiceo-griseus,	ibid.
Squamosus,	320
Stercorarius,	325
Trichopus,	325

<i>Agarius truncatus</i> ,	321
Umbelliferus,	324
Umbilicatus,	323
Valliantii,	325
Vernus,	318
Virescens,	320
<i>Agrimonia Eupatoria</i> ,	188
<i>Agrostema Githago</i> ,	183
<i>Agrostis canina</i> ,	81
Capillaris,	81
Interrupta,	81
Pamila,	82
Spica-Venti,	81
Stolonifera,	82
<i>Aira aquatica</i> ,	84
Canescens,	85
Caryophyllæa,	ibid.
Cæspitosa,	84
<i>Ajuga reptans</i> ,	212
<i>Alchemilla vulgaris</i> ,	108
<i>Alisma Plantago</i> ,	160
<i>Allium schænoprasum</i> ,	151
Vineale,	ibid.
Ursinum,	ibid.
<i>Alopecurus agrestis</i> ,	79
Geniculatus,	80
Pratensis,	ibid.
<i>Alsine media</i> ,	148
<i>Amaranthus Blitum</i> ,	99
Viridis,	ibid.
<i>Anagallis arvensis</i> ,	120
Cærulea,	ibid.
<i>Anchusa officinalis</i> ,	114
<i>Anemone nemorosa</i> ,	204
Sylvestris,	205
Ranunculoides,	ibid.
<i>Angelica sylvestris</i> ,	141
<i>Anthemis arvensis</i> ,	287
Cotula,	288
<i>Anthoxanthum odoratum</i> ,	64



<i>Anthirrinum arvense</i> ,	227	<i>Boletus Lapidum</i> ,	328
<i>Cymbalaria</i> ,	225	<i>Luteus</i> ,	327
<i>Elatine</i> ,	226	<i>Medulla-panis</i> ,	330
<i>Linaria</i> ,	ibid.	<i>Mutabilis</i> ,	328
<i>Minus</i> ,	227	<i>Obliquatus</i> ,	329
<i>Oruntium</i> ,	ibid.	<i>Squamosus</i> ,	328
<i>Spurium</i> ,	226	<i>Suberosus</i> ,	ibid.
<i>Aphanes arvensis</i> ;	49	<i>Versicolor</i> ,	ibid.
<i>Arabis thaliana</i> ,	239	<i>Viscidus</i> ,	327
<i>Arctium Lappa</i> ,	272	<i>Brassica arvensis</i> ,	240
<i>Arenaria rubra</i> ,	181	<i>Campestris</i> ,	ibid.
<i>Serpillifolia</i> ,	180	<i>Napus</i> ,	ibid.
<i>Tenuifolia</i> ,	181	<i>Oleracea</i> ,	241
<i>Trinervia</i> ,	180	<i>Rapa</i> ,	240
<i>Artemisia Absinthium</i> ,	278	<i>Briza media</i> ,	89
<i>Dracunculus</i> ,	ibid.	<i>Minor</i> ,	ibid.
<i>Vulgaris</i> ,	277	<i>Bromus arvensis</i> ,	93
<i>Arum maculatum</i> ;	204	<i>Asper</i> ,	ibid.
<i>Arundo phragmites</i> ,	95	<i>Mollis</i> ,	92
<i>Asparagus officinalis</i> ,	153	<i>Secalinus</i> ,	ibid.
<i>Asperula arvensis</i> ,	102	<i>Squarrosus</i> ,	ibid.
<i>Lævigata</i> ,	ibid.	<i>Sterilis</i> ,	93
<i>Asplenium Adiantum-nig.</i> ,	296	<i>Brionia alba</i> ,	67
<i>Ceterach</i> ,	295	<i>Bryum extincitorium</i> ,	304
<i>Ruta muraria</i> ,	ibid.	<i>Murale</i> ,	ibid.
<i>Scolopendrium</i> ,	294	<i>Pyriforme</i> ,	ibid.
<i>Trichomanoides</i> ;	295	<i>Rurale</i> ,	306
<i>Astragalus glycyphyllos</i> ,	255	<i>Subulatum</i> ,	305
<i>Atriplex hortensis</i> ,	155	<i>Tectorum</i> ,	306
<i>Patula</i> ,	ibid.	<i>Truncatulum</i> ,	305
<i>Atropa Belladonna</i> ,	127	<i>Viridulum</i> ,	ibid.
<i>Avena fatua</i> ,	94	<i>Butomus umbellatus</i> ,	174
<i>Nuda</i> ,	95	<i>Byssus Flos-aquæ</i> ,	317
<i>Pratensis</i> ,	ibid.	<i>Phosphorea</i> ,	ibid.
<i>Pubescens</i> ,	94	<i>Septica</i> ,	316
<i>Sativa</i> ,	ibid.	<i>Velutina</i> ,	317

## B.

<i>Ballota nigra</i> ,	219
<i>Bellis perennis</i> ,	285
<i>Betonica officinalis</i> ,	218
<i>Betula alba</i> ,	109
<i>Alnus</i> ,	ibid.
<i>Bidens cernua</i> ,	276
<i>Tripartita</i> ,	ibid.
<i>Boletus bovinus</i> ,	328
<i>Igniarius</i> ,	
<i>Infundibuliformis</i> ,	

## C.

<i>Calamagrostis arundinacea</i> ,	83
<i>Arundo</i> ,	ibid.
<i>Lanceolata</i> ,	82
<i>Callitriche autumnalis</i> ,	51
<i>Verna</i> ,	52
<i>Caltha palustris</i> ,	206
<i>Campanula glomerata</i> ,	123
<i>Hybrida</i> ,	ibid.
<i>Patula</i> ,	122
<i>Rapunculus</i> ,	ibid.

<i>Campanula Rotundifolia</i> ,	121	<i>Chenopodium album</i> ,	134
Speculum,	123	Bonus Henricus,	133
Trachelium,	122	Hybridum,	134
<i>Canabis sativa</i> ,	137	Polyspermum,	135
<i>Cardamine amara</i> ,	234	Rubrum,	133
Hirsuta,	ibid.	Viride,	134
Parviflora,	235	Vulvaria,	135
Pratensis,	234	<i>Chrysanthemum leucanth.</i> ;	286
<i>Carduus acaulis</i> ,	274	Segetum,	ibid.
Acanthoides,	273	<i>Chrysosplenium alternifol.</i> ,	175
Crispus,	ibid.	Oppositifolium,	176
Lanceolatus,	272	<i>Cichorium Endivia</i> ,	271
Marianus,	274	Intybus,	ibid.
Palustris,	273	<i>Circaea lutetiana</i> ,	52
<i>Carex acuta</i> ,	75	<i>Clavaria coralloides</i> ,	350
Cæspitosa,	74	Cornu cervi,	ibid.
Flava,	75	Pistillaris,	ibid.
Hirta,	72	<i>Clematis Vitalba</i> ,	205
Limosa,	74	<i>Clinopodium vulgare</i> ,	221
Muricata,	75	<i>Cnicus oleraceus</i> ,	274
Pallesceps,	74	<i>Cochlearia Armoracia</i> ,	232
Patula,	75	Coronopus,	ibid.
Pseudo-cyperus,	72	<i>Colchicum autumnale</i> ,	160
Pulicaris,	76	<i>Conserva bullosa</i> ,	315
Verna,	73	Canalicularis,	316
Vesicaria,	72	Gelatinosa,	ibid.
Vulpina,	75	Reticulata,	ibid.
<i>Carlina vulgaris</i> ,	275	Rivularis,	315
<i>Carpinus Betulus</i> ,	188	<i>Conium maculatum</i> ,	140
<i>Caucalis anthriscus</i> ,	139	<i>Convallaria bifolia</i> ,	154
Grandiflora,	ibid.	Majalis,	155
Scandicina,	ibid.	Multiflora,	ibid.
<i>Centaurea calcitrapa</i> ,	290	<i>Convolvulus arvensis</i> ,	121
Cyanus,	289	Sepium,	ibid.
Jacea,	290	<i>Conyza squarrosa</i> ,	230
Nigra,	289	<i>Cornus mascula</i> ,	106
Scabiosa,	ibid.	<i>Corylus avellana</i> ,	168
<i>Cerastium aquaticum</i> ,	185	<i>Cratægus Oxiantha</i> ,	198
Arvense,	ibid.	<i>Crêpis biennis</i> ,	269
Viscosum,	ibid.	Tectorum,	270
Vulgatum,	184	<i>Cucubalus Behen</i> ,	179
<i>Chærophyltum bulbosum</i> ,	144	<i>Cynoglossum officinale</i> ,	115
Sylvestre,	ibid.	Omphalodes,	ibid.
Temulum,	145	<i>Cynosurus cristatus</i> ,	90
<i>Chara flexilis</i> ,	50	<i>Cyperus fuscus</i> ,	70
Vulgaris,	ibid.	D.	
<i>Cheiranthus cheiri</i> ,	239	<i>Dactylis glomerata</i> ,	39
Erysimoïdes,	238	<i>Datura Stramonium</i> ,	127
<i>Chelidonium majus</i> ;	194		

<i>Daucus Carota</i> ,	140
<i>Delphinium Consolida</i> ,	199
<i>Dianthus armeria</i> ,	178
<i>Deltoïdes</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Prolifer</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Digitatis purpurea</i> ,	228
<i>Dipsacus Fullonum</i> ,	100
<i>Pilosus</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Sylvestris</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Draba verna</i> ,	230

## E.

<i>Echium vulgare</i> ,	116
<i>Epilobium angustifolium</i> ,	163
<i>Hirsutum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Montanum</i> ,	164
<i>Palustre</i> ,	165
<i>Parviflorum</i> ,	164
<i>Equisetum arvense</i> ,	292
<i>Fluviatile</i> ,	293
<i>Hiemale</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Limosum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Palustre</i> ,	292
<i>Sylvaticum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Erica vulgaris</i> ,	166
<i>Erigeron acre</i> ,	281
<i>Canadense</i> ,	280
<i>Eriophorum polystachyon</i> ,	68
<i>Ervum hirsutum</i> ,	254
<i>Tetraspermum</i>	<i>ibid.</i>
<i>Erysimum Alliaria</i> ,	237
<i>Barbarea</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Cheiranthoïdes</i> ,	238
<i>Officinale</i> ,	237
<i>Evonimus europæus</i> ,	129
<i>Eupatorium cannabinum</i> ,	277
<i>Euphorbia Esula</i>	191
<i>Exigua</i> ,	190
<i>Helioscopia</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Peplus</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Sylvatica</i> ,	191
<i>Euphrasia odontites</i> ,	224
<i>Officinalis</i> ,	<i>ibid.</i>

## F.

<i>Fagus sylvatica</i> ,	189
<i>Festuca duriuscula</i> ,	91
<i>Elatior</i> ,	<i>ibid.</i>

<i>Festuca fluitans</i> ,	91
<i>Rubra</i> ,	90
<i>Ovina</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Filago arvensis</i> ,	290
<i>Germanica</i> ,	291
<i>Montana</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Fragaria sterilis</i> ,	202
<i>Vesca</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Fraxinus excelsior</i> ,	64
<i>Fritillaria Meleagris</i> ,	152
<i>Fumaria officinalis</i> ,	248

## G.

<i>Galanthus nivalis</i> ,	150
<i>Galeopsis cannabina</i> ,	217
<i>Ladanum</i> ,	216
<i>Tetrahit</i> ,	217
<i>Galium Aparine</i> ,	104
<i>Mollugo</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Palustre</i> ,	103
<i>Spurium</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Uliginosum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Verum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Genista anglica</i> ,	250
<i>Tinctoria</i> ,	249
<i>Gentiana Centaurium</i> ,	137
<i>Geranium ciconium</i> ,	245
<i>Cicutarium</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Columbinum</i> ,	243
<i>Molle</i> ,	244
<i>Pusillum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Robertianum</i> ,	245
<i>Rotundifolium</i> ,	244
<i>Geum urbanum</i> ,	204
<i>Glecoma hederacea</i> ,	215
<i>Gnaphalium dioicum</i> ,	279
<i>Luteo-album</i> ,	280
<i>Sylvaticum</i> ,	279
<i>Uliginosum</i> ,	<i>ibid.</i>

## H.

<i>Hedera Helix</i> ,	132
<i>Helleborus niger</i> ,	210
<i>Viridis</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Hevella revoluta</i> ,	332
<i>Heracleum spondilium</i> ,	141
<i>Herniaria glabra</i> ,	132
<i>Hirsuta</i> ,	333

# INDEX

343

<i>Hieratium murorum</i> ,	267
Paludosum,	268
Pilosella,	267
Sabaudum,	268
Villosum,	ibid.
Umbellatum,	269
<i>Hyppuris vulgaris</i> ,	49
<i>Holcus avenaceus</i> ,	85
Lanatus,	84
<i>Hordeum distichon</i> ,	97
Hexastichon,	ibid.
Murinum,	ibid.
Vulgare,	ibid.
<i>Hottonia palustris</i> ,	119
<i>Humulus Lupulus</i> ,	156
<i>Hyacinthus racemosus</i> ,	154
Non-scriptus,	ibid.
<i>Hydnum repandum</i> ,	327
<i>Hydrocharis Morsus-ranæ</i> ,	174
<i>Hyosciamus niger</i> ,	126
<i>Hyoseris minima</i> ,	267
<i>Hypericum hirsutum</i> ,	261
Humifusum,	ibid.
Perforatum,	260
Pulchrum,	261
Quadrangulare,	260
<i>Hypnum cuspidatum</i> ,	308
Filicinum,	307
Parietinum,	308
Proliferum,	ibid.
Purum,	ibid.
Sericeum,	307
Sciuroïdes,	306
Triquetrum,	307
<i>Hypochaeris glabra</i> ,	270
Radicata,	ibid.

## I.

<i>Iberis amara</i> ,	255
Nudicaulis,	ibid.
<i>Ilex aquifolium</i> ,	109
<i>Impatiens Nolitangere</i> ,	151
<i>Inula dysenterica</i> ,	285
Hirta,	284
Pulicaria,	ibid.
Salicina,	285
<i>Iris Pseudo-acorus</i> ,	68
<i>Juglans regia</i> ,	188

<i>Juncus aquaticus</i> ,	156
Bufonius,	157
Bulbosus,	ibid.
Campestris,	158
Conglomeratus,	155
Effusus,	ibid.
Inflexus,	156
Maximus,	158
Pilosus,	ibid.
Sylvaticus,	157
Squarrosus,	156
<i>Jungermannia epiphylla</i> ,	309
<i>Juniperus communis</i> ,	245

## L.

<i>Lactuca sativa</i> ,	264
Scariola,	ibid.
<i>Lamium album</i> ,	215
Purpureum,	216
<i>Lapsana communis</i> ,	271
<i>Lathyrus Nissolia</i> ,	251
Pratensis,	255
Sylvestris,	ibid.
Tuberosus,	251
<i>Lemna gibba</i> ,	62
Minor,	61
Polyrrhiza,	62
Trisulca,	61
<i>Leontodon autumnale</i> ,	266
Hirtum,	ibid.
Hispidum,	ibid.
Officinale,	265
Taraxacon,	ibid.
<i>Leonurus cardiaca</i> ,	220
<i>Lepidium sativum</i> ,	251
<i>Lichen albus</i> ,	511
Botryoïdes,	ibid.
Caninus,	514
Candelarius,	512
Ciliaris,	ibid.
Fagineus,	ibid.
Fimbriatus,	514
Flavus,	511
Fraxineus,	515
Incanus,	511
Jolithus,	510
Parietinus,	512
Pixidatus,	514
Prunastri,	515

<i>Lichen pulmonarius</i> ,	513
Simplex,	315
Uncialis,	<i>ibid.</i>
<i>Ligustrum vulgare</i> ,	52
<i>Linum catharticum</i> ,	149
Usitatissimum,	148
<i>Lithospermum arvense</i> ,	114
Officinale,	<i>ibid.</i>
<i>Lolium perenne</i> ,	96
Temulentum,	<i>ibid.</i>
<i>Lonicera Caprifolium</i> ,	124
<i>Lotus corniculatus</i> ,	257
<i>Lychnis dioica</i> ,	184
Flos-cuculi,	<i>ibid.</i>
<i>Lycoperdon Bovista</i> ,	354
Proteus,	<i>ibid.</i>
<i>Lycopodium clavatum</i> ,	298
denticulatum,	299
<i>Lycopus europæus</i> ,	57
<i>Lysimachia nemorum</i> ,	337
Nummularia,	119
Vulgaris,	<i>ibid.</i>
<i>Lythrum Salicaria</i> ,	187

## M.

<i>Malva Alcea,</i>	246
<i>Rotundifolia,</i>	<i>ibid</i>
<i>Sylvestris,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Marchantia conica,</i>	309
<i>Polymorpha,</i>	309
<i>Umbellata,</i>	310
<i>Marrubium vulgare,</i>	220
<i>Matricaria Chamomilla,</i>	287
<i>Parthenium,</i>	286
<i>Medicago falcata;</i>	258
<i>Hirsuta,</i>	259
<i>Lupulina,</i>	258
<i>Polymorpha,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Sativa,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Melampyrum sylvaticum,</i>	224
<i>Melica carulea,</i>	85
<i>Melissa Calamintha;</i>	225
<i>Mentha aquatica,</i>	214
<i>Arvensis,</i>	<i>ibid</i>
<i>Hirsuta,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Pulegium,</i>	215
<i>Rotundifolia;</i>	213
<i>Sylvestris,</i>	<i>ibid.</i>

<i>Menyanthes nymphoides</i> ,	118
Trifoliata,	<i>ibid.</i>
<i>Mercurialis annua</i> ,	175
Perennis,	<i>ibid.</i>
<i>Merulius cantharellus</i> ,	326
Quercinus,	327
Umbonatus,	326
<i>Mespilus pyracantha</i> ,	199
<i>Milium effusum</i> ,	80
<i>Mnium capillare</i> ,	502
Cuspidatum,	305
Glaucum,	302
Palustre,	<i>ibid.</i>
Pellucidum,	301
Punctatum,	305
Undulatum,	<i>ibid.</i>
<i>Moenchia sativa</i> ,	250
<i>Monilia cespitosa</i> ,	536
Crustacea,	<i>ibid.</i>
Glauc,	337
<i>Mucor minimus</i> ;	336
Mucedo;	<i>ibid.</i>
<i>Myosotis arvensis</i> ,	115
Palustris,	<i>ibid.</i>
<i>Myosurus minimus</i> ,	149
<i>Myriophyllum spicatum</i> ,	172
Verticillatum,	<i>ibid.</i>

## N.

*Narcissus Pseudo-narcissus*, 150  
*Nepeta cataria*, 215  
*Nymphaea alba*, 196  
*Lutea*, *ibid.*

## O.

<i>Oenanthe fistulosa</i> ,	142
<i>Oenothera biennis</i> ,	163
<i>Ononis arvensis</i> ,	250
<i>Spinosa</i> ,	251
<i>Onopordon acanthium</i> ,	275
<i>Ophiglossum vulgatum</i> ,	294
<i>Ophrys cordata</i> ,	60
<i>Myodes</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Ovata</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Orchis bifolia</i> ,	57
<i>Conopsea</i> ,	59
<i>Globosa</i> ,	52

<i>Orchis latifolia</i> ,	58	<i>Platanus orientalis</i> ,	197
<i>Maculata</i> ,	59	<i>Poa angustifolia</i> ,	86
<i>Morio</i> ,	58	<i>Annua</i> ,	87
<i>Origanum vulgare</i> ,	221	<i>Aquatica</i> ,	86
<i>Ornithogalum umbellatum</i> ,	152	<i>Compressa</i> ,	88
<i>Ornithopus perpusillus</i> ,	255	<i>Nemoralis</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Orobanche major</i> ,	229	<i>Palustris</i> ,	87
<i>Ramosa</i> ,	<i>ibid.</i>	<i>Phænix</i> ,	88
<i>Osmunda regalis</i> ,	297	<i>Pratensis</i> ,	87
<i>Spicant</i> ,	296	<i>Rigida</i> ,	88
<i>Oxalis Acetosella</i> ,	185	<i>Trivialis</i> ,	86
<i>Corniculata</i> ,	<i>ibid.</i>	<i>Pollichia amplexicaulis</i> ,	218
P.		<i>Galeobdolon</i> ,	217
<i>Panicum Crus-galli</i> ,	78	<i>Polygala vulgaris</i> ,	248
<i>Glaucum</i> ,	77	<i>Polygonum aviculare</i> ,	169
<i>Italicum</i> ,	78	<i>Amphibium</i> ,	168
<i>Verticillatum</i> ,	77	<i>Bistorsa</i> ,	169
<i>Viride</i> ,	78	<i>Convolvulus</i> ,	170
<i>Papaver Argemone</i> ,	195	<i>Dumetorum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Dubium</i> ,	<i>ibid.</i>	<i>Fagopyrum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Hybridum</i> ,	194	<i>Hydropiper</i> ,	168
<i>Rhæas</i> ,	195	<i>Persicaria</i> ,	169
<i>Sonniferum</i> ,	196	<i>Polypodium aculeatum</i> ,	298
<i>Parietaria officinalis</i> ,	107	<i>Fragile</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Paris quadrifolia</i> ,	171	<i>Filix femina</i> ,	297
<i>Parnassia palustris</i> ,	148	<i>Filix mas</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Pedicularis sylvatica</i> ,	225	<i>Vulgare</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Peziza Acetabulum</i> ,	335	<i>Polytrichum commune</i> ,	300
<i>Auricula</i> ,	<i>ibid.</i>	<i>Juniperinum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Caliciformis</i> ,	334	<i>Piliferum</i> ,	301
<i>Cochleata</i> ,	333	<i>Undulatum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Coccinea</i> ,	<i>ibid.</i>	<i>Populus alba</i> ,	167
<i>Phalaris arundinacea</i> ,	76	<i>Dilatata</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Canariensis</i> ,	77	<i>Nigra</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Phleoides</i> ,	76	<i>Tremula</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Phallus esculentus</i> ,	532	<i>Portulaca oleracea</i> ,	187
<i>Impudicus</i> ,	<i>ibid.</i>	<i>Potamogeton crispum</i> ,	110
<i>Phascom cuspidatum</i> ,	300	<i>Nataus</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Phellandrium aquaticum</i> ,	143	<i>Perfoliatum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Phleum nodosum</i> ,	79	<i>Serratum</i> ,	111
<i>Pratense</i> ,	<i>ibid.</i>	<i>Potentilla anserina</i> ,	205
<i>Phyteuma spicata</i> ,	124	<i>Argentea</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Pimpinella magna</i> ,	145	<i>Reptans</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Saxifraga</i> ,	<i>ibid.</i>	<i>Poterium Sanguisorba</i> ,	198
<i>Plantago coronopifolia</i> ,	106	<i>Prenanthes muralis</i> ,	264
<i>Lanceolata</i> ,	<i>ibid.</i>	<i>Primula acaulis</i> ,	117
<i>Major</i> ,	105	<i>Elatior</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Media</i> ,	<i>ibid.</i>	<i>Officinalis</i> ,	<i>ibid.</i>
		<i>Prunella vulgaris</i> ,	223

<i>Prunus avium</i> ,	195
<i>Cerasus</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Domestica</i> ,	194
<i>Padus</i> ,	195
<i>Spinosa</i> ,	194
<i>Pteris aquilina</i> ,	294
<i>Pulmonaria officinalis</i> ,	116
<i>Pyrola rotundifolia</i> ,	175

## Q.

<i>Quercus Robur</i> ,	171
------------------------	-----

## R.

<i>Radiola linoides</i> ,	111
<i>Ranunculus acris</i> ,	207
<i>Aquatilis</i> ,	208
<i>Arvensis</i> ,	209
<i>Bulbosus</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Ficaria</i> ,	206
<i>Flammula</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Fluviatilis</i> ,	208
<i>Hederaceus</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Heterophyllus</i> ,	207
<i>Polyanthemos</i> ,	209
<i>Repens</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Sceleratus</i> ,	207
<i>Raphanus Raphanistrum</i> ,	242
<i>Sativus</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Reseda luteola</i> ,	189
<i>Reticularia lycogala</i> ,	355
<i>Ustilago</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Rhamnus Frangula</i> ,	128
<i>Rhinanthus crista-galli</i> ,	223
<i>Ribes rubrum</i> ,	131
<i>Uva-crispa</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Rosa canina</i> ,	200
<i>Rubus cæsius</i> ,	201
<i>Fructicosus</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Idæus</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Rumex Acetosa</i> ,	159
<i>Acetosella</i> ,	160
<i>Acutus</i> ,	159
<i>Aquaticus</i> ,	<i>ibid.</i>

## S.

<i>Sagina procumbens</i> ,	111
<i>Sagittaria sagittifolia</i> ,	211

<i>Salix alba</i> ,	62
<i>Amygdalina</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Aurita</i> ,	61
<i>Capræa</i> ,	65
<i>Fragilis</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Monandra</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Viminalis</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Sambucus Ebulus</i> ,	147
<i>Laciniata</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Nigra</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Sanicula europæa</i> ,	158
<i>Saponaria officinalis</i> ,	177
<i>Satyrion hircinum</i> ,	59
<i>Saxifraga granulata</i> ,	176
<i>Tridactylides</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Scabiosa arvensis</i> ,	101
<i>Columbata</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Succisa</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Scandix Cerefolium</i> ,	144
<i>Pecten</i> ,	145
<i>Scirpus cæspitosus</i> ,	70
<i>Lacustris</i> ,	68
<i>Maritimus</i> ,	69
<i>Palustris</i> ,	70
<i>Sylvaticus</i> ,	69
<i>Scleranthus annuus</i> ,	177
<i>Perennis</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Scrophularia aquatica</i> ,	228
<i>Nodosa</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Scutellaria galericulata</i> ,	221
<i>Secale cereale</i> ,	96
<i>Sedum acre</i> ,	182
<i>Album</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Reflexum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Telephium</i> ,	181
<i>Sempervivum tectorum</i> ,	192
<i>Senecio doria</i> ,	285
<i>Jacobæa</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Nemorensis</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Viscösus</i> ,	282
<i>Vulgaris</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Serapias latifolia</i> ,	61
<i>Serratula arvensis</i> ,	272
<i>Sinapis arvensis</i> ,	241
<i>Nigra</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Sisymbrium amphibium</i> ,	255
<i>Nastursium</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Palustre</i> ,	256
<i>Sylvestre</i> ,	<i>ibid.</i>

<i>Sisymbrium Sophia</i> ,	257
<i>Tenuifolium</i> ,	236
<i>Sium augustifolium</i> ,	142
<i>Latifolium</i> ,	141
<i>Solanum Dulcamara</i> ,	128
<i>Nigrum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Tuberosum</i> ,	127
<i>Solidago Virga-aurea</i> ,	284
<i>Sonchus arvensis</i> ,	264
<i>Oleraceus</i> ,	265
<i>Sorbus aucuparia</i> ,	198
<i>Domestica</i> ,	199
<i>Sparganium erectum</i> ,	71
<i>Simplex</i>	<i>ibid.</i>
<i>Spartium scoparium</i> ,	249
<i>Spergula arvensis</i> ,	186
<i>Nodosa</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Sphagnum palustre</i> ,	299
<i>Spiræa Ulmaria</i> ,	200
<i>Stachys arvensis</i> ,	219
<i>Palustris</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Sylvatica</i> ,	218
<i>Stellaria graminea</i> ,	180
<i>Holostea</i> ,	179
<i>Uliginosa</i> ,	180
<i>Stemonitis furfuracea</i> ,	335
<i>Symphitum officinale</i> ,	116
<i>Syringa vulgaris</i> ,	52

## T.

<i>Tanacetum vulgare</i> ,	277
<i>Teucrium Scorodonia</i> ,	212
<i>Thlaspi arvense</i> ,	231
<i>Bursa-pastoris</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Campestre</i> ,	232
<i>Thymus acinos</i> ,	222
<i>Serpillum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Tilia cordata</i> ,	197
<i>Europæa</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Tormentilla erecta</i> ,	202
<i>Tragopogon pratense</i> ,	263
<i>Trapa natans</i> ,	107
<i>Tremella adnata</i> ,	331
<i>Juniperina</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Mesenterica</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Nostoc</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Persistens</i> ,	332
<i>Rufa</i> ,	331

<i>Trifolium agrarium</i> ,	257
<i>Arvense</i> ,	256
<i>Officinale</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Pratense</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Repens</i> ,	257
<i>Triticum æstivum</i> ,	98
<i>Hibernum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Repens</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Turritis hirsuta</i> ,	239
<i>Tussilago alba</i> ,	281
<i>Farfara</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Petasites</i> ,	282
<i>Typha latifolia</i> ,	71

## V.

<i>Vaccinium Myrtillus</i> ,	166
<i>Valantia cruciata</i> ,	104
<i>Valeriana dentata</i> ,	67
<i>Dioica</i> ,	66
<i>Locusta</i> ,	67
<i>Officinalis</i> ,	66
<i>Verbascum Blattaria</i> ,	126
<i>Lychnitis</i> ,	125
<i>Nigrum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Thapsus</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Verbena officinalis</i> ,	53
<i>Veronica agrestis</i> ,	55
<i>Anagallis</i> ,	54
<i>Arvensis</i> ,	55
<i>Beccabunga</i> ,	54
<i>Chamædrys</i> ,	55
<i>Hederæfolia</i> ,	56
<i>Officinalis</i> ,	53
<i>Serpillifolia</i> ,	54
<i>Teucrium</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Triphyllus</i> ,	56
<i>Verna</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Viburnum Opulus</i> ,	146
<i>Vicia cracca</i> ,	253
<i>Faba</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Lathyroides</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Sativa</i> ,	252
<i>Sepium</i> ,	253
<i>Vinca minor</i> ,	152
<i>Viola arvensis</i> ,	150
<i>Canina</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Odorata</i> ,	129



<i>Viola tricolor,</i>	130	<i>Urtica dioica,</i>	107
<i>Viscum album,</i>	108	<i>Urens,</i>	108
U.		<i>Utricularia vulgaris,</i>	57
<i>Ulex europæus,</i>	250	X.	
<i>Ulmus campestris,</i>	136		
<i>Hollandica,</i>	<i>ibid.</i>	<i>Xanthium strumarium,</i>	158

FINIS INDICIS.

## ERRATA.

## IN LEXICONE.

- Pag.* 15, *lin.* 5, teretinsculum; *lege*, teretiusculum.  
*P.* 18, *lin.* 4, receptacula; *lege*, receptaculo.  
*P.* 21, *lin.* 20, in quorum; *lege*, in quarum.  
*P.* 23, *lin.* 14, intiger; *lege*, integer.  
*P.* 26, *lin.* 23, plantas cujus; *lege*, plantas quarum.  
*P. idem*, *lin.* 26, monandra; *lege*, monandria.  
*P.* 30, *lin.* 21, vepillum; *lege*, vexillum.  
*P.* 42, *lin.* 37, primor; *lege*, primus.  
*P.* 46, *lin.* 12, caspulare; *lege*, capsulare.

## IN FLORA.

- P.* 62, *lin.* 38, *Taeye Weyde*; *lege*, *Taeye Wym.*  
*P.* 109, *lin.* 11, *Balba*; *lege* *B. alba*.  
*P.* 134, *lin.* 15, *chenopodium*; *lege*, *chenopodium*.  
*P.* 136, *lin.* 11, *monphyllus*; *lege*, *monophyllus*.  
*P.* 151, *lin.* 5, *multifora*; *lege*, *multiflora*.  
*P.* 163, *ænothera*; *lege*, *cænothera*.  
*P.* 205, *lin.* 20, *Raene-voet*; *lege*, *Haene-voet*.  
*P.* 267, *lin.* 1, *hædynoïs*; *lege*, *hædypnoïs*.

*Reliqua vix notatu sunt digna.*



